



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

Serious and Medical
Books, and all objects
of Natural History.
A. E. FOOTE, M. D.,
1223 Belmont Ave.,
Philadelphia, Pa.

138310

H. 150 in

HARVARD UNIVERSITY



**LIBRARY OF THE
MINERALOGICAL
LABORATORY**


**UNIVERSITY MUSEUM
Gift of
Clifford Frondel**

Acceptin

SEP 30 1946

Friedrich Schlegel

Philosophie



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED

1964

TO THE PHYSICS DEPARTMENT

FROM

1964

1964

1964

1964

1964

1964

Nat u r g e s c h i c h t e

der

d r e i R e i c h e.

Zur

allgemeinen Belehrung

bearbeitet

von

G. W. Bischoff, J. R. Blum, H. G. Bronn, A. C.
v. Leonhard, F. S. Leuckart und F. S. Voigt.

Mit Abbildungen.

Zweiter Band.

Oryktognosie.

Stuttgart.

E. Schweizerbart's Verlagshandlung.

1833.

James B. Dana
March 1867

Lehrbuch

der

Dryftognosie

von

Dr. J. Reinhard Blum,

Privat-Dozent der Mineralogie an der Universität zu Heidelberg.



Stuttgart.

E. Schweizerbart's Verlagsbuchhandlung.

1833.

Small. 4 runs
1781 down

1781 down

1781 down

1781 down

1781 down

V o r w o r t.

Die Absicht, welche mit dem Erscheinen dieses Handbuchs der Dryktognosie verbunden ist, liegt schon im Plane des ganzen Werkes, von dem dasselbe einen Abschnitt ausmacht. Die Naturgeschichte durch populäre, jedoch wissenschaftliche, Darstellung für Jedem zugänglich zu machen, wurde als Hauptzweck betrachtet. Diesen zu verfolgen, war besonders bei der Mineralogie nothwendig; denn, obgleich die unorganischen Produkte zu den verschiedensten, mitunter unentbehrlichsten Bedürfnissen des Lebens verwendet werden, so ist sie gerade derjenige Theil der Naturgeschichte, von welchem am wenigsten Kenntnisse im Allgemeinen verbreitet sind, so daß in der Regel der Arbeiter das Mineral, das er zurechtet, nicht gehörig kennt. Welche Nachtheile hierdurch nicht selten entstehen, ist augenscheinlich. Der Grund davon ist theils in dem späteren Vorschreiten dieser Wissenschaft, theils aber auch in der Art und Weise der Behandlung derselben zu suchen, indem durch letztere der Uebergang ins praktische Leben häufig erschwert wurde. Ich bemühte mich daher, die Dryktognosie, besonders deren ersten Theil, auf eine allgemein verständliche Weise abzuhandeln; in wie weit mir dieses gelungen, überlasse ich der Beurtheilung sachverständiger Richter, besonders solcher, welche das Buch beim Unterrichte gebrauchen. — Daß ich die Kry stallformen dem Texte beidrucken ließ, wird hoffent-

lich Billigung finden, indem auf diese Art leichtere Benutzung der Figuren, und dadurch schnelleres Auffassen des Gegenstandes erlangt wird. Bei der Auswahl der Formen nahm ich, so viel möglich, auf die, welche in der Natur am häufigsten vorkommen, Rücksicht. Die Zeichnungen entlehnte ich vorzüglich aus den Atlassen von Haüy und Naumann. Zu den Werken, welche ich bei meiner Arbeit benutzte, gehören besonders v. Leonhards Dryktognosie, Naumanns Mineralogie und v. Kobells Charakteristik der Mineralien. Die Vorräthe des hiesigen Mineralien-Comptoirs, so wie meine eigene Sammlung, gaben mir zu mancher neuen Beobachtung Stoff. — Noch fügte ich dem Buche eine Anleitung zum Sammeln und eine Uebersicht der Mineralien nach ihren Kernformen bei, erstere um besonders dem Anfänger in dieser Hinsicht eine Richtschnur zu bieten, letztere um das Bestimmen der Mineralien zu erleichtern. Ich hoffe daß beide Anhänge nicht unwillkommen seyn werden.

Heidelberg, im August 1833.

K. Blum.

E i n l e i t u n g.

§. 1.

Philosophen und Naturforscher älterer und neuerer Zeit haben sich vielfach mit den Fragen beschäftigt: wie der Erdbörper entstanden, welche Veränderungen derselbe im Laufe der Zeiten erlitten und aus welchen Stoffen er eigentlich gebildet sey. Wenn es nun gleich unlängbar ist, daß die erste dieser Fragen wohl niemals genügend wird beantwortet werden können, so fehlte es doch nie an Männern, die sich mit der Lösung derselben beschäftigten. Von keinen Erfahrungen belehrt, von keinen Beobachtungen unterstützt, hat die Phantasie bei Forschungen über dieses Problem stets den größten Spielraum; daher wir auch über das Entstehen unseres Erdbörpers beinahe eben so viele Hypothesen besitzen, als es Männer gab, die diesem Gegenstände ihre Aufmerksamkeit widmeten. Die vorzüglichste der ältesten Schöpfungsgeschichten ist in der genetischen Urkunde enthalten. Nach ihr entwickelte sich die Erde aus einem flüssigen Chaos, anderen Ansichten zufolge sah man sie aus Atomen zusammengesetzt an, oder hielt sie für eine von der Sonne ausgestoßene Masse u. s. w. Später stellten sich die Theorien von einem ursprünglich flüssigen Zustande unserer Erde und dem Entstehen derselben auf feurigem Wege, die Theorien der Neptunisten und Vulkanisten als herrschende Ansichten gegenüber; und von ihnen hat die letztere in neuerer Zeit das Uebergewicht erlangt. Eine Entwicklung und Darlegung aller auf diesen Gegenstand Bezug habenden Meinungen gibt die Lehre der Geologie.

§. 2.

Was nun die zweite Frage betrifft, so finden wir die frühesten Andeutungen über die Veränderungen, welche die Erde erlitten, schon in den Mythen der ältesten Völker; ihre Ueberlieferungen sind jedoch so dunkel, daß es unentschieden bleibt, ob es reine Dichtungen sind, oder ob ihnen Thatsachen zu Grunde liegen. Daß dieselbe verschiedenen Ummwälzungen unterworfen war, ergibt sich aus der genaueren Betrachtung ihrer Festrinde. Aber über den Bau unserer Erde, mit welcher sich die Geognosie beschäftigt, blieb man lange ohne genauere Kenntniß, und zwar besonders deswegen, weil man vernachlässigte die Bestandtheile, aus welchen dieselbe zusammengesetzt ist, genauer zu untersuchen; ohne mit dem Einzelnen bekannt zu seyn, wird man auch nie mit dem Ganzen vertraut werden können. Wie die Geognosie die Geologie bei der versuchten Lösung ihres Problems unterstützt, denn diejenige geologische Hypothese wird wohl als die vorzüglichere angesehen werden, welcher die meisten geognostischen Thatsachen zur Seite stehen, so gründet sich auch die Geognosie besonders auf die Kenntniß der einfachen Bestandtheile der Erde, mit welchen uns die Dryktognosie bekannt macht.

§. 3.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich der Zusammenhang, in welchem die Beantwortung jener drei Fragen steht; aber man beschäftigte sich in früheren Zeiten mehr mit den beiden ersten, als mit der letzten, worin auch der Grund zu suchen, warum man in der Kenntniß unserer Erde so lange zurück blieb. Die ältesten Naturforscher betrachteten dieselbe als aus vier Elementen bestehend; aus Erde, Wasser, Luft und Feuer. Alle Körper sollten aus ihnen zusammengesetzt seyn, und konnten wieder in dieselben aufgelöst werden. Die Verschiedenheit der Körper rühre von dem verschiedenen Verhältniß, in welchem sich jene Elemente verbanden, her. Eine bequeme Theorie, die lange jede weitere Forschungen verhinderte, denn man kannte ja im Voraus schon die Bestandtheile der Körper. Diese Theorie gab jedoch einer eigenen Klasse von Forschern, den Alchemisten, das Daseyn. Fanden dieselben auch nicht, was sie suchten, so waren doch ihre Bemühungen nicht ohne Erfolg. Bei ihren Forschungen mußten Entdeckungen kommen, aus welchen allmählig ein sehr

wichtiger Zweig der Naturwissenschaften, die Chemie hervorging. Man wurde, wiewohl erst spät, überzeugt, daß drei der früher angenommenen Elemente aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt seyn, und das vierte, das Feuer, nur ein chemischer Prozeß wäre. Die Chemie in ihrer heutigen Vollkommenheit besitzt die Mittel, die Körper, aus welchen die Erde gebildet ist, in ihre letzten Bestandtheile, in ihre Elemente zu zerlegen, und man hat deren bereits über fünfzig aufgefunden. Wir kennen jedoch von der Erde kaum die Oberfläche und einen unbedeutenden Theil ihrer Rinde, denn unbeträchtlich ist die Tiefe, bis zu welcher man in sie eindrang; der tiefste bekannte Punkt übersteigt wohl nicht 3000 Fuß, oder nicht einmal ein Viertel einer geographischen Meile, während der Radius der Erde 860 Meilen beträgt; ein Beweis, daß wir nur die Erdrinde als einigermaßen von uns gekannt annehmen können. Hieraus ließe sich abnehmen, daß wir erst den kleinsten Theil der Stoffe kennen, aus welchen unser Planet besteht, allein nach mehreren Erscheinungen, besonders den vulkanischen und den damit im Verbande stehenden, sind wir, vor der Hand wenigstens, zu dem Schlusse berechtigt, daß in größerer Tiefe die Bestandtheile der Erde noch dieselben sind.

S. 4.

Die Reihe der einfachen Stoffe mag geschlossen seyn oder nicht, so finden wir doch alle bis jetzt bekannten Körper aus ihnen zusammengesetzt. Blicken wir nun auf unsere Erde, so sehen wir dieselbe mit einer Atmosphäre umgeben, theils aus festem Lande, theils aus Wasser bestehend, und einer unendlichen Menge von organischen Körpern zum Aufenthalte dienen.

Hierdurch werden wir zu dem Unterschiede zwischen lebenden oder organischen und leblosen oder unorganischen Körpern geführt; erstere besitzen gewisse Theile, Organe, von welchen die Existenz des ganzen Wesens abhängt; sie entstehen, erreichen eine höchste Bildungsstufe, nehmen ab und gehen unter. Anders ist es mit den unorganischen Körpern, alle Theile sind bei ihnen ähnlich, keiner besitzt eine besondere Thätigkeit, und sie können daher durch mechanische Mittel nur in Gleichartiges getrennt werden. Die Betrachtung beider Arten von Körpern ist Gegenstand der Naturgeschichte.

§. 5.

Diejenigen unorganischen Körper, welche die feste Rinde unserer Erde zusammensetzen, werden Mineralien genannt. Sie sind als Elemente oder als eine Verbindung derselben anzusehen, welche nach physischen oder chemischen Gesetzen entstanden, bei deren Bildung jedoch Lebenskräfte auf keine Weise einwirkten.

Luft und Wasser, welche sich zwischen den Schichten der Gebirgsmassen und in den Höhlungen unter der Oberfläche der Erde finden, machen, als von oben eingebrungen, keine Theile der festen Erdrinde aus, gehören daher auch nicht in das Bereich der Mineralogie, obgleich manche Schriftsteller dieselben, besonders das Wasser, ihrem Systeme einreihen, sich dabei aber die Inconsequenz zu Schulde kommen lassen, die Mineralwasser zu übergehen.

§. 6.

Die Mineralien sind entweder einfache, sichtlich nicht gemengte, obgleich sie aus verschiedenen Elementen chemisch zusammengesetzt seyn können, welche Mischung jedoch allen ihren Theilen gleichmäßig zukommt, oder sie sind gemengte, aus zwei oder mehreren einfachen Mineralien bestehend, deren Zusammensetzung schon dem Auge geboten oder durch mechanische Mittel erforscht werden kann.

§. 7.

Mineralogie im weiteren Sinne ist die Wissenschaft von den Mineralien. Allein aus dem was im vorhergehenden §. angeführt wurde, ergibt sich von selbst, daß sie in zwei Theile zerfällt: in Mineralogie im eigentlichen Sinne oder Dryktognosie und in Geognosie.

Die Mineralogie im eigentlichen Sinne, Dryktognosie, betrachtet die einfachen, sichtlich nicht gemengten Mineralien, sie lehrt dieselben nach ihren äußern und innern Eigenschaften kennen, und hiernach auf eine möglichst übereinstimmende Art klassificiren.

Die Geognosie dagegen betrachtet die Mineralien in ihrem Verhalten gegen einander, lehrt die gemengten Mineralien, Felsarten, nach Zusammensetzung und Structur kennen, macht mit der Stellung bekannt, welche dieselben in der Natur einneh-

men und gibt überhaupt Aufschluß über den Bau der Erdrinde, wie dieser gegenwärtig beschaffen ist.

In Verbindung mit der Geognosie wird gewöhnlich die Geologie betrachtet; letztere versucht die Entstehung unseres Planeten zu erklären und lehrt uns die Umwandlungen, die derselbe erlitten, kennen.

§. 8.

Neben diesen Hauptlehren gibt es noch folgende Zweige der Mineralogie:

Angewandte Mineralogie oder Lithurgik: Lehre von der Anwendung der Mineralien im gewöhnlichen Leben, bei ökonomischen Gewerben, bei nützlichen und schönen Künsten.

Chemische Mineralogie: Lehre von den Bestandtheilen der Mineralien.

Topographische Mineralogie: sie gibt Aufschluß über das Vorkommen der Mineralien an den einzelnen Orten, in den verschiedenen Gegenden und Ländern.

Die Versteinerungskunde lehrt die Petrefakten kennen.

§. 9.

Zur genauen Erforschung der Natur und Eigenschaften der Mineralien müssen sowohl physikalische als chemische Erfahrungen und mathematische Bestimmungen benutzt werden; es sind daher Physik, Chemie und Mathematik als die vorzüglichsten Hülfswissenschaften der Mineralogie anzusehen. Kenntnisse in der Zoologie, Botanik und Erdbeschreibung werden in vielen Fällen von großem Nutzen, ja unentbehrlich seyn.

Das Studium der Mineralogie wird außerdem durch gewisse Hülfsmittel gefördert und sehr erleichtert werden. Dahin gehören:

Mineralien-Sammlungen.

Das Heidelberger Mineralien-Comptoir liefert Sammlungen jeder Art, verschieden im Preise, je nach der Zahl, dem Formate und der Qualität der Stücke, nach jedem beliebigen Systeme geordnet. Nähere Angaben kann man von dem Institute selbst erhalten.

aber kann nur erforscht werden durch gänzliche Veränderung der Masse, durch Zerlegung derselben in ihre Elemente oder Bestandtheile.

Hierauf gründet sich die Eintheilung der Kennzeichen der Mineralien, in

1) Stereometrische oder Kennzeichen der Gestalt; sie lehren uns die äußere Form der Mineralien kennen.

2) Physikalische Kennzeichen geben Aufschluß über äußere und innere Beschaffenheit der Mineralien, abgesehen von der Form und ohne Einwirkung auf die Mischung bei deren Untersuchung.

3) Chemische Kennzeichen machen uns mit der Zusammensetzung der Mineralien bekannt; bei ihrer Erforschung wird auf die Mischung eingewirkt, wodurch eine Zersetzung des Minerals erfolgt.

I. Kennzeichen der Gestalt.

§. 13.

Bei Betrachtung der Körper ist das Erste was wir bemerken, die Form, unter welcher sich uns diese darstellen; bei den Mineralien finden wir dieselbe auf verschiedene Weise ausgesprochen; die Substanz, aus der sie bestehen, ist gewissen Gesetzen unterworfen, vermöge der sie sich zu festen Körpern von regelmäßiger und symmetrischer Gestalt zu bilden strebt, und diese Form dient in vielen Fällen als eines der wichtigsten Kennzeichen beim Bestimmen der Mineralien.

§. 14.

Hinsichtlich der äußeren Gestalt zerfallen die Mineralien in zwei große Abtheilungen. Sie lassen nämlich entweder eine durch regelmäßige Flächen umgebene symmetrische Form wahrnehmen, sind krystallisirt, oder sie haben diesen Grad der Formenausbildung nicht erlangt, erscheinen in unregelmäßigen Gestalten, sind nicht krystallisirt. Die flüssigen Körper sind schon an und für sich gestaltlos; es gibt deren auch zu wenige im Mineralreiche, als daß man für sie eine eigene Klasse aufstellen sollte.

§. 15.

Krystall heißt in der Mineralogie jedes Mineral, das regelmäßige Begrenzung durch ebene Flächen besitzt; die Kraft, vermöge welcher diese Form erzeugt wird, nennt man Krystallisation.

Nur die Krystalle können im Mineralreiche als Individuen betrachtet werden, und sie haben für die Mineralogie denselben Werth, wie die Gestalten der Thiere und Pflanzen in der organischen Natur. Hieraus geht der Nutzen einer genaueren Angabe der verschiedenen zahlreichen Krystallformen hervor. Die Wissenschaft kann sich jedoch nicht allein auf die Betrachtung der Form der Individuen beschränken, sondern muß auch so viel wie möglich die unregelmäßig vorkommenden Mineralien in ihre Untersuchung ziehen, zumal da die Erfahrung lehrt, daß selbst eine gewisse Constanz hinsichtlich der unregelmäßigen Gestalt bei den Mineralien zu beobachten ist, die dann als Kennzeichen benutzt werden kann und muß.

§. 16.

Die Wissenschaft, welche sich mit den räumlichen Verhältnissen der Individuen befaßt, wird Krystallographie genannt. Ehe die Krystallkunde auf die einzelnen Mineralien angewendet wird, ist es vorerst nothwendig, die Terminologie, wodurch die einzelnen Formen beschrieben werden, zu bestimmen und diese dann in ein System zu bringen.

§. 17.

Die Krystalle werden von Ebenen, Flächen begrenzt; bei jedem dieser Körper kommen in Betracht:

- 1) die Flächen, diese sind hinsichtlich ihrer Seiten: drei-, vier-, fünf-, sechs- oder mehrseitig.
 - a) die dreiseitigen Flächen, Dreiecke, sind entweder gleichseitig, gleichschenkelig oder ungleichseitig.
 - b) Die vierseitigen Flächen, Vierecke, sind Parallelograme oder Klinograme, je nachdem zwei gegenüber liegende Seiten parallel laufen oder nicht.
 - a) die Parallelograme zeigen sich theils rechtwinklich, theils schiefwinklich; haben erstere gleiche Seiten, so werden sie

Quadrate genannt, sind jedoch nur die gegenüberstehenden Seiten gleich, so heißen sie *Rektangeln*. Die schiefwinklichen Parallelograme sind ebenfalls entweder gleichseitig, *Rhomben*, oder ungleichseitig, *Rhomboiden*.

β) Die *Klinograme* werden *Trapeze* genannt, wenn sie noch zwei parallele Seiten haben, *Trapezoide*, wenn keine Seite der anderen parallel ist.

c) *Fünfecke* (*Pentagone*).

d) *Sechsecke* (*Hexagone*), gleichwinklich oder ungleichwinklich.

2) die *Kanten*; sie werden gebildet durch Vereinigung zweier Ebenen, und sind die Gränzen der Flächen; man benennt sie verschieden, nach den Formen an welchen sie vorkommen, und nach der Lage, die sie einnehmen.

3) die *Ecken*; sie entstehen durch das Zusammentreten von drei oder mehr Flächen in einem Punkt, und sind als Gränzen der Kanten anzusehen.

Die verschiedenen Beziehungen, in welchen Flächen, Ecken und Kanten zu einander stehen, werden durch die Winkel, sowohl Neigungs- als ebene Winkel, bestimmt.

§. 18.

Axen heißen bei jedem Krystall die geraden Linien, welche man sich von einer Ecke, oder von der Mitte einer Fläche oder Kante durch denselben nach den gegenüberstehenden gleichnamigen Theilen gezogen denkt. Im Mittelpunkt der Gestalt scheiden sich sämtliche *Axen* theils unter rechten, theils unter anderen einfachen Winkeln; hierauf und auf der verschiedenen Größe der *Axen* beruht die Aufstellung der verschiedenen Krystallsystemen. Eine der *Axen* eines Krystalls gilt als *Hauptaxe*, und wird senkrecht gedacht vor dem Beobachter. Die anderen *Axen* werden *Queraxen* genannt, und können entweder unter sich gleich oder verschieden seyn.

§. 19.

Liegen die Endpunkte der *Hauptaxe* in Flächen, so werden diese *Endflächen*, in Ecken *Scheitel*, in Kanten *Gipfelkanten* genannt. *Scheitelflächen* heißen diejenigen Flächen, durch welche die *Scheitel* gebildet werden. *Scheitelfanten*, die

in einen Scheitel auslaufenden Kanten; Gipsflächen, die Flächen, durch deren Zusammentreten die Gipfelfante gebildet wird.

Flächen und Kanten, die parallel der Hauptaxe laufen, nennt man Seitenflächen und Seitenkanten. Kanten die, wenn auch verlängert gedacht, die Hauptaxe nicht schneiden, obgleich sie ihr nicht parallel sind, werden Randkanten genannt. Ecken, den Rand verbindend, heißen Randecken. Laßt nur eine der Quersaxen an beiden Enden in Ecken aus, so führen diese Ecken die Benennung Querscheitel.

Weitere Unterscheidungen finden bei den Ecken statt, in spitze und stumpfe, bei Kanten; hinsichtlich ihrer Länge oder der Neigung der Flächen, in scharfe und stumpfe Kanten etc. Alle andere Verschiedenheiten ergeben sich bei Betrachtung der einzelnen Gestalten.

§. 20.

Nach Verschiedenheit der Zahl, Lage und Größe der Axen der vorkommenden Formen, werden dieselbe in mehrere Krystallsysteme abgetheilt. Es lassen sich nun folgende Grundsätze für die Begründung dieser Systeme aufstellen:

A. Dreiaxige Gestalten, solche, deren Formen-Verhältnisse ein dreizähliges Axensystem erfordern.

a) die drei Axen stehen senkrecht auf einander.

1) Die Axen sind gleich groß: Tesserale-System. Würfel. Regelmäßiges Oktaeder. Kanten-Dodekaeder. Tetraeder. Pentagon-Dodekaeder.

2) Zwei Axen sind gleich, die dritte kleiner oder größer: Tetragonal-System. Gerade quadratische Säule, quadratisches Oktaeder.

3) Alle drei Axen sind ungleich: Rhombisches System. Gerade rektanguläre Säule. Rhombisches Oktaeder. Rektangulär-Oktaeder. Rektangulär-Ditetraeder, gerade rhombische Säule.

b) Die Axen bilden nicht lauter rechte, wenigstens einen schiefen Winkel, unter einander; auch sind sie ungleich.

4) Zwei Axen stehen senkrecht zueinander, die dritte unter einem schiefen Winkel zu diesen. Klinorhombisches Sy-

- Item. Schiefe rektanguläre Säule. Schiefe rhombische Säule. Gerade rhomboidische Säule.
- 5) Keine Axe steht senkrecht auf der anderen. Klinorhomboidisches System. Schiefe rhomboidische Säule.
- B. Vieraxige Gestalten: solche, deren Formen-Verhältnisse ein vierzähliges Arensystem erfordern.
- 6) Drei der Aren schneiden sich in einer Ebene unter Winkeln von 60° und sind gleich, während die vierte, ungleiche, auf diesen senkrecht steht. Hexagonal-System. Rhomboeder, regelmäßige sechsseitige Säule. Bipyramidal-Dodekaeder.

§. 21.

Wenden wir das, was §. 18. über die Aren gesagt wurde, auf die in den sechs Systemen aufgeführten Formen an, so ergibt sich, daß

1) da, wo alle Aren gleich sind, wie im Tesseral-System, jede derselben eine Hauptaxe ist;

2) da, wo sich die eine durch ihre Größe von den anderen unterscheidet, wie im triagonalen und hexagonalen Systeme, diese stets als Hauptaxe gilt, und

3) da, wo alle Aren ungleich sind, wie in den drei übrigen Systemen, die Wahl der Hauptaxe mehr willkürlich bleibt; doch ist als Grundsatz festzustellen, daß diejenige Axe, welche als Hauptaxe gewählt wurde, bei einem Minerale, consequent als solche beibehalten werde.

§. 22.

Alle Krystalle, welche im Mineralreiche bis jetzt beobachtet wurden, und die oft dem Anscheine nach so sehr von einander verschieden sind, lassen sich auf eine der genannten Formen zurückführen, welche wir deshalb auch Grundformen nennen. Wir wollen jede einzeln derselben betrachten, ohne weiter die systematische Eintheilung zu berühren, wobei wir jedoch bemerken, daß die Gestalten von einem dieser Systeme zwar alle bei einem Mineral vorkommen können, nicht aber die Gestalten eines andern Systems; daß also ein Mineral nie in den Formen zweier Systeme zugleich krystallisiren kann.

1) Würfel, Hexaeder, Fig. 1. Er ist ein aus sechs quadratischen Flächen (P) bestehender Körper, besitzt acht gleiche Ecken (a) und zwölf gleiche Kanten (b).

Fig. 1.





Fig. 2.



2) Regelmäßiges Oktaeder: Fig. 2., besteht aus acht gleichseitigen dreieckigen Fläche (P), welche unter Winkeln von $109^{\circ} 28' 16''$ zu einander geneigt sind. Die sechs Ecken (a) und die zwölf Kanten (b) unter einander gleich.

3) Kanten-Dodekaeder: Fig. 3. ist zusammengesetzt aus 12 gleichen rhombischen Flächen (P), die sich unter Winkeln von 120° zu einander neigen. Die Kanten sind alle gleich, die Ecken aber verschieden; sechs derselben (a), durch das Zusammentreten von vier Flächen gebildet (Oktaederscheitel), sind spitz und gelten als Endpunkte der drei Axen; die anderen acht Ecken (e) werden durch drei Flächen gebildet (Rhomboderscheitel) und sind stumpf.

Fig. 3.






Fig. 4.



4) Tetraeder: Fig. 4., ein aus vier gleichseitigen dreieckigen Flächen (P) gebildeter Körper, die sich unter Winkeln von $70^{\circ} 31' 44''$ zu einander neigen; die vier Ecken (a), so wie die sechs Kanten (b) unter einander gleich.

Fig. 5.



5) Pentagon-Dodekaeder: Fig. 5., besteht aus zwölf unter einander gleichen fünfseitigen Flächen (P); vier Seiten einer jeden dieser Flächen sind gleich, die andere fünfte aber ist verschieden von diesen und dient als Basis; die Gestalt besitzt dreißig Kanten und zwanzig Ecken. Von den Kanten sind sechs Gipfelfanten (q), gebildet durch das

Zusammentreffen der fünften ungleichen Seite der Pentagon-Flächen; durch ihre Mitte werden die Axen gelegt; die anderen zwanzig Kanten sind Scheitelfanten (b), jede Art von Kanten haben unter einander gleichen Werth. Von den zwanzig Ecken werden acht durch das Zusammentreten dreier Scheitelfanten (e), zwölf aber durch zwei Scheitel- und eine Gipfelfante gebildet (u). Erstere nennt man Scheiteln, letztere Seitenecken, erstere sind unter sich gleich, so wie die letzteren.

§. 24.

Fig. 6.




Fig. 7.





Fig. 8.




6) Gerade quadratische Säule: Fig. 6 und 7., sie besteht aus sechs Flächen, von denen die Endflächen (P) Quadrate, die Seitenflächen (M) aber Rechtecke sind. Die Höhe der Säule oder der Hauptaxe kann sehr verschieden seyn; jedenfalls ist sie entweder kleiner, Fig. 6., oder größer, Fig. 7., als die Queraxen. Die Säule hat nur gleiche Ecken (a), aber zweierlei Kanten: acht, die parallel der Queraxen (d), und vier, die parallel der Hauptaxe (g) laufen, jene sind Randkanten und unter einander gleich, diese Seiten und ebenfalls gleich unter einander.

7) Quadratisches Oktaeder: Fig. 8 und 9., zusammengesetzt aus acht gleichen, gleichschenkligen dreieckigen Flächen (P), mit Kanten und Ecken von zweifachem Werthe. Die acht Kanten, von denen je vier eine Ecke, Scheitel (a), bilden

durch welche die Hauptaxe gelegt wird, heißen **Scheitel** (a), und sind gleich, ebenso die vier anderen, **Randkanten** (d), die in einer Ebene mit den Queraxen liegen. Die vier Ecken, je eine durch zwei Scheitel- und zwei Randkanten gebildet, nennt man **Randkanten** (c), sie sind gleich. Das **Arten-Verhältniß** ist dasselbe wie bei der vorhergehenden Form, die Hauptaxe ist entweder kleiner als die Queraxen, stumpfsechseckiges Oktaeder, Fig. 8, oder größer, spitziges quadratisches Oktaeder, Fig. 9.


Fig. 9.



§. 25.

Fig. 10.

8) **Gerade rektanguläre Säule**: Fig. 10., ein aus sechs rektangulären Flächen gebildeter Körper, von denen je zwei gegenüberstehende immer gleich sind. Die zwei Flächen, durch deren Mitte man die Hauptaxe gehend annimmt, heißen **Endflächen** (P), die vier anderen Seitenflächen, von diesen sind zwei breit (M) und zwei schmal (T). Die acht Ecken (a) sind einander gleich, aber die zwölf Kanten lassen dreierlei Werthe, den drei Arten entsprechend, wahrnehmen. Vier derselben, parallel der Hauptaxe laufend, **Seiten** (g), sind gleich, ebenso die vier, welche der längeren Queraxe, **Längenrand** (d), und die vier, welche der kürzeren Queraxe, **Breitenrand** (f), parallel laufen. Die Endfläche wird von Längen- und Breitenrand eingeschlossen.



Die acht Ecken (a) sind einander gleich, aber die zwölf Kanten lassen dreierlei Werthe, den drei Arten entsprechend, wahrnehmen. Vier derselben, parallel der Hauptaxe laufend, **Seiten** (g), sind gleich, ebenso die vier, welche der längeren Queraxe, **Längenrand** (d), und die vier, welche der kürzeren Queraxe, **Breitenrand** (f), parallel laufen. Die Endfläche wird von Längen- und Breitenrand eingeschlossen.


Fig. 11.

9) **Rhombisches Oktaeder**: Fig. 11., gebildet aus acht ungleichseitigen dreieckigen Flächen, die sechs Ecken, so wie zwölf Kanten von dreierlei Werth bilden. Von den ersteren sind immer zwei gegenüberstehende gleich: die beiden, durch welche man sich die Hauptaxe gelegt denkt, heißen **Scheitel** (a), die anderen **Seitenecken**, von diesen sind zwei spitz (i) und zwei stumpf (o), jene werden als Endpunkte der längeren, diese als Endpunkte der kürzeren Queraxe angesehen. Von den zwölf Kanten liegen vier stets in einer Ebene und sind gleich. Die vier Kanten zwischen den spitzen Rand-Ecken und den Scheiteln liegend, heißen **scharfe Schei-**



tefkanten (b); die vier zwischen den stumpfen Randdecken und den Scheiteln, stumpfe Scheitellanten (a); und die vier zwischen den spitzen und stumpfen Randdecken, Randkanten (d).


Fig. 12.



10) Rectanguläres Octaeder: Fig. 12., aus acht gleichschenkligen dreieitigen Flächen bestehend. Die Schenkel aller acht Dreiecke sind gleich, allein die Basis ist verschieden; daher vier große (P) und vier kleine (M), unter sich gleiche, dreieitige Flächen. Die Lage

der Hauptaxe ist bestimmt, sie hat ihre Endpunkte in den beiden Ecken, Scheiteln (a), die durch die acht gleichen Kanten, Scheitellanten (b), gebildet werden. Die vier andern Ecken sind Randecken (i); die vier Kanten, Randkanten, zwischen diesen liegend, sind je zwei einander gleich, entweder lang, Längsrand (d), oder kurz, Breitenrand (f). Ihre Mitten gelten als Endpunkte der größeren und kleineren Quersaxe. Sie bilden ein Rectängel.


Fig. 13.



11) Rectanguläres Ditetraeder: Fig. 13., ein Körper, dem vorhergehenden ähnlich, nur der Lage nach verschieden von ihm. Er ist aus acht Flächen zusammengesetzt, von denen vier Gipfelflächen (P) und die vier andern Seitenflächen (M) sind. Durch das Zusammentreffen zweier Gipfelflächen werden die Gipfelkanten (q), in deren Mitten die Endpunkte

der Hauptaxe liegen, durch das zweier Seitenflächen, die Seiten (g) gebildet. In der Mitte dieser liegt die eine Quersaxe, während die andere in den beiden Ecken, die durch die acht gleichen Nebenkanten (r), gebildet werden, in den Querscheiteln (a) ausgeht; die vier übrigen Ecken, an den Endpunkten der Seiten liegend, Seitenecken (u), sind gleich.

Fig. 14.



12) Gerade rhombische Säule: Fig. 14., besteht aus sechs Flächen, von denen die beiden Endflächen Rhomben, die vier Seitenflächen aber rechtwinkliche Parallelogramme sind.

Geograme, sind. Von den Ecken erscheinen vier spitz (i) und vier stumpf (o); jene schließen sich an den spitzen, diese an den stumpfen Winkel der rhombischen Endflächen an. Die Randkanten (h) umschließen die Endflächen. Die Seiten sind scharfe (g) oder stumpfe (h); jene liegen zwischen den spitzen, diese zwischen den stumpfen Ecken.

Fig. 15.

13) Schiefe rektanguläre Säule:

Fig. 15, ist aus sechs Flächen zusammengesetzt, aus zwei rektangulären Endflächen (P), zwei rektangulären Seitenflächen (M) und zwei rhomboidischen Seitenflächen (N). Von den acht Ecken sind vier spitz (i) und vier stumpf (o). Die vier Seiten (g) einander gleich. Zwischen den vier spitzen Ecken liegen zwei scharfe Randkanten (d), zwischen den vier stumpfen Ecken zwei stumpfe Randkanten (k), die übrigen vier Randkanten sind unter einander gleich und heißen Nebenrande (n); letztere schließen mit den Seiten die rhomboidischen Seitenflächen ein.


Fig. 16.

14) Schiefe rhombische Säule:

Fig. 16 und 17, von sechs Flächen umschlossen. Die Endflächen (P) sind Rhomben, die Seitenflächen (M) Rhomboide. Die acht Ecken lassen drei verschiedene Werthe wahrnehmen: zwei diametral gegenüberstehende sind spitz (i) und zwei ebenfalls diametral sind stumpf (o), die übrigen vier sind gleich und werden Seitenecken (n) genannt. Die vier Randkanten, welche zwischen einer spitzen und einer Seitenecke liegen, sind scharfe Rande (d), die anderen vier stumpfe Rande (k). Von den vier Seiten sind zwei Mittelseiten (s) und zwei Nebenseiten (v), jene verbinden eine der spitzen und eine der stumpfen Ecken, diese zwei Seitenecken mit einander. Die Verschiedenheit der rhombischen Säulen unter einander liegt



Fig. 17.



sehr klein, so daß die Grundform noch deutlich erkannt werden kann, wie z. B. beim Würfel, an welchem die Ecken durch kleine Flächen ersetzt sind; zuweilen dehnen sich dieselben aber beträchtlich aus, oft so, daß die primären Flächen ganz verschwinden und eine andere Form, wie z. B. aus dem Würfel das regelmäßige Octaeder entsteht, wenn die Flächen an den Ecken austretend, die primären Flächen verdrängen. Fig. 24. 25. 26. 27.

§. 30.

Es sind diese Veränderung der Grundform, jedoch nicht zufällig, sondern gewissen bestimmten Gesetzen unterworfen. Und zwar

1) dem Ebenmaß-Gesetze, nach welchem bei einem Krystall, wenn er an den Kanten oder Ecken auf irgend eine Weise modificirt ist, diese Veränderung im Allgemeinen auf allen ähnlichen und gleichen Ecken und Kanten statt finden muß. Die neuen Flächen an gleichen Theilen austretend, sind wieder unter einander gleich. Hieraus geht die Nothwendigkeit der genauen Beachtung der verschiedenen Theile jener Grundformen hervor.

Hiermit steht im genauesten Verbande das Gesetz der Gleichheit der Dimensionen-Verhältnisse, oder der gleichen Größe der verschiedenen Arten bei allen Krystallen eines Minerals und die damit zusammenhängende Gleichheit analoger Winkel bei einer Krystall-Varietät. Dieses Gesetz gründet sich auf die Beobachtung, daß eine secundäre Fläche, ihre Lage sey, welche sie wolle, mit den primären Flächen nicht jeden Winkel, ohne Unterschied machen könne, da diese von den relativen Dimensionen der Grundgestalt abhängen. Aus diesem ergibt sich, daß nur die Dimensions-Verhältnisse der Formen des Tetragonal-Systems bestimmt sind und auf keine Weise verschieden seyn können, wogegen die der anderen Systeme unter sehr abweichenden relativen Werthen bei verschiedenen Mineralien vorkommen können. Bei den Formen des Tetragonal- und des Hexagonal-Systems sind zwei, bei dem rhombischen, klinorhombischen und klinorhomboëdischen Systeme sind drei Dimensions-Verhältnisse zu bestimmen. Diese Bestimmungen werden aus den Neigungswinkeln der Abänderungen zu den Grundflächen berechnet.

2) dem Polaritäts-Gesetze, vermöge welchem gewisse gleiche Theile einer der Grundformen, diametral oder diagonal

gegenüber liegend; sich als ungleich verhalten, so daß bei einer zukommenden Modification derselben nur die Hälfte jener Theile hinweggenommen wird. So erhalten wir z. B. bei der Blende, durch polarische Hinwegnahme der Rhomboeder-Scheitel des Raute-Dohtaeders, welches als Kernform bei ihr gilt, das Tetraeder. Gerade beim Tetraeder-Systeme ergeben sich die meisten Fälle, wo dieses Gesetz keine Anwendung findet.

S. 31.

Die Sprache, welcher wir uns zur Bezeichnung der Modificationen einer Kernform bedienen, ist die, welche von Leonhard in seinem Handbuche der Orthognose aufstellte, indem er den Namen der ungränderten Ecke oder Kante mit Vorsetzung der Sylbe ent in ein Participium verwandelt, also Entkantung, Enteckung; ist aber eine Kante oder Ecke durch zwei oder mehrere Flächen ersetzt, so drückt man dieß durch Vorsetzung der Zahl, also zweifach, dreifach u. s. w., enteckt oder entkantet aus. Da nun Ecken und Kanten bei einer oder der andern der verschiedenen Grundformen oft ganz verschiedenen Werth haben, so muß man hier die Terminologie, welche bei Beschreibung derselben aufgestellt wurde, zu Rath ziehen und genau beachten. Wenn demnach z. B. das quadratische Ohtaeder die Kernform eines Minerals ist, und man fände hier, statt der Scheitel und Scheitellanten, Flächen, so würde man diese Modification so ausdrücken, indem man sagte, dasselbe sey entseitelte und entseitelkantet u. s. w.

Die genauere Angabe der Richtung, jener neuen Flächen wird in gewissen Fällen nothwendig; z. B. Tetraeder dreifach enteckt in der Richtung der Flächen oder der Kanten. — Liegen die neuen Flächen bei Ohtaedern und Rhomboedern der Hauptaxe parallel, daß säulenartige Körper entstehen, so setzt man zur näheren Bezeichnung die Worte zur Säule bei, z. B. Rhomboeder entrandet zur Säule. — Bilden zwei abgeleitete Flächen bei ihrem Zusammentreffen eine Kante, oder mehrere eine Spitze, so wird dieß im ersten Fall durch den Beisatz: zur Schärfung, im zweiten durch den zur Spizung, näher bezeichnet, z. B. gerade rhombische Säule entstumpfekt zur Schärfung über den Endflächen; gerade quadratische Säule enteckt zur Spizung. —

Sind die Kernflächen einer Grundform durch irgend eine Modification gänzlich verschwunden, so sagt man z. B. quadratisches Octaeder entsteht und entrandet bis zum Verschwinden der Kernflächen.

Es ist zwar gegen diese Sprache, namentlich gegen die neuen und langen Worte, hier und da manche Einwendung gemacht, als kein keine andere, bessere dafür substituirt worden; auch gibt es Wort-Einführungen in der heutigen Mineralogie, die noch barbarischer sind, ohne gerade so dem Gegenstande zu entsprechen; Jedem aber sind zwar zum Schreiben kürzer, beim Ausdrücken in der Sprache jedoch nicht leicht verständlich; weswegen wir es nicht Eintreten ungedachtet, und auf eigene, die Zweckmäßigkeit derselben betreffende Erfahrungen gestützt, dieselbe beibehalten wollen. (S. 52.)

Durch das Vorgehende wurde gezeigt, wie alle Krystallformen eines und desselben Minerals auf eine Kernform zurückgeführt werden; allein ob dies geschehen kann, muß das Gange der Bildung und die vorhandenen Krystall-Formen des Minerals genau untersucht, und bestimmt werden, zu welchem Krystall-System diese gehören, wobei man vor Allem auf die Symmetrie des resultirenden Flächen zu sehen hat. Wir wollen dies durch ein Beispiel erläutern: es liege ein Mineral in einem Octaeder krystallisiert vor uns, zwei Ecken desselben aber sehen durch Flächen bedeckt; es fragt sich nun, welcher Art von Octaedern gehört es an? ein regelmäßiges kann es nicht seyn, sonst müßten alle sechs Ecken verschwunden seyn; die neuen Flächen können Quadrate, Rhomben oder Rechtecke seyn, wird dieses, nebst den Rand-Kanten-Winkeln beachtet, so wäre das Octaeder im ersten Fall ein quadratisches, im zweiten ein rhombisches und im dritten ein rechteckiges. Geht man auf diese Weise die verschiedenen Krystall-Modificationen eines Minerals durch, so wird man mit Inverläßigkeit bestimmen können, in welches System dieselben gehören. Ist dies geschehen, so muß eine Form des Systems als Grundform gewählt werden, welche Wahl durchaus nicht gleichgültig ist. Es gibt zwei Regeln, welche man in dieser Hinsicht beobachtet.

1) Besitzt das Mineral Theilbarkeit, so wird diejenige Form,

welche man durch dieselbe am reinsten und constantesten hervorbringt, als Grundgestalt angenommen. Hier kann zum ersten Mal vorkommen, daß das Mineral in der Kernform selbst nicht krystallisiert gefunden wurde; jedoch verdient diese Art der Bestimmung der Kernform jedenfalls den Vorzug, weil sie in dem innern Bau des Minerals begründet ist.

2) Besitzt das Mineral keine oder sehr unvollkommene Theilbarkeit; so wird entweder die Krystallform, welche am meisten vorkommt, oder besser die, von welcher sich die übrigen Modificationen am leichtesten ableiten lassen, zur Grundgestalt gewählt.

§. 33.

Eine sehr interessante Erscheinung in dem Mineralreiche ist das Vorkommen von Hemitropieen, Zwillingsskrystallen, welches sich ausdrückt durch das Verwachsenseyn zweier Individuen eines und desselben Minerals, nach bestimmten Regeln, so daß sie ein Ganzes ausmachen. Sie lassen sich in vielen Fällen an den einspringenden Kanten erkennen, welche durch das Verwachsenseyn entstehen.

Die Zwillingssbildung spricht sich theils als ein Aneinander- oder Zusammen-Gewachsenseyn, theils als ein Durchdringenseyn oder in einer Durchwachsung beider Individuen aus. Die Verbindung derselben nach der ersten Weise gewinnt das Ansehen, als ob sie aus zwei Hälften eines und desselben Krystalls bestünde, von welchem die eine Hälfte in umgekehrter Lage an die andere gefügt sey; Hornblende, Gypsspath, weßwegen man diese auch Hemitropieen nennt.

Uebrigens sind die Individuen bei einer oder der anderen Zwillingssbildung stets, hinsichtlich ihrer Krystallform, einander gleich, und nur gegen einander verdreht haben sie daher eine der Aen, Chabasie, oder doch gewisse Flächen, Feldspath, mit einander gemein.

Geordnete Aneinanderfügungen von mehr als zwei Individuen werden Drillinge, Vierlinge u. s. w. nach der Zahl derselben genannt.

§. 34.

Bei dem, was bisher über die Krystalle gesagt wurde, setzten wir stets vollkommene Formen, gleich regelrecht gefertigten

Modellen, voraus, allein die Erfahrung lehrt uns, daß wir diese in der Natur selten finden, und daß man sich, will man mit dem Bestimmen der Mineralkörper vorsehreiten, an die Unvollkommenheiten der Krystallgestalten gewöhnen müsse. Diese spitzt sich entweder in der Beschaffenheit der Gestalt oder der Oberflächen aus; letztere sollte stets glatt und eben seyn, aber dieß ist nicht oft der Fall, sondern sie läßt Unvollkommenheiten wahrnehmen, die später noch, bei Betrachtung der Oberfläche der Mineralien überhaupt berührt werden sollen.

Die Form der Krystalle leidet in häufigen Fällen durch, als zugroße Ausdehnung einzelner Flächen im Verhältniß zu den übrigen, so daß oft schwierig zu erkennende Gestalten entstehen, was besonders dann geschieht, wenn ein oder die andere Fläche gänzlich verdrängt wird, wodurch Platten, Radeln u. s. w. hervorgerufen werden. Die Flächen des Würfels erscheinen als Nocken etc. Ferner wird bei den Krystallen eine Unregelmäßigkeit bewirkt, durch die Ausdehnung in der Richtung ihrer Axen; so entstehen beim regelmäßigen Oktaeder, durch die Ausdehnung nach einer Ase hin, an zwei Ecken Kanten. Oft findet man die Flächen der Krystalle gekrümmt, oder die Kanten derselben ganz zugerrundet, wodurch diese manthmal ein gestofftes oder geschwobenes Ansehen erlangen; Hornblende, Kolophonit, Apatit-Krystalle u. s. w.

S. 35.

Häufiger noch werden Unvollständigkeiten der Umrisse bei den Krystallen beobachtet, denn selten kommen dieselben ringsum ausgebildet und isolirt vor, meist sind sie auf eine oder die andere Weise mit der sie umgebenden Masse oder unter einander verbunden. In ersterer Hinsicht findet man sie entweder einzeln oder aufgewachsen, je nachdem die Umgebung alle oder nur einzelne Theile berührt, so daß der Krystall im letzteren Falle frei über denselben hervorragt.

Durch das Verbundenseyn mehrerer Krystalle entstehen Gruppirungen. Man unterscheidet Krystall-Gruppen und Krystall-Drusen. Unter ersteren versteht man das Zusammengewachsenseyn zweier oder mehrerer Krystalle auf die Weise, daß einer derselben die Unterstüzung der andern ausmacht; wenn dagegen mehrere auf- und durcheinander gewachsene Krystalle eine

gemeinschaftliche Unterlage haben, so nennt man diese Art unregelmäßige Verbindung, Krystalldruse.

§. 36.

Aus dem, was eben über die Unvollkommenheiten der Krystalle angeführt wurde, ergibt sich, daß die Kenntniß derselben für die Wissenschaft von keinem großen Werth wäre, wenn wir nicht in der unveränderlichen Lage ihrer Flächen ein bestimmtes Gesetz hätten, das uns stets über die Form außer allen Zweifel setzt. Die gegenseitige Lage der Flächen bleibt, bei aller Verschiedenheit der Größe und der Figur derselben, stets die nämliche bei den verschiedenen Krystallen eines und desselben Minerals. Die Winkel, welche durch das Schneiden der Flächen entstehen, die Kantewinkel sind somit constant und eine Messung derselben zur Bestimmung der Krystallgestalten eines Minerals durchaus nothwendig. Diese Messung geschieht durch eigene Instrumente, Geniometer genannt, deren Anwendung theils auf bloß mechanischen, theils auf optischen Grundsätzen beruht. Anlege- und Reflexions-Geniometer.

Eine Einschränkung leidet dieses Gesetz durch Mitscherlich's Beobachtung, daß Krystalle, die nicht dem regulären Systeme angehören, in verschiedenen Temperaturen Winkel-Veränderungen erfuhren, die von 0 Grad bis 100°, 10 — 12' und bis zur Siedehitze des Pels 20' betragen. Der Grund liegt wohl in der ungleichen Ausdehnung der Axen. Die Winkel eines Minerals sind daher nur bei gleicher Temperatur beständig. Aber der Unterschied der Temperatur, bei welcher wir gewöhnlich messen, ist unbedeutend, so daß die Differenzen höchstens 1 — 2' betragen können.

§. 37.

Die nichtkrystallisirten Mineralien sind entweder solche, bei denen man Andeutungen oder Spuren einer regelmäßigen Bildung findet, oder solche, bei denen dieß nicht der Fall ist. Erstere werden krystallinische oder nachahmende Gestalten, in sofern sie Aehnlichkeit mit der Form anderer Gegenstände besitzen, die andern zufällige Gestalten genannt.

§. 38.

Die krystallinischen Gestalten scheinen durch gestörte oder gehemmte Krystallisation entstanden zu seyn, so daß sie als

§. 41.

Pseudomorphosen oder Aelterkrystalle sind zufällige regelmäßige Gestalten, die dem Minerale, welche es zeigt, nicht zukommen. Es werden nach ihrem Entstehen drei Arten von Pseudomorphosen unterschieden:

1) **Ausfällungs-Pseudomorphosen**: sie entstehen, wenn Krystalle eines Minerals durch irgend eine Ursache zerstört, einen regelmäßig geformten Raum in der umhüllenden Masse zurücklassen, und dieser dann durch andere Mineral-Substanz erfüllt wurde. Diese liegen nun entweder in jener Masse eingeschlossen oder erscheinen aufgewachsen, wenn dieselbe verschwunden ist; sie sind in ihrem Innern oft hohl und drusig, aber die Oberfläche zeigt sich nie rauh. Hornstein in Formen von Kalkspath.

2) **Umhüllungs-Pseudomorphosen**; sind Inkrustationen oder Ueberzüge, die sich um vorhandene Krystalle gleichmäßig anlegten und deren Form annahmen. Die Oberfläche ist gewöhnlich rauh oder drusig, ihr Inneres oft hohl, wenn die Krystalle verschwunden sind, über welche sie sich gebildet haben; zuweilen findet man auch eine pulverartige Masse in denselben. Quarz über Flußspath-Krystallen gebildet.

3) **Umbildungs-Pseudomorphosen**; sie werden durch Umwandlung oder Veränderung der Substanz von Krystallen hervorgerufen, ohne daß die äußere Form darunter leidet. Umwandlung von Eisenkies-Krystallen in Braun-Eisenstein, von Kupferglasur in Malachit. Bei den meisten Pseudomorphosen dieser Art sind die ursprüngliche Spaltbarkeit und die anderen Eigenschaften des umgewandelten Minerals gänzlich verschwunden, und neue an ihre Stelle getreten.

§. 42.

Haben die Mineralien, von dem Orte ihrer Entstehung weggerissen durch mechanische Einwirkung, durch Reibung, Abschleifung oder Zertrümmerung, ihre ursprüngliche Form verloren, also eine andere zufällige Gestalt erhalten, so bezeichnet man diese durch verschiedene Ausdrücke. Hierher gehören: runde und scharf- oder stumpfartige Stücke, Geschiebe, Gerölle; rundliche, platte oder eckige Körner, Sand, Staub.

§. 43.

Krystallisirte wie nicht krystallisirte Mineralien lassen hin-

sichtlich ihrer Oberfläche Verhältnisse wahrnehmen, die bei einer Beschreibung derselben berücksichtigt werden müssen. Die Oberfläche ist nämlich

1) **glatt oder eben**, wenn keine Erhabenheiten oder Vertiefungen zu bemerken sind. Hierher gehören auch die sogenannten Spiegel, die durch Reibung einer Mineral-Substanz an der andern entstanden seyn mögen.

2) **Uneben**, wenn verschiedene Erhöhungen oder Vertiefungen vorhanden sind.

3) **Rauh**, wenn sie mit unregelmäßigen stumpfen Erhöhungen versehen ist.

4) **Gekörnt**, wenn kleine körnerförmige Erhöhungen zu bemerken sind.

5) **Gestreift**, wenn linienähnliche, stärkere oder schwächere Vertiefungen, die bald einer oder mehreren Richtungen folgen, vorhanden sind. Schneiden sich diese Streifungen unter gewissen Winkeln, so entsteht das Federartige.

6) **Drusig**, wenn sie mit sehr kleinen krystallinischen Erhabenheiten versehen ist.

Hierher gehören ferner zerfressene, löcherichte, geschmolzene Oberflächen u. s. w.

II. Physikalische Kennzeichen.

§. 44.

Unter physikalischen Kennzeichen versteht man diejenigen, welche bei solchen Untersuchungen der Mineralien wahrgenommen werden, die keine Veränderung in der Mischung bezwecken und die Form derselben nicht berücksichtigen. Diese Untersuchungen müssen nun entweder durch kleine Versuche, wobei zuweilen das Mineral eine Veränderung in der Masse (Härte) erleidet, bewerkstelligt werden, oder die Wahrnehmung einzelner Eigenschaften ist geradezu gestattet.

Es gehören hierher: Kohärenz, Schwere, optische Eigenschaften, Phosphoreszenz, Electricität, Magnetismus.

1) Kohärenz-Verhältnisse der Mineralien.

§. 45.

Unter Kohärenz versteht man den innern Zusammenhalt

der Substanzen, der sich durch den größeren oder geringeren Widerstand zu erkennen gibt, welchen er jeder mechanischen Theilung derselben entgegensetzt. Dieser Eigenschaft nach sind die Mineralien entweder fest (starr) oder flüssig; jene lassen noch verschiedene Modificationen dieser Eigenthümlichkeiten wahrnehmen; während man bei diesen nur einen größeren oder geringeren Grad mit Strenge oder Leichtflüssigkeit bezeichnet.

§. 46.

Die mechanische Verbindung, in welcher die Theile eines einfachen Minerals sich befinden, heißt Struktur oder Gefüge. Diese Verbindung spricht sich auf verschiedene Weise aus, indem sie nach gewissen Seiten hin stärker ist, als nach andern, so daß man bei mechanischer Theilung des Minerals gleichartige Theile, mit glatten Flächen begränzt, erhält, wenn man in der Richtung spaltet, wo der Zusammenhalt minder stark ist, während es unregelmäßige, unebene Bruchflächen zeigt, wenn man die Trennung dieser Richtung entgegen vornimmt. Die erstere Art wird regelmäßige Struktur oder Spaltbarkeit, Theilbarkeit, die andere unregelmäßige Struktur oder Bruch genannt.

§. 47.

Die Spaltbarkeit hängt mit der Natur der Mineralien innig zusammen, das Streben regelmäßiger Bildung hat sich auch im Innern derselben ausgesprochen, aber bei den verschiedenen Mineralien in sehr verschiedenem Grade. Einige sind sehr leicht theilbar und springen schon beim Zerschlagen in Stücke, nach allen Seiten mit ebenen Flächen begränzt (Kalkspath), andere lassen sich nur in gewissen Richtungen mehr oder minder leicht spalten, manche selbst zu den dünnsten Blättchen (Glimmer). Auch gibt es Mineralien, bei welchen man weder Theilbarkeit, noch die geringste Andeutung, wie z. B. Streifen oder inneren Reflex, welche darauf hinweisen, entdecken kann (Obsidian).

Die Flächen, welche durch die Spaltung entstehen, werden Theilungs- oder Spaltungsflächen genannt. Sie schneiden sich unter bestimmten Winkeln und sind durch Gestalt und Richtung von einander unterschieden. Die Theilung selbst wird mit seinen Meißeln, oder mit andern dazu tauglichen Instrumen-

ten vorgenommen; die Richtung, nach welcher sie geschnitten, heißt die Spaltungsrichtung, der Durchgang oder Blätterdurchgang. Die Durchgänge sind stets einer der Flächen einer Krystallform parallel, die dem theilbaren Minerale angehört. Die Theilbarkeit ist jedoch von der äußeren Form gänzlich unabhängig, und bei allen Krystallformen einem und demselben Mineral angehörig, immer dieselbe. Eine von Theilungsflächen umschlossene Gestalt, wird Theilungs-Gestalt, Grundform genannt, in sofern sich nämlich von ihr alle Krystall-Varietäten einer Mineral-Substanz abgeleitet werden (s. S. 32). Durch die Theilbarkeit, da sie auch bei nicht krystallisirten Mineralien vorkommt, wird man in Stand gesetzt, das Krystallsystem solcher Mineralien zu bestimmen, die noch nicht in Krystallen gefunden wurden; daher sie auch in manchen Fällen zum Erkennen einer Mineral-Species führt. Die Richtung der Theilbarkeit muß aus diesem Grunde immer bei Beschreibung eines Minerals angegeben werden.

Nicht krystallisirte Mineralien, die sehr deutliche Theilbarkeit besitzen, werden blätterig genannt. Doch darf diese Blätterige nicht mit dem durch Aggregation entstandenen (s. S. 38.) verwechselt werden.

S. 48.

Die unregelmäßige Flächen, welche ein Mineral bei seiner Theilung nach den Richtungen, wo keine Spaltbarkeit stattfindet, erhält, werden Bruchflächen oder auch Bruch genannt. Er ist bei allen Mineralien vorhanden, zeigt sich aber auf verschiedene Weise; nämlich

- 1) eben, wenn die Bruchfläche frei erscheint von Erhabenheiten und Vertiefungen;
- 2) uneben, wenn Erhabenheiten und Vertiefungen auf derselben wahrnehmbar sind.
- 3) muschelrig, wenn die Bruchflächen Aehnlichkeit mit der Vertiefung einer Muschel haben. Man unterscheidet vollkommen- und unvollkommen-, groß- und klein-, tief- und flachmuschelrig;
- 4) splitterig, wenn sich auf den Bruchflächen kleine splitterförmige Theilchen zeigen, die noch mit der Masse zusammenhängen, fein- und grobsplitterig;

b) hackig, wenn die Bruchfläche kleine gekrümmte Spitzen wahrnehmen läßt;

6) erdig, wenn auf den Bruchflächen eine Menge kleiner Unebenheiten sich zeigen, hervorgerufen durch staubartige Theile.

§. 49.

Die Absonderung ist eine Erscheinung, die nur bei den zu einem Ganzen vereinten Mineralien, bei den Aggregaten vorkommt, und in der Textur oder in der Art der Zusammensetzung der einzelnen Individuen ihren Grund hat; sie gibt sich häufig schon durch feine Klüfte oder Risse zu erkennen, nach welchen sich dann die Theile mehr oder minder leicht beim Zerschlagen trennen. Es werden daher die körnigen, schaligen oder stänglichen Aggregate, auch körnige, schalige oder stängliche Absonderung zeigen.

§. 50.

Unter Härte versteht man in der Mineralogie den Widerstand, welchen ein Mineral dem Angriff oder dem Reizen eines anderen Minerals oder einem schneidenden Instrumente entgegensetzt. Diese Eigenschaft kann in vielen Fällen zur Unterscheidung verschiedener Substanzen führen; aber es kann die Bestimmung derselben nur vergleichungsweise stattfinden. Denn einmal läßt sich keine beständige Einheit auffinden, um die verschiedene Härtegrade nach derselben auszudrücken, und dann nimmt man auch bei einer Mineral-Substanz zuweilen nach verschiedenen Richtungen hin verschiedene Härtegrade wahr, so daß eine Bestimmung derselben mit vollkommener Sicherheit nicht leicht ausführbar ist. Es wird jedoch nur eine vergleichende Bestimmung dieser Eigenschaft nöthig und diese geschieht entweder dadurch, daß man das zu untersuchende Mineral mit einem anderen Körper, Mineral, Feile reibt, oder mit diesem ein anderes Mineral zu reizen sucht.

Auf dieser Methode beruht die Begründung einer Härtescala, indem man mehrere Mineral-Substanzen von ungefähr gleichen Härte differenzen in eine Reihe stellt, von denen jedes folgende das vorhergehende reibt, von diesem aber nicht geritzt wird. Mohs hat folgende Scala aufgestellt:

- 1) = Talc,
- 2) = Gyps oder Steinsalz,
- 3) = Kalkspath,
- 4) = Flußspath,
- 5) = Apatitspath,
- 6) = Feldspath,
- 7) = Quarz,
- 8) = Topas,
- 9) = Korund,
- 10) = Diamant.

Die Härtegrade werden durch die ihnen vorgesetzte Zahlen ausgedrückt, das Resultat der Vergleichung mit andern Mineralien durch Dezimaltheile, so daß z. B. der Härtegrad beim Idocras = 6,5, als in der Mitte stehend zwischen Feldspath und Quarz angegeben wird. Auf diese Scala wird sich im Folgenden durchgängig bezogen werden. Beim Erproben der Härte muß darauf gesehen werden, daß man sich so viel wie möglich frischer und reiner Stücke bedient; der Versuch selbst geschieht auf die Weise, daß man mit einer scharfen Kante oder Ecke eines gegebenen Minerals die Glieder der Scala zu reihen versucht, und zwar so, daß man von den härtern zu den weniger harten übergeht, hierdurch wird man auf die Härte desselben geleitet werden.

§. 51.

Spröde ist ein Mineral, in dem sich jede gewaltsame Unterbrechung des Zusammenhangs von selbst, meist mit vieler Hefigkeit, nach allen Richtungen fortpflanzt, und im Aufspringen von Stücken oder Splintern oder im Bilden von Rissen ausspricht.

Die **Geschmeidigkeit** eines Minerals ergibt sich aus dem Verhalten desselben gegen eine schlagende oder schneidende Kraft, indem dabei nur soweit eine Unterbrechung des Zusammenhanges statt findet, als das Instrument eingedrungen ist, ohne daß dabei Splinter oder Pulver entstehen. Die **getrennten Theile** behalten ihren Zusammenhang. **Dehnbarkeit** eines Minerals ist die Eigenschaft desselben, sich unter dem Hammer strecken oder zu Draht ziehen zu lassen, ohne den Zusammenhang zu verlieren. **Milde** ist ein Mineral, bei welchem die Unterbrechung des Zusammenhangs sich nur wenig fortpflanzt; es läßt sich leicht schneiden,

ist oft zerreiblich und bildet ein Pulver. Mit dieser Eigenschaft ist sehr oft das Abfärben verbunden; die Theile hängen so lose zusammen, daß sie schon bei der Berührung an dem anderen Körper haften bleiben.

Die Eigenschaft eines Minerals mehr oder minder, in dickern oder dünnern Blättchen gebogen werden zu können ohne zu zerbrechen, heißt Biegsamkeit. Elastisch ist dasjenige Mineral, das seine erstere Gestalt mit einer gewissen Gewalt wieder annimmt, sobald die Kraft zu wirken aufhört, welche es gebogen hat.

Unter Zersprengbarkeit der Mineralien versteht man den Widerstand, welchen dieselben beim Zerschlagen mit dem Hammer leisten. Diese Eigenschaft steht mit Härte und Geschmeidigkeit nicht immer in geradem, oft im umgekehrten Verhältniß; so ist z. B. Obsidian bei weitem härter als dichter Gyps, und doch ist er leichter zersprengbar als dieser. Die Struktur der Mineralien hat den meisten Einfluß auf diese Eigenthümlichkeit.

2. Schwere.

S. 52.

Es bedarf keiner weitläufigen Untersuchung; um darzuthun, daß die Mineralien verschiedene Schwere unter einander haben, auch wenn sie von gleichem Körper-Inhalte sind. Zwei gleich große Würfel von Bleiglanz und von Quarz werden sehr verschiedene Schwere zeigen; aber im Wasser gewogen, verlieren beide gleich viel von ihrem Gewicht, und dieser Verlust ist so groß, als das Gewicht der Wassermenge beträgt, die der Würfel aus seiner Stelle drängt; die also den Raum desselben füllt. Die Methoden, das eigenthümliche oder specifische Gewicht der Mineralien zu bestimmen, beruhen auf dieser Erfahrung. Man vergleicht das Gewicht der Mineralien mit dem des Wassers und nimmt letzteres als Einheit = 1,000... an, so daß also das specifische Gewicht eines Minerals bestimmen, eben so viel heißt, als angeben, wie viel schwerer oder leichter dasselbe ist als Wasser.

Zur Bestimmung des specifischen Gewichts der Mineralien bedient man sich der hydrostatischen Wagen oder der Areometer. Erstere sind bei sehr genauen Bestimmungen unentbehrlich; von andern Wagen unterscheiden sie sich nur durch ihre Feinheit und

Empfindlichkeit; unter der einen Waagschale ist ein Haken angebracht, in den man das Mineral mittelst eines Haares befestigt um es im Wasser zu wiegen. Man verfährt nun auf folgende Weise: das Mineral wird in der Luft und im Wasser gewogen, und das Gewicht in der Luft durch den Verlust, welchen es im Wasser erlitten, dividirt. Es wiege z. B. ein Mineral in der

$$\text{Luft} = 29,40$$

$$\text{im Wasser} = 17,15 \text{ so würde}$$

$$\text{der Verlust} = 12,25 \text{ seyn,}$$

wodurch das Gewicht einer gleich großen Wassermenge gegeben ist, welche das Mineral aus ihrer Stelle verdrängt hat. Setzt man nun das specifische Gewicht des Wassers = 1,000, so erhält man folgende Gleichung:

$$12,25 : 29,50 = 1,00 : x$$

$$x = \frac{29,40}{12,25} = 2,4 \text{ welches}$$

$$12,25$$

das specifische Gewicht des gewogenen Minerals wäre. — Nimmt man die Wiegung mit dem Areometer vor, so erhält man keine so genaue Resultate, auch ist schwieriger mit demselben zu operiren.

Die Stücke, welche man zum Bestimmen des specifischen Gewichts anwendet, müssen rein, von allen fremdartigen Substanzen befreit seyn; und die Wägung selbst bei einer Temperatur des Wassers von 14° R. statt finden. Die Resultate, welche man bei Bestimmungen des specifischen Gewichts von verschiedenen Stücken eines und desselben Minerals erhält, sind oft verschieden; man geht daher, entweder das Mittel aus verschiedenen Wägungen, oder die Schwankung selbst an.

3. Optische Eigenschaften der Minerale.

S. 53.

Diejenigen physikalischen Eigenschaften der Mineralien, welche in ihrem Verhalten gegen das Licht begründet sind, werden optische Eigenschaften derselben genannt. Es gehören hierher: Durchsichtigkeit, Strahlenbrechung, Glanz, Farbe und einige andere Licht- und Farben-Erscheinungen.

a. Durchsichtigkeit.

S. 54.

Unter Durchsichtigkeit der Mineralien versteht man die Ei-

genschaft derselben, dem auf sie fallenden Lichte den Durchgang zu gestatten. Es gibt verschiedene Grade derselben, welche auf folgende Weise unterschieden und bezeichnet werden:

1) Durchsichtig ist ein Mineral, wenn man einen Gegenstand, der durch dasselbe betrachtet wird, genau sehen kann, wie z. B. durch Glas; tritt hierzu Farblosigkeit, so nennt man das Mineral wasserhell.

2) Halbdurchsichtig ist ein Mineral, wenn der durch dasselbe beobachtete Gegenstand zwar wahrgenommen, jedoch nicht mit deutlichen Umrissen gesehen werden kann.

3) Durchscheinend, wenn das Mineral in größeren Stücken nur einen einförmigen Lichtschein durchschimmern, aber den dahinter befindlichen Gegenstand nicht erkennen läßt.

4) An den Kanten durchscheinend ist das Mineral, wenn nur die dünnen Kanten oder einzelne Splitter desselben Licht durchschimmern lassen.

5) Undurchsichtig ist ein Mineral, wenn es selbst an dünnen Kanten und in Splittern kein Licht durchschimmern läßt.

Ein Mineral - Species kann zuweilen verschiedene Grade von Durchsichtigkeit besitzen, diese werden angegeben, indem man z. B. sagt: dieses Mineral ist durchscheinend bis halbdurchsichtig u. s. w.

b. Strahlenbrechung.

§. 55.

Gegenstände, durch Flüssigkeiten oder Glas betrachtet, erscheinen stets auf ihrem wahren Platz, wenn der Lichtstrahl sowohl bei seinem Einfall als bei seinem Ausgang senkrecht auf den Flächen des Körpers ist, trifft derselbe aber in schiefer Richtung auf die Oberfläche des Körpers, oder wird der Ausgang in Folge der Lage der Flächen zu einander modificirt, so findet eine größere oder geringere Abweichung in der Stellung des Gegenstandes statt. Aus diesem geht die besondere Wirkung hervor, welche durchsichtige Körper auf das durchfallende Licht üben, in deren Folge also jeder schiefe Lichtstrahl seine Richtung beim Eindringen in den Körper verändert und wie gebrochen erscheint. Diese Erscheinung wird Strahlenbrechung oder Refraction genannt, ist jedoch nur bei reinen Mineralsubstanzen als Kennzei-

chen von Anwendung. Man hat zu beachten die Größe der Abweichung des Lichtstrahls bei gleichem Einfallswinkel desselben, indem sich diese eben bei verschiedenen Mineralien verschieden zeigt.

§. 56.

Es gibt jedoch auch Mineralien, die den Lichtstrahl bei festem Einfallen nicht nur brechen, sondern ihn sogar in zwei Theile trennen, welche verschiedene Richtungen einschlagen, so daß wenn man einen kleinen Gegenstand in gewisser Richtung und Entfernung durch ein solches Mineral betrachtet, dieser doppelt zu sehen ist; eine Erscheinung, welche doppelte Strahlenbrechung genannt wird; sie findet sich nur bei festen Mineralkörpern und steht mit deren Krystallisation im genauesten Verhältniß. Derjenige Strahl, welcher den gewöhnlichen Gesetzen der Brechung folgt, wird eigentlicher, der andere aber außerordentlicher oder abirrender Strahl genannt. Die Stärke der doppelten Strahlenbrechung wird nach der Entfernung der beiden Bilder, welche man bei verschiedenen Mineralien erhält, bei übrigens gleicher Größe der Stücke bemessen.

Mit der doppelten Strahlenbrechung steht die sogenannte Polarisation des Lichts in genauem Zusammenhange, indem durch letztere bestimmt werden kann, ob erstere bei einem Mineral vorhanden ist. Es würde uns zu weit führen, beide Eigenschaften genauer zu betrachten, zumal da ihre Beobachtung mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist.

c. Glanz.

§. 57.

Unter Glanz der Mineralien versteht man die durch Zurückwerfung oder spiegelnde Reflexion des Lichts auf den Flächen derselben hervorgebrachte Erscheinung, in sofern die Farben dabei ganz-unberücksichtigt bleiben. Man betrachtet diese Eigenschaft in Hinsicht der Art und der Stärke.

§. 58.

In Hinsicht der Art des Glanzes hat man besonders folgende allmälige Abstufungen desselben allgemein angenommen, indem man sie mit dem Glanze gewisser bekannter natürlicher oder künstlicher Körper verglich, und darnach benannte:

- 1) Metallglanz (Eisenkies),

2) Diamantglanz (Diamant).

3) Glasglanz (Smaragd).

4) Wachs- und Fettglanz (Bernstein, Pechstein).

5) Perlmutterglanz (Glimmer).

6) Seidenglanz (Fasergyps).

Es bedarf wohl nicht der Beschreibung dieser verschiedenen Modificationen, da die Körper, bei denen man sie am ausgezeichnetsten findet, allgemein bekannt sind.

§. 59.

Die Stärke des Glanzes hängt von verschiedenen Ursachen ab, namentlich von der mehr oder minder glatten Beschaffenheit der Oberfläche und von der Dichtigkeit oder Lockerheit der Körper. Der Glanz der Bruchflächen ist daher in der Regel minder stark, als der der reinen Krystall- oder Spaltungsflächen. Mit der Abnahme der Dichtigkeit verliert ein Mineral meist an Glanz; bei erdigen Mineralien wird daher der Glanz oft durch den Strich erhöht. Hieraus folgt, daß die Stärke des Glanzes von vielen Zufälligkeiten abhängt; doch unterscheidet man gewöhnlich folgende Grade:

1) stark glänzend, wenn die Flächen der Mineralien starke und lebhafte Bilder der Gegenstände spiegeln, Obsidian, Bleiglanz;

2) glänzend, wenn die Bilder neblig und matt, ohne scharfe Umrisse erscheinen, Barytspath;

3) wenig glänzend, wenn die Bilder nicht mehr zu unterscheiden sind und nur allgemeiner Lichtschein wahrzunehmen ist, Kupferglanz;

4) schimmernd, wenn der Lichtschein nur in einzelnen Punkten hervortritt, sonst aber nicht vorhanden ist, Bleischweif;

5) matt, wenn gar kein Glanz bemerkbar ist.

Manche Mineralien lassen zuweilen Uebergänge sowohl hinsichtlich der Stärke als der Art des Glanzes wahrnehmen, andere zeigen Verschiedenheit in dieser Beziehung an verschiedenen Flächen (Glimmer). An einigen erleidet der ursprüngliche Glanz durch Verwitterung eine Umänderung oder er verschwindet selbst ganz (Saumontit).

a) Farbe.

§. 60.

Die Farbe der Mineralien gehört zu ihren allgemeinsten Ei-

genschaften und fällt vor allen anderen in die Augen. Man unterscheidet farblose und farbige Mineralien. Für letztere hat man acht Stammfarben in der Mineralogie angenommen:

- 1) Weiß,
- 2) Grau,
- 3) Schwarz,
- 4) Blau,
- 5) Grün,
- 6) Gelb,
- 7) Roth,
- 8) Braun.

Diese acht Farbengattungen sind auf mannigfaltige Weise mit einander vermischt, gehen in einander über und bilden hiedurch die verschiedene Arten von Farben. Die Benennungen für letztere werden entweder aus den beiden Namen der vorherrschenden und beigemischten Farbe, wie z. B. bläulich-weiß, gebildet, oder aus dem Namen der Hauptfarben und desjenigen Gegenstandes zusammengesetzt, an welchem diese am ausgezeichnetsten erscheint, z. B. Emaragdgrün. Eine weitere Beschreibung der einzelnen Farben ist nicht nothwendig, die Unterscheidung derselben ergibt sich schon von selbst, und wird durch die beigefügte Farbentabelle deutlicher; letztere, obgleich sie in ihrer Ausführung den natürlichen, an den Gegenständen haftenden, Farben nicht gleichkommen wird, erleichtert jedoch den Gebrauch sehr, siehe Taf. 1.

§. 21.

Folgende Farbenarten sind vorzüglich zu beachten:

1) Weiß.

Schneeweiß, Carrarischer Marmor.

Röthlichweiß, Braunspath.

Gelblichweiß, Kreide.

Silberweiß, gediegen Silber.

Grünlichweiß, Talk.

Milchweiß, Opal.

Graulichweiß, Quarz.

Zinnweiß, gediegen Antimon.

2) Grau.

Bleigrau, Bleiglanz.

Stahlgrau, Gebiegen-Platin.

Perlgrau, Hornerz.

Aschgrau, Boist.

Rauchgrau, Feuerstein.

Grünlichgrau, Prehnit.

Gelblichgrau, Glimmer.

3) Schwarz.

Graulichschwarz, Kiefelschiefer.

Sammetschwarz, Obsidian.

Pechschwarz, Pechkohle.

Rabenschwarz, Hornblende.

Blaulichschwarz, schwarzer Erbkobalt.

4) Blau.

Berlinerblau, Disthen.

Indigblau, Blaueisenerde.

Lasurblau, Lasurstein.

Himmelblau, Türkis.

Smalteblau, erdige Kupferlasur.

Lavendelblau, Steinmark.

Violettblau, Amethyst.

5) Grün.

Spangrün, Chrysopras.

Seladongrün, Prasem.

Berggrün, Beryll.

Blaulichgrün, Beryll.

Smaragdgrün, Dioptas.

Apfelgrün, Chrysopras.

Grasgrün, Uranglimmer.

Pistaziengrün, Chrysolith.

Schwärzlichgrün, Augit.

Olivengrün, Olivenit.

Zeisiggrün, Uranglimmer.

6) Gelb.

Schwefelgelb, Schwefel.

Messinggelb, Kupferkies.

Strohgelb, Faser-Schwefel.

Speisgelb, Eisenkies.

Wachsgelb, Opal.

Citronengelb, Auripigment.

Goldgelb, Gebiegen-Gold.
 Ockergelb, Gelberde.
 Weingelb, Beryll.
 Isabellgelb, Bol.
 Fahlgelb, Bol.
 Pomeranzengelb, molybdänsaures Blei.
 Safrangelb, Gelb-Eisenstein.

7) Roth.

Syazinthroth, Syazinth.
 Karminroth, Kobaltbläthe.
 Purpurroth, Zirkon.
 Blutroth, Pyrop.
 Granatroth, Karniol.
 Scharlachroth, Zinnobererde, Realgar.
 Zinnoberroth, Zinnober.
 Mennigroth, Mennige.
 Ziegelroth, Ziegelerz.
 Karmoisinroth, Turmalin, Rubin.
 Kupferroth, Gebiegen-Kupfer.
 Pfirsichblüthroth, Kobaltbeschlag.
 Rosenroth, Quarz.
 Fleischroth, Apophyllit.
 Braunroth, Thoneisenstein.

8) Braun.

Kastanienbraun, Jaspis.
 Roßbraun, Braun-Eisenoeder.
 Zimmtbraun, Zirkon.
 Leberbraun, Jaspis.
 Gelblichbraun, Eisenkiesel.
 Tombackbraun, Glimmer.
 Tiefbraun, Umbra.

Zwischen diesen angeführten verschiedenen Farbenarten gibt es wieder eine Menge Mittelglieder, weshalb man zuweilen bei Beschreibung eines Minerals zur Bezeichnung derselben der Ausdrücke: sich verlaufen, sich nähern, die Mitte haltend u. s. w. bedient.

§. 62.

Das bisher Gesagte bezog sich nur auf die Art der Farbe,

obachten kann. Diese Erscheinung zeigt sich in blauen, grünen, gelben und rothen Farben, in manigfaltigen Nüancen, zuweilen mit metallischem Glanz verbunden, und wird *Farbenwandlung* genannt. Sie scheint in dem Struktur-Verhältniß der einzelnen Mineralien begründet zu seyn, und wird besonders deutlich am Labrador, Hypersthen und Schillerspath getroffen.

§. 69.

Es gibt Farben-Erscheinungen bei Mineralien, die durch Spalten oder Risse bewirkt werden, indem das Licht durch dieselben zerlegt wird, und sich im Innern der Masse mehr oder minder regelmäßige concentrische Farbenringe oder Farbenstreifen bilden, die aus rothen, blauen, grünen, gelben, 2c. Streifen oder Strahlen, einem Regenbogen ähnlich, bestehen, und deshalb *Früsiren* genannt werden. Solche Risse bilden sich meist durch gewaltsame Erschütterungen in den Mineralien und besonders bei solchen, die leicht gespalten werden können, sie lassen sich daher auch durch einen Schlag mit dem Hammer in denjenigen hervorbringen, in welchen sie noch nicht vorhanden waren. Kalkspath, Gyps, Bergkrystall.

§. 70.

Lichtschein. Einige Mineralien zeigen zuweilen einen einfachen wogenden Lichtschein in ihrem Innern, der besonders dann recht gut beachtbar ist, wenn sie durch Schleifen und Poliren eine convexe glatte Oberfläche erhalten haben. *Abusarfelspath, Chrysoberyll.* Diese Erscheinung scheint in der geringern Durchsichtigkeit der Mineralien durch eine beigemengte Substanz bewirkt (Schillerquarz), oder in einem faserigen Gefüge ihren Grund zu haben; sie wird zuweilen *Schillern* oder *Schieren* genannt. — Die in einem weißlichen, sechsstrahligen Stern bestehende Lichterscheinung, welche einige Abänderungen des Korunds, in der Richtung der Hauptaxe auf sie gesehen, wahrnehmen lassen, steht mit der Krystallisation derselben in genauem Zusammenhange. Es sind hauptsächlich die blauen Varietäten, *Saphire*, welche diese Erscheinung, besonders wenn sie etwas trübe sind, wahrnehmen lassen.

4. Phosphoreszenz.

§. 71.

Phosphoreszenz der Mineralkörper ist die Eigenschaft derselben, einen Lichtschein bei einer gewissen Behandlung zu entwickeln. Dieselbe wird hervorgebracht:

- 1) durch Anwendung mechanischer Mittel; durch Reiben mit einem spitzen Instrument, Dolomit, Blende; beim Quarz durch Reiben zweier Stücke aneinander, bei einigen Kalk- und Edelsteinarten durch Schlagen mit dem Hammer, durch Brechen oder Spalten, beim Diamant, Topas u. s. w. — Das Licht ist nur momentan, weiß oder farbig.
- 2) durch Erwärmung. Manche Mineralien leuchten schon bei geringem Wärmegrade, Flußspath, Diamant, andere bedürfen einer höheren Temperatur, um diese Eigenschaft zu entwickeln, Apatit, Kalkstein. Die Farbe des Lichts ist verschieden bei einzelnen Körpern, auch zeigen manche die Phosphoreszenz am ausgezeichnetsten, wenn man sie gepulvert der Hitze aussetzt. Andere Mineralkörper verlieren die Eigenschaft zu phosphoresziren, wenn sie einem hohen Hitzegrad ausgesetzt werden, während durch Reiben diese Eigenschaft noch hervorgebracht werden kann, ein Beweis, daß beide Arten der Phosphoreszenz unabhängig von einander sind.
- 3) durch Bestrahlung oder Insolation. Mehrere Mineralien besitzen die Eigenschaft einige Zeit der Sonne ausgesetzt, mehr oder minder stark auf längere oder kürzere Zeit im Dunkeln zu leuchten, Diamant, Strahlbaryt, Steinsalz, Bernstein.
- 4) durch Electricität. Einige Mineralien werden phosphoreszirend, wenn man electrische Funken eine Zeit lang durch sie schlagen läßt.

5. Electricität.

§. 72.

Die Electricität wird in den Mineralien entweder durch Reiben, Druck oder Wärme erregt, d. h. sie erhalten die Eigenschaft, bei Anwendung eines dieser Mittel, leichte Körper anzuziehen und abzustößen, im Dunkeln zuweilen zu leuchten oder selbst Funken auszustößen, wenn ihnen die Hand oder ein abgerundeter

ter metallischer Körper genähert wird. Alle Mineralien werden durch Reiben electrisch, und sind entweder Leiter oder Nichtleiter der Electricität; Nichtleiter: wenn sie unmittelbar vermittelst eines der erwähnten Mittel electrisch gemacht werden können; Leiter, wenn man sie, um ihnen diese Eigenschaft mitzutheilen, zuvor isoliren, d. h. auf einer Unterlage, z. B. von Glas, befestigen muß, welche das electrische Fluidum nicht durchläßt. Zur ersten Klasse gehören im Allgemeinen die nicht metallischen Mineralien und leichten Metalle, zur zweiten die schweren Metalle. Zur Beobachtung der Electricität dient gewöhnlich eine, mittelst eines Glashütchens auf einer Stahlspitze ruhende horizontale Metallnadel, die in zwei Kugeln ausläuft. Man reibt das zu untersuchende Mineral mit einem wollenen Tuch und bringt es in die Nähe des Instruments, zieht es die Nadel an, so ist es ein Nichtleiter, es wird dagegen durchaus keine Wirkung auf dieselbe hervorbringen, wenn es ein Leiter ist.

Durch Druck werden manche Mineralsubstanzen, wie der Doppelspath, ebenfalls electrisch.

S. 73.

Die durch Reiben in dem Glase erregte Electricität ist von der durch dasselbe Mittel im Harze hervorgerufen, verschieden; erstere wird positive (Glas-), die andere negative (Harz-) Electricität genannt. Wenn daher ein Mineral Glaselectricität besitzt, so sagt man, es sey positiv electrisch, zeigt es Harzelectricität, so heißt es negativ electrisch; nimmt man dagegen an einem Ende des Minerals positive, an dem anderen negative Electricität wahr, so wird es polarisch-electrisch genannt. Um nun die Art der Electricität auszumitteln, bedient man sich des eben angegebenen Instruments, isolirt es, und theilt ihm, mittelst einer Stange Siegellack, die man vorher gerieben hat, Harzelectricität mit, indem man eins der Enden der Nadel damit berührt. Bringt man nun das electrische Mineral der Nadelspitze nahe, so wird es dieselbe entweder anziehen oder abstoßen, im ersteren Falle wird das Mineral positiv, im anderen negativ electrisch seyn, weil sich die Pole gleicher Electricitäten abstoßen, ungleicher aber anziehen. Doch ist die Eigenschaft eine dieser Electricitäten anzunehmen, zum Theil zufällig, und leidet viele Ausnahmen. Der größere oder geringere Grad der Durchsichtigkeit, des Glanzes, der Glätte bei verschiedenen Stücken einer

und derselben Mineralsubstanz reicht hin, um eine verschiedene Art der Electricität hervorzubringen. So werden z. B. viele Edelsteine, je nachdem ihre Oberfläche glatt oder rauh ist, gerieben positiv oder negativ electrisch.

§. 74.

Durch Wärme wird die Electricität in mehreren Mineralien erregt und heißt dann Pyro- oder Thermoelectricität. Man bemerkt dabei, daß die beiden Enden eines Minerals sehr oft entgegengesetzte Electricität zeigen, Turmalin, Topas. Die erforderliche Temperatur ist bei den verschiedenen Mineralien verschieden (der Salmei ist schon bei gewöhnlicher Temperatur electrisch), liegt aber zwischen bestimmten Gränzen, denn wenn ein gewisser Wärmegrad überstiegen wird, hört alle Electricität auf.

§. 75.

Im Allgemeinen lassen die Mineralien Verschiedenheiten hinsichtlich der Electricität wahrnehmen, entweder in der Art, in der Weise der Hervorbringung, oder in der Fähigkeit, dieselbe mehr oder minder leicht anzunehmen, und in dem Vermögen, sie längere oder kürzere Zeit zu behalten. Der Doppelspath wird schon durch bloßen Druck mit den Fingern electrisch, während andere Mineralien mehr oder minder lang gerieben werden müssen. Der Topas behält 30 und mehr Stunden seine electrische Kraft, während der Bergkrystall dieselbe schon nach 10 Minuten verliert.

6. Magnetismus.

§. 76.

Die Eigenschaft auf die Magnetnadel einzuwirken, kommt nur wenigen eisenhaltigen Mineralien zu und ist für diese ein charakteristisches Merkmal. Sie wird ganz einfach auf die Weise untersucht, daß man das Mineral in die Nähe der Magnetnadel bringt, und sieht, ob es solche anzieht oder nicht, findet das Erstere statt, so ist auch Magnetismus vorhanden. Manche Mineralien zeigen sich polarisch-magnetisch, d. h. sie ziehen die eine Spitze der Magnetnadel an, während die andere abgestoßen wird. Auch ist die Stärke der magnetischen Kraft verschieden bei

verschiedenen Mineralien und wird einfach nach der Entferrnung geschätzt, in denen diese auf die Magnetnadel wirken.

7. Geruch. Geschmack. Verhalten gegen Wasser. Anfühlen. Glanz.

§. 77.

Den Geruch kann man zuweilen zur Unterscheidung einiger Mineralien mit Vortheil anwenden. Dieser ergibt sich entweder schon von selbst (Erdböl), oder wird hervorgerufen durch Anhauchen oder Beseuchten (Thon, Hornblende), durch Reiben, Ritzen oder Schlagen (Bernstein, Arsenik, Stinkstein), und durch Erhitzen (Schwefel, Selenblei). Der Geruch ist entweder dem Minerale eigenthümlich oder er rührt von zufällig beigemengten Substanzen her. So zeigt Arsenik beim Verbrennen einen Knoblauchgeruch, Selen einen Meerrettiggeruch, Schwefel den gewöhnlichen Schwefelgeruch, und alle Mineralien, welche diese Substanzen als Bestandtheil enthalten, werden bei der Verbrennung dieselben durch das Eigenthümliche ihres Geruchs zu erkennen geben. Geruch durch zufällig beigemengte, wahrscheinlich bituminöse, Substanzen, findet man bei Quarz, Kalk, Gyps &c.

§. 78.

Mehrere Mineralsubstanzen, besonders Salze und Säuren, erregen einen Geschmack, der manchmal ein gutes Merkmal diese von andern zu unterscheiden abgibt. Hierher gehören:

Metallisch schmeckend. Metalle.

Zusammenziehend. Eisen-Bitriol.

Laugenhaft. Natron.

Salzig. Steinsalz.

Bitter. Bittersalz.

Kühlend. Salpeter.

Süßlich. Alaun.

Sauer. Borarsäure.

§. 79.

Manche Mineralien besitzen die Eigenschaft, Wasser mehr oder minder einzusaugen. Hierbei kommt die Geschwindigkeit, mit welcher dieß geschieht, die Anhaltungsfähigkeit und die Veränderungen, welche mit den Körpern vorgehen, in Betracht. Ersteres

beobachtet man durch Eintauchen in Wasser, oder durch das mehr oder minder starke Anhängen an der Zunge oder Lippe. Die Anhaltungsfähigkeit wird bestimmt durch Vergleichung der aufgenommenen Menge von Wasser mit der Zeit des Trocknens bei gleichbleibender Temperatur. Der Einfluß, welchen das Wasser auf diese Mineralien übt, besteht darin, daß sie keine Veränderung zeigen (Saugkalk), zerfallen oder zerspringen (Bol, Walkererde); manche erhalten dunklere und lebhaftere Farben durch das Einsaugen von Wasser (Plastischer Thon), andere werden durchscheinender (Hydrophen).

§. 80.

Anhangsweise sollen hier noch einige Eigenschaften der Mineralien angeführt werden, die zwar nicht wesentlich sind, aber doch der Erwähnung verdienen.

Anfühlen, der Eindruck, welchen die Mineralien verursachen beim Anfassen, kalt (manche Edelsteine), fett (Speckstein), mager (Kreide).

Bei manchen Mineralien nimmt man ein Klingen (Obsidian), Rauschen (Bergkork) oder Knirschen (gediegen Kupfer) wahr, wenn man an sie schlägt, biegt oder zerbricht.

III. Chemische Kennzeichen.

§. 81.

Unter chemischen Kennzeichen der Mineralien versteht man diejenigen Eigenthümlichkeiten, welche dieselben wahrnehmen lassen, wenn vermittelt Wärme, Electricität oder anderer Mittel auf die Substanz der Mineralien eingewirkt, und dieselbe dadurch theilweise oder ganz verändert werden. Bei Anwendung dieser Mittel hat man gefunden, daß sich nicht alle Mineralien gleich verhalten; während einige sich in verschiedenartige Stoffe, aus denen sie zusammengesetzt sind, in ihre Bestandtheile zerlegen lassen, ist dieß bei anderen nicht der Fall. Hierauf beruht der Unterschied zwischen chemisch-einfachen und chemisch-zusammengesetzten Mineralien.

§. 82.

Durch die chemische Untersuchung der Mineralien hat man

bis jetzt 54 Substanzen kennen gelernt, welche jeder weiteren Zerlegung widerstehen und daher als unzerlegbare Bestandtheile, einfache Körper, Elemente des Mineralreichs angesehen werden. Es sind folgende:

1) Nichtmetallische Körper: Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Chlor, Brom, Jod, Fluor, Schwefel, Selen, Phosphor, Arsenik, Kohlenstoff, Boron.

2) Metalle.

a) Leichte Metalle oder Metalle der Alkalien und Erden: Kalium, Natrium, Lithium, Baryum, Strontium, Calcium, Magnium, Beryllium, Yttrium, Aluminium, Zirkonium, Thorium, Cerium, Silicium.

b) Schwere Metalle: Titan, Tantal, Scheel, Molybdän, Vanadium, Chrom, Uran, Mangan, Antimon, Tellur, Wismuth, Zink, Cadmium, Zinn, Blei, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Quecksilber, Silber, Gold, Platin, Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium.

§. 83:

Mehrere dieser Elemente kommen für sich, unvermischt, in der Natur als Mineralien vor, wie Schwefel, Kohlenstoff, Eisen, Blei, Wismuth, Kupfer, Quecksilber, Silber, Palladium, Platin, Gold, Antimon und Arsenik. Die meisten Mineralien aber sind aus der Verbindung von zwei, drei, vier u. s. w. dieser Elementen entstanden. Diese Verbindungen haben jedoch das Eigenthümliche, daß sie nur binäre sind, d. h. sie bestehen entweder bloß aus zwei einfachen Stoffen, wie z. B. der Zinnober, aus Quecksilber und Schwefel, oder, wenn sie auch eine größere Zahl derselben enthalten, so lassen sich zwei nähere Bestandtheile unterscheiden, von denen jeder wieder in zwei entferntere zerfällt, wenn er nicht einfach ist; z. B. kohlensaures Blei ist eine Verbindung von Bleioryd und Kohlensäure; jenes läßt sich aber in Blei und Sauerstoff, dieses in Kohlenstoff und Sauerstoff zerlegen, es sind daher Bleioryd und Kohlensäure die näheren, Blei und Sauerstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff aber die entfernteren Bestandtheile von kohlensaurem Blei.

Eine Ausnahme hiervon machen einige wenige Mineralien, die als fossile organische Ueberreste zu betrachten sind, sie erschei-

nen aus drei oder vier Stoffen zusammengesetzt, und bilden demnach tertiäre oder quaternäre Verbindungen. /u

S. 84.

Über diese Elemente kommen in der Natur in sehr verschiedener Menge vor; während einige allgemein verbreitet sind, erscheinen andere selten und vereinzelt. Unter allen spielen der Sauerstoff und der Wasserstoff die größte Rolle. Sie bilden die Bestandtheile des Wassers und mit anderen Stoffen vereinigt, die zwei wichtigsten Formen chemischer Verbindung die Säuren und die salzfähigen Grundlagen, Salzbasen. Am bedeutendsten von jenen beiden Elementar-Bestandtheilen macht sich jedoch der Sauerstoff, er geht mit allen übrigen Stoffen Verbindungen, mit den meisten sogar in mehrfachen Verhältnissen, ein. Diese werden oxygenirte Verbindungen genannt, und zwar Säuren, wenn sie eine saure Natur haben, Oxide, wo dieß nicht der Fall ist. Die Trennung des Sauerstoffs von einem andern Körper heißt man Desoxydation, Reduktion. Der Wasserstoff kommt, außer beim Wasser, sehr sparsam in unorganischen Verbindungen vor. Chemische Verbindungen, die Wasser enthalten, werden gewöhnlich Hydrate genannt. Nach diesen beiden Stoffen machen sich besonders einige leichte Metalle wichtig. Silicium, Magnium, Aluminium, Calcium, Kalium, Natrium, bilden im oxydirten Zustande auf manichfache Weise untereinander chemisch und mechanisch vereinigt, die Hauptmasse unserer Erdrinde. Viele der schweren Metalle werden gediegen gefunden, andere in Verbindung mit Sauerstoff, Schwefel, Chlor, Selen, oder mit anderen Metallen zu Legirungen vereinigt u. s. w. la //

S. 85.

Die durch die Verbindungen der einzelnen Elementen hervorgegangenen vielfachen Körper sind nicht allein durch die Beschaffenheit dieser Bestandtheile, sondern auch durch die relative Menge, in welchen sich dieselben vereinigt haben, verschieden. Letztere aber die Quantität, in welcher sich die Stoffe zu festen Mischungen verbinden, ist durchaus nicht willkürlich, sondern unterliegt vielmehr bestimmten unwandelbaren Gesetzen. Schon oben wurde bemerkt, daß der Sauerstoff nicht nur mit allen elemen-

ten, sondern sogar mit einem und demselben oft mehrere Verbindungen eingeht; aber die Zahl dieser Verbindungen muß nothwendig seyn, wenn sie in allen denkbaren Menge-Verhältnissen statt finden könnten. Dieß ist jedoch nicht der Fall, sondern ihre Vereinigung geschieht nur nach wenigen und bestimmten Verhältnissen, so daß die Zahl der Verbindungen, die der Sauerstoff eingehen vermag mit einem andern Stoff, doch sehr beschränkt ist. Was auch eben vom Sauerstoff im Einzelnen angegeben wurde, gilt im Allgemeinen für die Verbindungen der andern Körper unter sich, und der Zweig der Chemie, welcher uns mit den Gewichtsverhältnissen bekannt macht, nach denen die Verbindung der Substanzen untereinander erfolgt, wird *Stöchiometrie* genannt. Diese bedient sich bei Bestimmung dieser Gewichtsverhältnisse desselben Mittels, welches man bei der des. specifischen Gewichts anwendet, sie nimmt nämlich eins der Verhältnisse als Einheit an und vergleicht damit die übrigen. Einige Chemiker stellen den Wasserstoff, die meisten aber den Sauerstoff als Einheit auf, und drücken nun die Verhältnisse oder die Mengen, in welchen sich die andern Stoffe mit diesen verbinden, durch Zahlen aus, welche Mischungs-Gewichte, Atomengewichte, stöchiometrische Zahlen u. s. w. genannt werden. Stöchiometrische Tafeln geben diese Zahlen von allen Elementar-Bestandtheilen genau an.

§. 86.

Die Zusammensetzung der Mineralien hat auf ihre äußere Beschaffenheit, besonders auf ihre Krystallform den entschiedensten Einfluß, es müßte daher eine Veränderung in jener auch eine in dieser zur Folge haben. Dieß ist jedoch nicht immer der Fall. Nach Mitscherlich können Verbindungen von verschiedener chemischer Zusammensetzung, gleiche Krystallform haben, wodurch sich auf ein ähnliches inneres Verhältniß der Bestandtheile schließen läßt. Diejenigen verschiedenen Körper nun, die Verbindungen von derselben Krystallform mit einem dritten bei gleichem Mischungs-Verhältniß hervorbringen, gehören zu einer Gruppe, und heißen *isomorphe Körper*. Sie können sich wechselseitig in ihren Verbindungen vertreten, ohne daß eine Aenderung der Krystallform erfolgt. Solche Gruppen sind: Bleiorpd, Baryt und

Strontian; Kalk, Zink, Eisenoryd, Manganoryd, Zinn-, Nickel-, Kobalt- und Kupferoryd. Der Isomorphismus ist bei Bildung eines Mineralsystems zu berücksichtigen. Die Verhältnisse dieser Art sind sehr wichtig und müssen besonders beachtet werden bei den Mineralien, in welchen jene Bestandtheile vorkommen.

Aber man hat auch Beispiele, daß zwei Substanzen, die wenig oder gar nicht in ihren Zusammensetzungen verschieden sind, doch Krystallisationen zeigen, die verschiedenen Systemen angehören, wie z. B. Eisenkies und Stahlkies, Granat und Idokras; eine Erscheinung, die Dimorphismus genannt wird.

§. 87.

Zur vollständigen Kunde der Mischungen der verschiedenen Mineralien führen die Analysen derselben, auf deren gründlichen Anleitung sich die Mineralogie nicht einlassen kann, sondern die gewonnenen Resultate aus der analytischen Chemie entnimmt. Diese bestimmt durch genaue chemische Untersuchung die Bestandtheile eines Minerals der Art und der Menge nach, indem sie das absolute Gewicht des zu untersuchenden Minerals = 100 setzt, und aus den Resultaten der Untersuchung berechnet, wie viel jeder Bestandtheil der Mischung davon enthält. Die Zusammensetzung der Mineralien wird durch kurze Formeln ausgedrückt, um auf eine bequeme Weise die Bestandtheile derselben sogleich lesen zu können. Für jedes Element wird der lateinische Anfangsbuchstabe gesetzt, wenn mehrere denselben aber gemein haben, der folgende Buchstaben hinzugefügt, der ihnen nicht gemeinschaftlich ist; diese werden nun als die einfachen Mischungsgewichte derselben angesehen, und durch Zusammenstellung derselben ihre Verbindung angezeigt: z. B. Silberglanz, welches eine Verbindung von Silber und Schwefel ist, wird durch die Formel Ag Su ausgedrückt.

§. 88.

Eine genaue Bestimmung der in einem Minerale vorkommenden Mengen von Bestandtheilen, ist in vielen Fällen nicht nothwendig und der Mineraloge beschränkt sich auf gewisse Mittel, um über die qualitative Zusammensetzung Aufschluß, und dadurch Merkmale zum Erkennen derselben zu erhalten. Die chemische Prüfung der Mineralien auf ihre Bestandtheile geschieht entweder auf trockenem oder auf nassem Wege.

§. 89.

Durch die Prüfung der Mineralien auf trockenem Wege wird ihr Verhalten im Feuer bestimmt. Dieß geschieht entweder dadurch, daß man das Mineral der Hitze einer gewöhnlichen Lichtflamme, oder dem durch das Löthrohr hervorgebrachten Flammenstrahl, wodurch die Lichtflamme auf einen kleinen Raum concentrirt und deshalb sehr verstärkt ist, aussetzt. Die Erscheinungen, welche man beobachtet, sind bei beiden Arten der Hitze-Anwendung ziemlich gleich; nur daß man bei der ersten Art nicht alle und nur wenige ganz vollständig beobachten kann; es wird vorzüglich auf die Veränderung gesehen, welche ein Mineral wahrnehmen läßt, wenn es der Hitze ausgesetzt ist: ob es schmilzt, sich reducirt, sich verflüchtigt, verknistert, aufwölbt, Geruch verbreitet, ob es die Flamme färbt, welches Produkt hervorgeht. — Das Löthrohr wird am häufigsten angewendet, da nicht viele Mineralien in der gewöhnlichen Flamme schon Veränderungen zeigen. Es ist ein Instrument, dessen sich manche Künstler bei ihren Arbeiten zum Löthen bedienen, und besteht, zu mineralogisch-chemischen Zwecken eingerichtet, gewöhnlich aus einer Röhre von Messing oder besser Eisenblech, die sich nach unten zu verengt und in einen Knopf ausgeht, in welchen Spitzen mit engen Oeffnungen eingesetzt werden können. Der Gebrauch ist einfach und bedarf keiner weiteren Erklärung, nur erfordert es einige Übung, um ohne große Anstrengung lang blasen und die verschiedenen Versuche anstellen zu können. Der Körper wird der Löthrohrflamme ausgesetzt, indem man denselben, dem durch den Luftstrom des Löthrohrs bewirkten Flammenstrahl nähert, während man ihn entweder in der Platinzange hält oder auf eine Unterlage von Kohle oder Platinblech legt. Hier findet nun der Unterschied statt, daß wenn man den Körper nur der Spitze der Flamme aussetzt, derselbe, indem er mit der Luft in Berührung bleibt, oxydirt wird, wogegen man ihn desoxydirt, wenn derselbe von der Flamme rings umgeben ist, so daß keine Luft zukommen kann. Man bezeichnet die erste Art des Verfahrens mit dem Ausdruck der *Drydationsflamme*, der zweiten aber mit dem der *Reductionsflamme* aussetzen.

§. 90.

Die Untersuchung der Mineralien mittelst des Löthrohrs geschieht entweder ohne oder mit Zusatz.

Für sich untersucht man die Mineralien

- 1) in der Platingange, ob sie leichter oder schwerer schmelzbar oder unschmelzbar sind, ob sie Glas oder Email geben, welche dicht oder blasig, weiß oder gefärbt seyn können; ob sie eine halbmetalische schwarze Kugel oder eine Schlacke bilden. Man gibt ferner noch auf folgende Erscheinungen acht: Färben der Flamme und des Körpers, Umwandlung der Farbe, Veränderung des Glanzes, der Durchsichtigkeit; Geruch, Zerspringen, Zerknistern, Verdampfen, Aufblähen, Aufschäumen, Aufwallen, Rauch, Reduction u. s. w.;
- 2) auf der Kohle, um zu beobachten, ob eine Reduction zu einer metallischen Kugel statt finde, oder zu besserer Untersuchung des Geruchs und der Dämpfe;
- 3) im Kolben oder in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre, um die glasförmigen Materien, welche die Substanzen enthalten zu verflüchtigen, ist Wasser vorhanden, so entwickeln sich Dämpfe, die sich in Tropfen an den oberen Theil der Röhre ansetzen. Leicht verflüchtigbare Metalle sublimiren sich ebenfalls in diesem Theil der Röhre. Man kann den Gehalt an Wasser ungefähr bestimmen, wenn man das Mineral vor und nach dem Glühen wiegt und den Gewichtsverlust als entwichenes Wasser annimmt;
- 4) in offenen, etwas gekrümmten Glasröhren, um zu untersuchen, ob sich bei Zutritt von Luft flüchtige Dryde oder Säuren bilden.

§. 91.

In vielen Fällen lassen sich durch bloße Untersuchung der Mineralien mit dem Löthrohre keine Resultate erzielen, und man ist genöthigt, durch Zusatzmittel auf diese zu wirken, und auf solche Weise besondere Merkmale für's Erkennen zu erhalten. Zu den wichtigsten Reagentien gehören:

- 1) Kohlensaures Natron (Soda), es dient zur Beförderung der Reduction vieler Metalloryde, zur Bewirkung leichterer Schmelzbarkeit der Körper, zur Erkennung des Vorhandenseyns mehrerer Dryde mittelst der Farbe, welche die geschmolzene Masse annimmt, zur Auflösung vieler Verbindungen;

- 2) boraxsaures Natron (Borax), zur Auflösung einer großen Menge von Stoffen zu gebrauchen;
- 3) Phosphorsalz, besonders zur Erkennung der Metallsalze dienlich;
- 4) verglaste Boraxsäure u. s. w.

Ueber das Löthrohr verweisen wir auf das wichtige Werk des berühmten schwedischen Chemikers Berzelius: die Anwendung des Löthrohrs in der Chemie und Mineralogie. Zweite Auflage. Nürnberg, 1828.

S. 92.

Die Prüfung der Mineralien auf nassem Wege gründet sich auf die Wechselwirkung verschiedener Substanzen, wenn sie in ein oder der anderen Flüssigkeiten aufgelöst werden. Da hierbei Auflöslichkeit Bedingung ist, so unterscheidet man Substanzen, die im Wasser, oder in Säuren auflöslich oder in beiden unauflöslich sind.

- 1) Im Wasser auflösliche Körper: die Zahl derselben ist nicht groß; sie bilden entweder eine farblose oder gefärbte Flüssigkeit. Durch Einwirkung von Reagentien wird der Gehalt derselben erforscht.
- 2) In Säuren auflösliche Körper; diese Eigenthümlichkeit besitzen einige schon bei gewöhnlicher Temperatur, bei anderen muß man mit Wärme zu Hülfe kommen; es werden jedoch verschiedene Erscheinungen wahrgenommen bei verschiedenen Substanzen.
 - a) Es entwickelt sich unter Aufbrausen farb- und geruchloses Gas.
 - b) Bei Behandlung mit Salpetersäure entwickeln gewisse Körper salpetersaures Gas, das durch Farbe und Geruch erkannt wird.
 - c) Sie entwickeln, mit Salpetersäure behandelt, kein Gas, lösen sich auf und geben nach einiger Zeit eine größere oder geringere Menge von Gallerte.
 - d) Sie lösen sich langsam auf, ohne Gas zu entwickeln und Gallerte zu bilden.
- 3) Körper, die weder im Wasser noch in Säuren auflöslich sind, müssen mit Soda im Feuer behandelt und dadurch auflöslich gemacht werden.

Bei Beschreibung und Angabe der Kennzeichen der einzelnen Mineralien, sollen sowohl die Resultate der Prüfung auf trockenem und nassem Wege, wie auch das Ergebniß der Analysen angeführt werden.

§. 93.

Am Schlusse dieses Kapitels erlauben wir uns noch einige Worte über die Umwandlung, welche mehrere Mineralsubstanzen wahrnehmen lassen, und die damit theilweise in Verbindung stehende Frage, über die fortwährende Entstehung und Bildung, über das sogenannte Wachsen der Mineralien zu sagen.

Die unorganischen Körper werden, so lange dieselben bleiben, als nicht äußere Dinge, einen ändernden Einfluß auf sie üben. Aber wir sehen, daß sich dieselben in dieser Hinsicht sehr verschieden verhalten, einige derselben scheinen, trotz dieser Einwirkung, ganz unverändert zu bleiben, andere aber erfahren, durch Einfluß von Feuchtigkeit und Wärme, von Licht und Luft oder durch einen eigenthümlichen inneren Zersetzungsprozeß, mehr oder minder schnell Veränderungen. Diese Prozesse sind es, welche eine Umwandlung des Minerals zur Folge haben. Die Veränderungen schreiten bald von Außen nach Innen, bald von Innen nach Außen vor; erstere Art ist die häufigere, und findet entweder nur in der Substanz statt, ohne die Masse umzugestalten, oder in beiden zugleich, d. h. die äußere Form der Mineralien bei Veränderung der Bestandtheile bleibt dieselbe oder es wird, wenn dieses statt hat, jene zugleich mit modificirt, das Mineral verschwindet gänzlich und es bildet sich eine oder mehrere neue Substanzen: der chemische Prozeß, welcher bei Umwandlung der Mineralien statt findet, beruht daher entweder auf Ausscheidung von Bestandtheilen, auf Aufnahme neuer Stoffe, auf beidem zugleich oder auf gänzlicher Zerstörung des Minerals, aus dem auch neue Mineralverbindungen hervorgehen. Aus Kupferlasur bildet sich Malachit, indem ein Theil der Kohlensäure entweicht; Rothkupfererz wird durch Aufnahme von Kohlensäure und Wasser zu Malachit; Eisenkies zu Brauneisenstein, indem der Schwefel entweicht, Sauerstoff und Wasser aber zutreten. Bei den angeführten Substanzen fängt die Umwandlung von Außen an, so daß man oft noch einen Kern von Kupferlasur, Rothkupfer-

erz und Eisenkies im Innern findet. Auch bleibt hier in der Regel die äußere Form dieselbe, und es gehören die Umwandlungs-Pseudomorphosen hierher. Aus Strahlkies entsteht Eisen-Vitriol durch Zersetzung, aus Bleiglanz kohlensaures oder phosphorsaures Blei. Die Umwandlung findet von Innen nach Außen mit Aenderung der Form statt. Sauerstoff, Wasser, Schwefel und einige Säuren scheinen durch ihr Verschwinden oder Zutreten die meisten Veränderungen, bei den verschiedenen Mineralien hervorzubringen. So bildet sich, wenn Wasser auf Eisenkies einwirkt, eine Auflösung, aus der sich Eisenvitriol in Krystallen ausscheidet. Aehnliches findet statt, wenn Wasser, Kalk, Gyps, Steinsalz, Natrium aufgelöst enthält.

§. 94.

Alle diese Erscheinungen weisen auf ein fortwährendes Thätigseyn der verschiedenen Elemente in der unorganischen Natur hin, und in sofern nun aus den untergegangenen Verbindungen neue Mischungen sich bilden, kann eines Theils von einem Entstehen der Mineralien die Rede seyn. Aber wir sehen Mineralien auch noch auf andere Weise sich durch chemische Thätigkeit bilden und zwar mit oder ohne vulkanischen Einfluß, auf nassem oder trockenem Wege, an allen Orten unserer Erde, ja selbst in den höheren Räumen unserer Atmosphäre. Beachten wir die Art und Weise, wie die Entstehung mancher Mineralsubstanzen noch fortbauert, so lassen sich darüber auch allgemeine Punkte feststellen.

- 1) Sie findet auf die Art statt, wie wir im vorhergehenden Paragraphen angaben, durch Umbildung und Zersetzung der Mineralien;
- 2) durch Absatz aus Wasser, von kalten und heißen Quellen. Hierher gehören vor allem Kalktuff, Kieselstuff, Schwefel, Eisenkies, Borarsäure u. s. w.;
- 3) durch Auswitterung oder Ausblähung aus Gebirgsarten. Alaun, Bittersalz, Kalisalpeter &c.;
- 4) durch vulkanische Thätigkeit, Schwefel, Eisenoxyd, Steinsalz, Salmiak, Kupfer &c.;
- 5) durch Brände von Schwarz- und Braunkohlen, Alaun, Schwefel, Schererit &c.;

6) durch Bildung in der Atmosphäre. Aerolithe, Meteorsteine, Hagel mit Körnern von Eisensies.

Auf diese Arten der Bildung neuer Mineralien lassen sich wohl die meisten vorkommenden Fälle zurückführen; doch sind diese Gebilde neuerer Zeit gewiß meist nur als mittelbare Erzeugnisse, d. h. als hervorgegangen aus früher vorhandenen Mineralien, die umgewandelt oder zerstört wurden, zu betrachten.

Zweiter Abschnitt.

Systematik und Nomenclatur.

§. 95.

In dem vorhergehenden Abschnitte wurden die Kennzeichen der Mineralien durchgegangen, eine Terminologie für dieselben festgestellt und die Mittel angegeben, diese anzuwenden. Allein es kann nicht genügen, die Eigenschaften eines jeden Körpers für sich kennen zu lernen, die Wissenschaft muß suchen, eine Ordnung in die Gesamtheit derselben zu bringen, indem sie Gleiches zu Gleichem, und Aehnliches neben Aehnlichem stellt, um auf diese Weise das Studium der Mineralsubstanzen zu erleichtern. Ehe man jedoch zum Klassificiren dieser Naturkörper schreitet, ist es durchaus nothwendig zu bestimmen, was eine Mineral-Species sey, denn diese ist die Grundlage jeder Ordnung, sie bleibt ständig, während verschiedene Systeme vorhanden seyn und öfter Veränderungen derselben eintreten können.

§. 96.

Es ergibt sich aus der Natur der Sache, daß diejenigen Mineralien, welche in allen ihren Eigenschaften übereinstimmen, identisch sind, und zusammengestellt werden müssen. Aber diese Uebereinstimmung aller Eigenschaften findet man sehr selten, und es kommt daher bei Bestimmung der Mineral-Species auf Würdigung der verschiedenen Kennzeichen und auf Feststellung derjenigen an, die als Leiter bei Aburtheilung über Analogie oder Verschiedenheit der Körper gelten sollen. Es werden dieß jedenfalls die-

jenigen Kennzeichen seyn, welche sich am ständigesten bei den Mineralien zeigen. Und hier finden wir nun, daß die chemische Zusammensetzung die erste Stelle einnimmt, Krystallisations-Verhältnisse und physikalische Merkmale beruhen auf ihr. Hierbei sind jedoch die Erscheinungen des Isomorphismus zu beachten. Ebenso die des Dimorphismus; wo zwei in ihren Bestandtheilen übereinkommenden Mineralien in verschiedenen Systemen krystallisiren, sind diese beiden Substanzen als verschieden zu betrachten. In so fern nun die Verschiedenheit der Krystallisation auch Trennung der Mineralien veranlaßt, gilt diese als nächstwichtigstes Merkmal. Kleine Schwankungen der Winkel der Kernform eines Minerals rechtfertigen jedoch nicht die Aufstellung neuer Species, denn gerade bei solchen Substanzen, die zu Mischungen geneigt sind, hat man solche am häufigsten bemerkt. Was nun die übrigen Kennzeichen betrifft, so sind vorzüglich Spaltbarkeit, Härte und Schwere zu beachten. Einerleiheit der Spaltungsgestalten wird auf gleiche Mineralsubstanzen schließen lassen, wenn auch die Vollkommenheit der Spaltung noch so verschieden ist. Schwankungen hinsichtlich der Härte und Schwere sind genau in Acht zu nehmen, wenn sie bedeutender werden. Die Farbe und die andern physikalischen Kennzeichen sind auf dieselbe Weise zu beurtheilen. Aus dem Vorhergehenden ergibt sich nun, daß man unter einer Mineral-Species sämtliche Mineralien mit gleicher chemischer Zusammensetzung, gleicher Krystallisation unter möglicher Uebereinstimmung der übrigen Eigenschaften versteht.

§. 97.

Hat man nun auf solche Weise den Begriff der Mineral-Species fixirt, so kann man erst zur Aufstellung eines Systems schreiten, nach welchem man die sämtlichen Mineralien ordnen will. Dieses System muß jedoch sehr verschieden werden, je nachdem man dieses oder jenes Kennzeichen als Grundlage zum Ordnen annimmt, und es existiren daher auch die verschiedensten Systeme. Da die chemische Konstitution eines Minerals die erste Stelle bei Bestimmung einer Mineral-Species einnimmt, die übrigen Eigenschaften in dieser immer mehr oder weniger ihren Grund haben, und daher auch bei den Mineralien, welche chemisch

verwandte sind, in der Regel mehr oder weniger nahe stehen werden, so wählte ich die chemische Zusammensetzung zum Classifications-Princip, und stellte vor Allem den leitenden Grundsatz auf, von der Betrachtung und Untersuchung des Einfachen zu der des Zusammengesetzten vorzuschreiten. Hierbei verfuhr ich ganz analytisch, und nach der Methode, welche L. Smelin in seinem Handbuche der Chemie (Frankfurt 1827) befolgt, so daß also keine Verbindung zweier oder mehrerer Elemente angeführt wird, ohne daß vorher der einfache Stoff erwähnt gewesen wäre. Isomorphe und zufällige Bestandtheile machen hierin eine Ausnahme. Auf diese Weise stellen sich die Mineralien auch ganz natürlich nebeneinander.

S. 98.

Was nun die Ordnung im speciellen betrifft, so trennte ich zuerst die einfachen Stoffe und die unorganischen Verbindungen von den fossilen organischen Verbindungen, da diese sich nicht gut vereint aufführen lassen. Hierauf folgte ich der Eintheilung, welche in dem vorigen Abschnitt bei Gelegenheit der Aufzählung der Elemente (S. 82.) angeführt wurde, indem ich die Ordnung, in welcher die nichtmetallischen Körper und die leichten Metalle stehen, von Löwig (Lehrbuch der Chemie, 1832), die der schweren Metalle von L. Smelin entlehnte. Die Art und Weise der Aneinanderreihung der einzelnen Species ergibt sich aus dem, was ich oben angeführt habe, und aus dem Systeme selbst; ich hätte nur noch über die Stellung zweier einfachen Stoffe mich näher zu erklären. Ich führte nämlich das Arsenik bei den nichtmetallischen Elementen an, weil es in seinem Verhalten die meiste Aehnlichkeit mit Phosphor zeigt, das Silicium dagegen stellte ich zu Ende der leichten Metalle, um auf diese Weise alle Silicium-Verbindungen mit nichtmetallischen Stoffen und den leichten Metallen in eine Gruppe zu bekommen. Ueberdies sind die Chemiker selbst noch im Zweifel, ob sie das Silicium zu den nichtmetallischen oder zu den metallischen Körpern zählen sollen.

Daß ich alle einfache Stoffe anführte, und mit wenig Worten angab, auf welche Weise dieselben in der Natur vorkommen, wird wohl nicht zu tadeln seyn; ich mußte bei dem Systeme, wel-

ches ich hier befolge, so verfahren, um consequent zu bleiben, auch glaube ich auf solche Art eine Uebersicht der Elemente zu bieten, die gewiß nicht ohne Nutzen ist.

§. 99.

Die Beschreibung der Species besteht in einer vollständigen, deutlichen und methodischen Aufzählung der einzelnen Merkmale. Ich werde sie in der Regel in derselben Ordnung anführen, wie sie in der Kennzeichenlehre durchgegangen wurden. Aus dem, was über die Mineralspecies gesagt wurde, ergibt sich, daß Abweichungen hinsichtlich der minder wichtigen Merkmale, namentlich der Textur-Verhältnisse und der Farbe, bei einer Species statt finden können, und daß dadurch Arten und Varietäten entstehen, die, wo sie besonderer Erwähnung verdienen, speciell angeführt werden sollen. Ebenso gibt das Vorkommen isomorpher Bestandtheile Grund zur Bildung von Arten. — Die Stufen der Klassification wären demnach Gruppen, Species (Gattungen), Arten und Abänderungen.

Da es gewiß nicht ohne Interesse ist, über Art und Weise, so wie über den Ort des Vorkommens der Mineralien Kenntniß zu erhalten, so werde ich solches, zumal da es für viele Substanzen nicht ohne Bedeutung ist, jeder Beschreibung der Species beifügen. Ebenso sollen kurze Zusätze, die Benennung der Mineralien betreffend, folgen, um zugleich zu zeigen, wie die Wissenschaft in das praktische Leben eingreift, wie die Produkte des Mineralreichs auf vielfache Weise verwendet und zu den verschiedensten Zwecken zugerichtet werden.

§. 100.

Eine jede Species muß ihren Namen haben; da aber unsere Wissenschaft noch nicht so weit vorgeschritten ist, daß eine systematische Nomenclatur eingeführt werden könnte, so bedient man sich am besten der einmal angenommenen Benennungen, und es wäre sehr zu wünschen, daß diese nicht ohne Noth verlassen, und nur aus Sucht neue zu schaffen, oder aus Streben nach Originalität andere Namen für längst bekannte Substanzen eingeführt würden. Ich habe daher denjenigen Namen für die Species aus den vorhandenen, die für manche eine große Aus-

wahl gestatten, gewählt, der mir der allgemein bekannteste und der zweckmäßigste schien, und von den Synonymen ebenfalls nur die gangbarsten angeführt. Die französischen Benennungen wurden nach *Sauy*, die englischen nach *Phillips* gegeben.

D r i t t e r A b s c h n i t t .

Geschichte und Literatur.

§. 101.

Schon in den frühesten Zeiten erregten die unorganischen Naturkörper die Aufmerksamkeit der Menschen; aber die Alten kannten nur eine sehr kleine Anzahl von Mineralien, vor Allem diejenigen, von welchen sie einigen Nutzen zogen, oder die durch ihren Glanz, ihre Farbe oder andere äußere Merkmale ihnen in die Augen fielen; und selbst von diesen wenigen war ihre Kenntniß unvollkommen. Was *Aristoteles* ¹⁾, *Theophrast* ²⁾, *Dioscorides* ³⁾, *Plinius* ⁴⁾ und *Galen* ⁵⁾ von den Mineralien sagen, hat mehr auf ihren Gebrauch, besonders als Arzneimittel, als auf ihre Natur Bezug, und ist daher dem Aufserthumsforscher und dem Arzte wichtiger als dem Mineralogen. — Auch im Mittelalter machte die Wissenschaft sehr unbedeutende Fortschritte. *Avicenna* ⁶⁾ scheidet am frühesten die Mineralien in Steine, Metalle, schwefelige Substanzen und Salze.

§. 102.

Georg Agricola (1490—1555) ⁷⁾ war der Erste, der die äußerlichen Merkmale der Mineralien zu erforschen und sie zu

1) *Meteporologicorum*. Lib. III und IV.

2) *Περί λίθων*. — *Theophrast's* Abhandlung von den Steinen. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Karl Schmeider. Freiberg. 807. 8.

3) *Padacii Dioscorides Anazarbei de medica materia*. J. Ruellio interpr. Basil. 1539.

4) *Historia naturalis*. Lib. 33—37.

5) *De simplicium medicamentorum facultatibus*.

6) *De congelatione et conglutinatione lapidum*. Siehe J. Beckmann's Vorath kleiner Anmerkungen über mancherlei gelehrte Gegenstände. 2tes Stück. Göttingen. 1803. 8. p. 372—387.

7) *Georg Agricola's mineralogische Schriften*, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Ernst Lehmann. Freiberg. 1806—1812. 4 Theile. 8.

ihrer Unterscheidung und Classification anzuwenden suchte, und dadurch den Grund zu einem wissenschaftlichen Lehrgebäude legte. Nach ihm betraten Mehrere dieß Feld und bemühten sich, die Mineralien zu beschreiben und zu ordnen. Hierher gehören E. Gesner, Edsalpinus, Boetius de Boot, Becher u. A. m. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts machten sich um die Wissenschaft besonders Bromel, Henkel, Linné, u. m. A. verdient. Ihnen folgten Wallerius und Cronstedt; Ersterer erwarb sich dadurch großes Verdienst, daß er die chemische Beschaffenheit und die äußeren Merkmale der Mineralien zugleich berücksichtigte, und hiernach sein System bildete. Cronstedts Einfluß auf die spätere Bearbeitung der Mineralogie war bedeutend; seine Methode hatte eine praktische Tendenz, sein System war auf einfache Classifications-Principien gegründet, obgleich er das chemische und das äußere Verhalten der Mineralien zugleich berücksichtigte. Bergman bearbeitete die Mineralogie aus rein chemischem Gesichtspunkte, bereicherte aber die Wissenschaft durch gründliche Analysen.

S. 103.

Eine neue Epoche entstand mit Werner's und Haüy's Auftreten für die Wissenschaft. Bis jetzt war sie hinter den andern naturhistorischen Lehren zurückgeblieben, da es ihr stets an gehöriger Methode gemangelt hatte. Ersterer erwarb sich besonders durch die Lehre von den äußeren Kennzeichen großes Verdienst, indem er dadurch vieles Schwankende aus der Kunstsprache verbannte, und in die Beschreibung der Mineralien Ordnung und Faßlichkeit brachte. Aber er berücksichtigte dabei das Mathematische wie das Chemische der Wissenschaft zu wenig. Haüy dagegen schlug bei seinen mineralogischen Forschungen eine neue Bahn ein, indem er durch seine krystallographische Arbeiten den mathematischen Zusammenhang der Krystallisationen der Mineralkörper von gleichen Bestandtheilen auffand, und dadurch zur festen Grundlage für sein Mineralsystem gelangte.

Auf solche Weise gefördert ging nun die Wissenschaft, besonders durch krystallographische und chemische Untersuchungen unterstützt, rasch vorwärts, gleichsam das längst versäumte nachholend. Die Systeme, welche die Mineralogen neuerer Zeit befol-

gen, und die aus den in der Literatur angeführten Werken näher betrachtet werden können, sind theils auf rein chemische Grundsätze (Berzelius), theils nur auf das Aeußere der Mineralkörper (Mohs), theils auf beides zugleich (Haüy, L. Gmelin u. A. m.) gestützt. Aus diesem geht hervor, daß die Mineralien auf sehr verschiedene Weise geordnet werden, daß aber noch immer die Aufgabe zu lösen ist, ein naturhistorisches System aufzustellen, welches allen Anforderungen so entspricht, daß es allgemein angenommen werden könnte.

S. 104.

Literatur.

1. Geschichte und antiquarische Mineralogie.
(H. Steffens) Ueber Mineralogie und das mineralogische Studium. Altona, 1797. 8.
- L. de Launay, minéralogie des anciens. Bruxelles et Paris. 2 Vol. 1803. 8.
- v. Leonhard, Bedeutung und Stand der Mineralogie. Frankfurt, 1816. 4.
- A. L. Millin, minéralogie Homérique. 2. edit. Paris 1816.
- J. A. Lucas, de la minéralogie. Paris, 1818. 8.
- E. M. Marx, Geschichte der Krystallkunde. Karlsruhe, 1825.

2. Wörterbücher.

- 3appe, mineralogisches Handlexikon. 3 Bände. 2te Auflage. Wien, 1817. 8.
- T. Allan, mineralogical nomenclatur, alphabetically arranged etc. Edinburgh, 1819. 8.
- Wörterbuch der Naturgeschichte zc. 1 Bd. Weimar, 1825.
- K. F. A. Hartmann, Handwörterbuch der Mineralogie und Geognosie. Leipzig, 1828. 8.

3. Propädeutik.

- Rome de l'Isle, Essay de Cristallographie. Paris, 1772. 4 Vol. 8.
- Berner, von den äußerlichen Kennzeichen der Fossilien. Leipzig, 1774.
- Haüy, Essay d'une théorie sur la structure des cristaux. Paris, 1784. 8.

Mohs, Versuch einer Elementar-Methode zur naturhistorischen Bestimmung und Erkennung der Fossilien. Wien, 1812. I. Thl. 8.

Leonhard, Kopp und Gärtner, Propädeutik der Mineralogie. Frankfurt, 1817. fol.

A. J. M. Brochant de Villiers, de la cristallisation, considérée géométriquement et physiquement etc. Strasbourg, 1819. 8.

J. F. L. Hausmann, Untersuchungen über die Formen der leblosen Natur. Göttingen, 1821. I. 4.

C. F. Raumann, Grundriß der Krystallographie. Leipz. 1826. 8.

Al. Brongniart, Introduction a la Minéralogie etc. Paris, 1824.

4. Systeme und Lehrbücher.

J. G. Wallerius, Mineralogia eller Mineral-Riket indelt och beskrivet. Stockholm, 1747. 8.

Cronstedt, Försök til Mineralogie, eller Mineral-Rikets upställning. Stockholm, 1758. 8.

Karsten, tabellarische Uebersicht der mineralogisch-einfachen Fossilien. Berlin, 1792. fol. 2te Aufl.

Bournon, Traité de Minéralogie. London, 1808. 3 Vol.

A. J. M. Brochant, Traité élémentaire de Minéralogie. 2 Vol. 2 edit. Paris, 1808. 8.

C. A. C. Hoffmann, Handbuch der Mineralogie, fortgesetzt von H. Breithaupt. 4 Bde. Freiberg, 1811—18.

Steffens, vollständiges Handbuch der Oryktognosie. 4 Bde, und 1 Suppl.-Bd. Halle, 1811—24.

J. F. L. Hausmann, Handbuch der Mineralogie. 3 Bde. Göttingen, 1813. 2te Aufl. 1 Bd. 1828.

Haüy, Traité de Minéralogie. 2 edit. Paris, 1822.

Mohs, Grundriß der Mineralogie. 2 Bde. Dresden, 1822. 1824.

F. S. Bendant, Traité élémentaire de Minéralogie. Paris, 1824. (deutsch von Hartmann. Leipzig, 1826.) 2 edit. Paris, 1830.

W. Phillips, elementary introduction to the knowledge of Mineralogy. London, 1824. 3 edit.

v. Leonhard, Handbuch der Oryktognosie. Heidelberg, 1826. 2te Aufl. 8.

v. Leonhard, Naturgeschichte des Mineralreichs. Heidelberg, 1825. 8.

E. Naumann, Lehrbuch der Mineralogie. Berlin, 1828. 8.

R. Jameson, Sytem of Mineralogy. 3 Vol. Edinburgh, 1823. 4. edit.

A. Breithaupt, vollständige Charakteristik des Mineralreichs. 3te Aufl. Dresden, 1828. 8.

E. F. A. Hartmann, die Mineralogie in sechs und zwanzig Vorlesungen. Almenau, 1828.

W. Haidinger, Anfangsgründe der Mineralogie u. s. w., Leipzig, 1829. 8.

F. A. Walchner, Handbuch der gesammten Mineralogie u. 1ste Abtheilung. Carlsruhe, 1829. 8.

F. v. Kobell, Charakteristik der Mineralien, 2 Abtheilungen. Nürnberg, 1830. 8.

E. F. Glofker, Handb. der Mineralogie. 2 Abthl. Nürnberg. 1831. 8.

5. Lithurgik.

E. Schmieder, Versuch einer Lithurgik oder ökonomischen Mineralogie. 2 Bde. Leipzig, 1803—1804. 8.

H. L. W. Bölker, Handbuch der ökonomisch-technischen Mineralogie. 2 Bde. Berlin 1805.

A. F. Fladung, Versuch über die Kennzeichen der Edelsteine und deren vortheilhaftesten Schnitt u. Pesth, 1819. 8.

C. P. Brard, Minéralogie appliquée aux arts etc. 3 Vol. Paris, 1821. 8.

J. G. C. Blumhof, Lehrbuch der Lithurgik. Frankf. 1822. 8.

E. Fr. Naumann, Entwurf der Lithurgik. Leipzig, 1826. 8.

R. Blum, Taschenbuch der Edelsteinkunde. Stuttgart, 1832. 12.

6. Zeitschriften.

Köhler und Hoffmann, bergmännisches Journal. Freiberg, 1788—1815.

Journal des Mines. 38 Vol. Paris, 1794—1815.

Annales des Mines. 20 Vol. Paris, 1816—1832.

E. v. Moll, Jahrbücher der Berg- und Hüttenkunde. 5 Bde.

Salzburg, 1797—1801. Annalen. 3 Bde. 1802—1805.

Ephemeriden 5 Bde. Nürnberg, 1806—1809. Neue Jahrbücher. 6 Bde. 1810—24.

v. Leonhard, Taschenbuch für die gesammte Mineralogie. 18

Bde. Frankfurt, 1807—24. Zeitschrift für Mineralogie. 5
Bde. Frankfurt, 1825—29. Jahrbuch für Mineralogie u.
v. Leonhard und Bronn. 3 Bde. 1830—32.

Berzelius, Jahresbericht über die Fortschritte der physischen
Wissenschaften. Aus dem Schwedischen. 1—3r Jahrgang,
von E. G. Gmelin. 4—41r Jahrgang von Wöhler.
Tübingen, 1823—31.

Ferner sind für das Studium der Mineralogie wichtig die
verschiedenen Zeitschriften aus dem Gebiete der Chemie und Phy-
sik, so wie die Abhandlungen und Denkschriften gelehrter Gesell-
schaften und Akademien der Wissenschaften.

Z w e i t e r T h e i l .

System.

Erste Haupt-Abtheilung.

Einfache Stoffe und unorganische Verbindungen.

I. Klasse.

Nichtmetallische Mineralien.

Sie bestehen aus einem oder mehreren nichtmetallischen Stoffen, besitzen, mit Ausnahme des Gediegen-Arseniks, nicht über 4,0 Eigenschwere, sind meist schmelzbar, verbrennlich oder verdampfbar, unter Entwicklung eigenthümlichen Geruchs. Außer den Mineralien der Gruppe des Kohlenstoffes, alle lösbar in Säuren.

Sauerstoff; findet sich nicht rein in der Natur, sondern stets in Verbindung mit andern Elementen.

Wasserstoff kommt nie in reiner Gestalt vor; am häufigsten erscheint er in Verbindung mit Sauerstoff als Wasser, und ist in solcher Form in vielen unorganischen Verbindungen enthalten; findet sich aber in allen organisch-fossilen Substanzen.

Stickstoff; wird ebenfalls nicht rein getroffen, aber, in Verbindung mit Sauerstoff, als Salpetersäure kommt er mit Metallen vereinigt vor.

Chlor ist noch nicht frei in der Natur gefunden worden. Man trifft es in Verbindung mit einigen Metallen, besonders mit Natrium im Kochsalz.

Brom kommt nur selten und nie in unverbundenem Zustande vor. Es begleitet das Steinsalz und wird im Meerwasser, so wie in fast allen Quellen getroffen.

Jod findet sich nicht rein, sondern immer verbunden mit

andern Stoffen, und begleitet gewöhnlich die Brom- und Chlorverbindungen. Neuerdings wurde es in Verbindung mit Quecksilber entdeckt.

Fluor, ein Element, das weder rein in der Natur vorkommt, noch bis jetzt in reiner Form dargestellt worden ist. Aus seinen Verbindungen ergibt sich jedoch, daß es in seinen chemischen Verhältnissen große Aehnlichkeit mit Chlor besitzt. Findet sich mit mehreren Metallen verbunden.

I. Gruppe. Schwefel.


Er erscheint gediegen in der Natur, so wie in Verbindung mit vielen Metallen, mit Sauerstoff als Schwefelsäure; und als solche kommt er mit mehreren Metallsorben vereinigt vor.

1. Schwefel.

Syn. Natürlicher Schwefel. Prismatischer Schwefel. Soufre. Sulphur.

Kernform: rhombisches Oktaeder, $P \parallel P = 106^\circ 16'$ über den stumpfen Scheitellanten, $84^\circ 58'$; über den scharfen Scheitellanten; $143^\circ 24'$ über den Randlanten. Außer der Kernform (s. pag. 25 Fig. 11) kommen noch folgende Abänderungen öfters vor; 1) entscheidet, Fig. 25., 2) vierfach entscheidet in der Richtung der Flächen, Fig. 26., 3) entrandet, Fig. 27., 4) entschärfteitellantet, Fig. 28., 5) entstumpft, Fig. 29. u. s. w.

Fig. 25. Fig. 26. Fig. 27. Fig. 28. Fig. 29.



Auch Zwillinge kommen zuweilen vor. — Die durch Kunsterzeugte Krystalle weichen von den natürlichen ab und erscheinen in Formen, die auf eine schiefe rhombische Säule zurück zu führen sind.

Krystalle, einzeln ein- oder aufgewachsen, auch zu Drusen verbunden oder reihenförmig gruppiert; krystallinische Massen von körniger bis dichter (Schwefelspath), seltener von faser-

riger (Faser-Schwefel) Textur; häufig erdig (Schwefelerde); kugelig, nierenförmig, stalaktitisch, zerfressen, blasig, eingesprengt. Oberfläche mehr oder minder glatt.

Unvollkommen spaltbar parallel den Kern- und den Entzündungs-Flächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 1,5—2,5. Spec. Gew. = 1,9—2,1. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Fettglanz. Meist schwefelgelb, zuweilen citronen-, wein-, wachs- oder strohgelb, auch pomeranzengelb, gelblichgrau oder gelblichbraun. Strich: schwefelgelb bis gelblichweiß. Knistert beim Erwärmen in der Hand, gibt gerieben einen eigenthümlichen Geruch.

Verbrennt mit blauer Flamme zu schwefliger Säure, schmilzt im Kolben bei 144° C. zur bräunlichen, zähen Flüssigkeit, die beim Abkühlen ihre frühere gelbe Farbe wieder erhält. Sublimirt sich. In Kalilauge auflöslich.

In reinem Zustande nur aus Schwefel bestehend, zuweilen aber mit erdigen und bituminösen Theilen gemengt.

Der Schwefel findet sich auf höchst manigfache Weise in verschiedenen Gebirgs-Gesteinen: auf Quarzlagern im Oligonerschiefer, Tiefen in Quito; in körnigem Kalk, Carrara; in Uebergangskalk, Sublin im Kanton Waadt; vorzüglich in großer Menge in steinsalzführenden Gypsen und in den verschiedenen Schichten der Flöz- und tertiären Formationen: Girgenti, Cataldo, Milloc, Fiume u. a. D. in Sicilien; Urbino und Forli im Kirchenstaate; Reggio in Modena; Fontibagni in Toscana, Piemont; Savoyen; Conil bei Cadix in Spanien; Czarkow und Swarzwice bei Krakau; Lauenstein in Hannover; Ratoboy in Kroatien u. s. w. — Als Bindemittel von Quarzkörnern, in Grünland, zu Roisdorf am Rhein; in Sandstein zu Ochio in Sicilien und zu Siena in Toscana; im Schuttlande in Piemont; in Erdföhle zu Artern in Thüringen. — Auf Kupferkies-Gängen im Granit zu Ripoldsau im Schwarzwalde; auf Bleiglanz-Gängen im Siegenschen, zu Bries in Ungarn, Gallizien, Spanien. — In Trachyt am Montdor in Auvergne, Antisana in Quito. — Als Sublimation in der Nähe von Feuerbergen (vulkanischer Schwefel), Vesuv, Aetna, Island, Java, Teneriffa u. s. w. — Als Produkt von Erdbränden zu Häring in Tyrol, Braden in Staffordshire. — Als Absatz von Quellen (Schwefelsin-

ter, *Soufre thormogène*), zu Simbirsk in Sibirien, Ber im Canton Waadt; Aachen; Polen, Hessen u. a. D.

Der reine, in berben Massen vorkommende, Schwefel, ist schon Kaufmannsgut; meist aber muß er durch Auszuschmelzen oder Sublimation von denen, ihm beigemengten Erds oder Bitumen-Theilen gereinigt werden. Er wird vorzüglich zur Bereitung des Schießpulvers und der Schwefelsäure benutzt, ferner zu Schwefelfaden und Schwefelhölzern, zum Bleichen und Entfärben der Zeuge, zum Auschwefeln der Weinfässer, und in der Metallurgie. Giebt man den dickflüssigen Schwefel in kaltes Wasser, so bleibt er einige Tage weich, und wird zum Abdrücken von Münzen und zum Modelliren gebraucht. In der Heilkunde wird er äußerlich und innerlich häufig angewendet, besonders gegen Hautausschläge, Gicht u. s. w. Für solche Zwecke bedarf er jedoch einer sehr sorgfältigen Reinigung. Auch bei Thieren wird er oft mit Vortheil gebraucht.

II. Gruppe. Selen.

Findet sich nicht rein, sondern stets verbunden mit anderen Stoffen, und zwar mit Schwefel, oder mit verschiedenen Metallen.

2. Selen-Schwefel.

Faserige oder erdige Theile, mit orangegelber ins Braune fallender Farbe.

Im Kolben kommt er leicht in Fluß und sublimirt sich als orangegelber Beschlag. Verbrennt auf glühender Kohle mit Verbreitung von Schwefel- und rettigartigem, dem Selen eigenen, Geruch. Mit Salpetersäure digerirt wird er zersetzt und scheidet Schwefel aus. Chemische Zusammensetzung: Schwefel und Selen in unbekanntem Verhältniß.

Findet sich in Begleitung von Schwefel, Salmiak, Alaun, Borarsäure, Realgar u. s. w. auf der Insel Vulkano.

Phosphor; kommt in Verbindung mit Sauerstoff als Phosphorsäure, und als solche mit mehreren Metalloxyden vereinigt vor.

III. Gruppe. Arsenik.

Kommt gediegen vor, dann in Verbindung mit Sauerstoff, als arsenigte Säure, so wie mit Schwefel und verschiedenen Metallen. — Die Mineralien dieser Gruppe verflüchtigen sich vor dem Löthrohre und verbreiten starken Knoblauchartigen Geruch. Härte nicht über 4; specifisches Gewicht zwischen 5,4 — 6,0.

3. Gediegen-Arsenik.

Syn. Arsenic natif. Native Arsenik.

Kernform: Rhomboeder. $P \parallel P = 114^{\circ} 26'$ über den Scheitellanten; $= 65^{\circ} 34'$ über den Randlanten (Breithaupt).

Krystalle sehr selten, und nur nadelförmig, in Büscheln zusammengehäuft; traubig, kugelig, nierenförmig, stalaktitisch, gestrikt, eingesprengt; Platten und derbe Massen, häufig mit schaliger Absonderung. Textur: körnig bis dicht. Oberfläche: uneben.

Spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: uneben, feinkörnig. Härte = 3,5. Spröde. Spec. Gew. = 5,7 — 6. Undurchsichtig. Metallglanz. Zinnweiß ins Bleigraue, an der Luft schnell graulichschwarz anlaufend. Strich: zinnweiß mit erhöhtem Glanze.

Vor dem Löthrohre verdampfend mit starkem Knoblauch-Geruch; im Kolben sich sublimirend. Oxydirt sich in Salpetersäure. Im reinen Zustande nur Arsenik. Meist ist ihm aber Antimon oder Silber beigemengt.


Auf Gängen im älteren, zuweilen auch im jüngeren Gebirge, selten auf Lagern vorkommend, begleitet von Kalkspath, Flußspath, Baryt, Silber-, Blei- und Kobalterzen u. s. w. Wittichen im Schwarzwalde; Markirchen im Elsaß; Allemont in der Dauphinée; Andreasberg am Harz; Freiberg, Schneeberg u. a. D. im Erzgebirge; Sibirien, Ungarn, Norwegen u. Hierher gehört auch der sogenannte Arsenikglanz, ein Gediegen-Arsenik, dem Wismuth beigemengt ist, und der sich auf einem Gang im Gneise auf der Grube Palmbaum bei Geringwalde im Erzgebirge fand.

Das Arsenik wird da, wo es gediegen vorkommt, ausgehalten, und unter der Benennung Fliegenstein oder Scherbenkobalt in den Handel gebracht. Es wird zur Darstellung des weißen Arsens, als Beize in Färbereien, in der Metallurgie zu ver-

6. Auripigment.

Syn. Gelbes Rauschgelb. Gelbes Schwefel-Arsenik. Prismatoëdrischer Schwefel. Arsenic sulfuré jaune. Orpiment.

Fig. 31.



Kernform: gerade rhombische Säule. $M \parallel M = 79^\circ 20'$ und $100^\circ 40'$. Vorkommende Gestalten: 1) entstumpft, zur Schärfung über P und entschärft Fig. 31.; 2) entstumpft zur Schärfung über P und zweifach entschärft; 3) Andere verwickeltere Gestalten, Zwillinge u. s. w.

Krystalle, selten, meist undeutlich und mit einander verwachsen; häufiger trauben- oder nierenförmig, stalaktisch, geflossen, kugelig, verb, eingesprengt, als Ueberzug oder Pulver. Textur strahlig, schalig oder körnig-blättrig. Oberfläche: rauh oder gestreift.

Sehr vollkommen spaltbar parallel den Entschärfungsflächen. Bruch: uneben. $H. = 1,5 - 2$. Milde, in dünnen Blättchen biegsam. Spec. Gew. $3,4 - 3,5$. Durchscheinend, auch nur an den Ranten. Fettglanz, metallähnlicher Perlmutterglanz, Citronengelb, Pomeranzengelb; zuweilen röthlich oder grünlich. Strich: leichtes Citronengelb.

B. d. L. schmilzt es im Kolben leicht und sublimirt sich; auf Kohle verbrennend und sich gänzlich verflüchtigend unter Verbreitung von Arsenik- und Schwefel-Geruch. In Kalilauge leicht und vollkommen auflöslich. Chemische Zusammensetzung nach Längier:

Arsenik 61,86

Schwefel 38,14

100,00.

In Mergel und Thonlagen, begleitet von Realgar, Quarz und Kalispath zu Tajowa in Ungarn; in körnigem Gyps Salzberg bei Hall in Tyrol; auf Gängen mit Realgar, Bleiglanz, Eisenkies u. s. w. zu Kapnik, Felsöbanya, Andreasberg; als vulkanisches Erzeugniß mit Realgar an der Solfatara.

Das Auripigment findet dieselbe Anwendung, wie das Realgar; namentlich als Malerfarbe.

IV. Gruppe. Kohlenstoff.

Der Kohlenstoff kommt rein als Diamant, so wie in allen fossilen organischen Verbindungen vor; dann mit Sauerstoff vereinigt als Kohlensäure, und in solcher Form mit vielen Metallen.

Die physikalischen Eigenschaften der Mineralien, die hierher gehören, sind in mancher Hinsicht sehr verschieden, es scheint, daß nur eine geringe Aenderung des Aggregatzustandes des Kohlenstoffs eine große Abweichung im Aeußern der aus ihm bestehenden Substanzen hervorbringe.

Die Mineralien sind unschmelzbar; verbrennen aber bei Zutritt der Luft in sehr starkem Feuer zu Kohlensäure. Für sich im Kolben erhitzt, geben sie keinen bituminösen Rauch. Von Säuren nicht angreifbar.

7. Diamant.

Syn. Demant; oktaedrischer Demant. Diamond.

Kernform: regelmäßiges Oktaeder. Vorkommende Formen: 1) Kernform (Fig. 2. pag. 17.); 2) enteckt Fig. 32.; 3) beßgleichen zum Verschwinden der Kernflächen, Würfel (s. Fig. 1. pag. 17.); 4) entkantet Fig. 33.; 5) beßgleichen zum Verschwinden der Kernflächen, Rauten-Dodekaeder (s. Fig. 3. pag. 17.); 6) zweifach entkantet zum Verschwinden der Kernflächen Fig. 34.; 7) achtfach enteckt zum Verschwinden der Kernflächen Fig. 35.; 8) verschiedene Zwillingsgestalten. Die Varietäten No. 3, 5 und 7, meist mit zugerundeten Flächen.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 35.



Kommt nur in Krystallen oder in Körnern mit glatter, rauher oder gestreifter Oberfläche vor.

Sehr vollkommen spaltbar in der Richtung der Kernflächen. Bruch: muschelrig. Spröde. Besitzt den höchsten bekannten Grad der Härte = 10. Sp. Gew. = 3,5 — 3,6. Durchsichtig bis

durchscheinend. Sehr lebhafter Glanz: Diamantglanz. Wasserhell, doch auch gefärbt und zwar in den verschiedensten Nüancen von Weiß und Grau, zuweilen auch von Gelb, Grün und Braun; seltener sieht man kirsch- oder rosenroth, blau oder schwärzlich-braun.

Durch Isolation stark phosphoreszirend. Durch Reiben positiv electrisch, durch Erwärmen polarisch-electrisch werdend. Nicht-leiter der Electricität.

Sehr schwer verbrennbar, nur indem man ihn einer sehr starken Hitze aussetzt. Säuren ohne Wirkung. Chemische Zusammensetzung: reiner Kohlenstoff.

Die ursprüngliche Lagerstätte des Diamanten ist noch nicht genau bekannt, wenigstens sind die Meinungen der Geognosten hinsichtlich der geognostischen Stellung, welche der Felsart gebüre, in der er vorkommt, noch verschieden. Nach J. Franklin¹⁾ werden die Diamanten in der Gegend von Panna in Bundelkhand in einem Sandstein-Gebilde gefunden, das dem new red sandstone der Engländer analog ist. Es liegt auf Kohlenschiefer, wird von Kiasfalt bedeckt und kommt in den Merkmalen mit jener Felsart überein. Die Minen von Kamarya, Panna, Sakeriya u. a. m. sind hier im Betrieb. Man findet ihn ferner in einem Sandstein-Conglomerat noch an mehreren anderen Orten Ostindiens, wie zu Sumbhulpor. Auch unter den Geröllen an Abhängen, Vertiefungen und Schluchten, so wie im Sande der Ebenen und Flüsse werden Diamanten getroffen; wie zu Roalconda, Golconda, Bisapur, Hydrabad u. a. D. Insel Borneo. In Brasilien kommen sie im Gebiete der Itacolunit-Formation vor, und zwar ebenfalls in einer Sandstein-Brekzie, oder in einem Trümmergestein (Cascalho), das aus eisenschüssigem Thon, Quarz-Geröllen, Sand- und Eisenoryd-Fragmenten besteht, begleitet von Korund, Chrysolith, Topas u. s. w. im Thale Tejuco, dann längs der Flüsse Jequetinhonha und Pardo u. a. D. In Rußland wurden Diamanten unter ähnlichen Verhältnissen auf der Westseite des Ural zu Krestowosdwißenski gefunden.

Schon in den frühesten Zeiten hat der Diamant durch sei-

1) Brewster, Edinburgh Journal of Science No. IX. Juli 1831. J. Franklin on the diamond mines of Panna in Bundelkhand. pg. 150.

nen Glanz die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen und noch jetzt ist es der kostbarste Mineralkörper. Man gewinnt ihn in Ostindien und Brasilien durch Auswaschen aus dem Sande der Flüsse oder aus dem erwähnten Trümmergestein, und verwendet ihn zum Schmuck. 1456 wurde erst die Kunst erfunden, den Diamanten mittelst seines eigenen Pulvers zu schleifen. Nach den Formen, welche er erhält, wird er verschieden benannt, Brillant, Rosette u. s. w. Farbe, Reinheit, Art des Schnitts und besonders Größe bedingen den Werth desselben. Die unreinen Diamanten werden zum Glasschneiden, Graviren und zum Bohren anderer Edelsteine benutzt; oder sie werden zu Pulver gestoßen und als solches zum Schleifen von Diamanten und anderen harten Steinen verwendet. Versuche, welche man anstellte, um durch Schmelzung von Holzkohlen künstliche Diamanten darzustellen, gaben bis jetzt kein genügendes Resultat.

8. Graphit.

Syn. Rhomboedrischer Graphitglimmer, Reißblei. Fer carburé. Plumbago.

Kernform: sechsseitige Säule. Außer dieser kommen noch Entzündungen und Entdeckungen, jedoch selten, vor.

Kristalle, auf- oder eingewachsen, zu Gruppen verbunden; verb., eingesprengt. Textur: schuppig ins Dichte. Die P-Flächen glatt, die andern rauh.

Sehr vollkommen parallel den P-Flächen, spaltbar. Bruch: uneben bis muschelig. Milde, in dünnen Blättchen biegsam. Abfärbend. Härte = 1 — 2. Spec. Gew. = 1,8 — 2,4. Undurchsichtig. Metallglanz. Stahlgrau und Eisenschwarz. Strich: schwarz. Fett anzufühlen.

B. d. L. wenig veränderlich, unschmelzbar; lange darauf geblasen vermindert er sich und hinterläßt eine Asche, die die Reaction des Eisenoxyds zeigt. Säuren ohne Wirkung. Chemische Zusammensetzung: Kohle, die mit Eisen- und Titanoxyd, Kiesel und Thon verunreinigt ist.

In Granit, Gneiß (bei diesem zuweilen als Stellvertreter des Glimmers auftretend), in körnigen Kalk u. s. w. eingemengt; auf Gängen, Lagern oder Nestern vorkommend. Griesbach im Passauiſchen; Schlotthorn und Spitz in Oesterreich; Gefrees im

Bairenthischen; Leoben in Steyermark; Piemont, Frankreich; Gebirge Labourd in den Pyrenäen; Arendal u. a. O., in Norwegen, Grönland, Strathferran in Aberdeenshire; Borroisdale in Cumberland; New-Yersey, New-York, Rhode-Island u. a. O. in Nordamerika u. s. w.

Der Graphit, besonders der englische, wird zu den feinsten Bleistiften verwendet; der von andern Orten muß gewöhnlich erst durch Reinigung zu diesem Gebrauch zugerichtet werden. Mit einem Zusatz von Thon werden Schmelztiegel (Passauer-, Tyser- oder Reißbleitiegel) daraus gefertigt, die man zum Schmelzen von Gold, Silber, Messing und anderen Metallen gebraucht. Er wird ferner zum Schwärzen von Eisen- und anderen Waaren, zum Poliren der Metalle und Gläser, als Schmiere in einem Gemenge mit Fett bei hölzernen Maschinen u. s. w. angewendet. In neuerer Zeit hat man ihn auch als Heilmittel gegen die Flechten empfohlen.

9. Anthrazit.

Syn. Kohlenblende. Harzlose Steinkohle. Anthracite Blind-Coal.

Krystallform: nach Haüy gerade rhombische Säule, als Ergebnis der Spaltung.

Derb, kugelig, stängelig, eingesprengt. Textur: schalig, fönig bis dicht.

Bruch: muschelig. Wenig spröde. Härte = 2, — 2,5. Spec. Gew. = 1,4 — 1,7. Undurchsichtig. Metallglanz zum Fettglanz sich neigend. Sammet- oder graulichschwarz. Strich: graulichschwarz.

Verbrennt in der Drydationsflamme ohne zu schmelzen, mit Hinterlassung von etwas Asche. Säuren ohne Wirkung. Chemische Zusammensetzung: Kohle mit Eisenoxyd, Kieselersäure und Thon mehr oder weniger verunreinigt.

Kommt in verschiedenen Gebirgsarten vor: in Grauwacke zu Bischof bei Gera im Voigtlande; in Alaunschiefer zu Wetzstein bei Saalfeld. Auch erscheint er im Porphyr zu Schönfeld bei Frauenstein, in Granit zu Andreasberg. Ferner findet man ihn in Savoyen, Norwegen, England, Schottland (Caltonhill bei Edinburg); in Trapp: Irland, Nordamerika.

Wird als Brennmaterial in Kalköfen, Ziegelhütten, Nagel-

schmelzen, auch bei hüttenmännischen Prozessen verwendet. Der Anthrazit bedarf jedoch eines starken Luftzuges oder kräftigen Gebläses zur Unterhaltung des Brennens.

V. Gruppe. Boron.

Das Boron findet sich nicht rein in der Natur, sondern in Verbindung mit Sauerstoff als Borarsäure, und als solche mit wenigen Metallen.

10. Borarsäure.

Syn. Saffolin, prismatische Borarsäure. Acide boracique. Native boracic acid.

Noch nicht in Krystallen vorgekommen, nur in krystallinischen Blättchen, in schuppigen und faserigen Theilchen, die lose mit einander verbunden erscheinen; stalaktitisch, rindenartiger Ueberzug. Textur faserig und schuppig.

Sehr weich, leicht zerreiblich. Spec. Gew. = 1,48. Durchsichtig bis durchscheinend. Perlmutterglanz. Farblos. Weiß ins Gelbliche. Geschmack: erst säuerlich dann bitter. Fühlt sich fett an.

B. d. L. leicht und mit Aufschäumen zu einer farblosen. Glaskugel schmelzend; im Kolben Wasser gebend. Unlöslich in Wasser und Weingeist. Chemische Zusammensetzung:

Borarsäure... 55,74

Wasser..... 44,26

100,00

Als Absatz von heißen Quellen, Insel Volcano, als Bodensatz der Lagunen von Saffo, auch im heißen Wasser des Lago Cerchiajo, und anderer Seen.

Die Borarsäure wird gesammelt und zur Bereitung des Borax verwendet.

II. Klasse. Metalle.

I. Abtheilung.

Leichte Metalle.

Mineralien, deren Grundlage die Alkalien oder Erd-Metalle bilden. Ihr specifisches Gewicht übersteigt nicht 5; sie besitzen meist

Glasglanz. Geben weder für sich, noch mit kohlensaurem Natron geschmolzen einen Regulus.

I. Ordnung. Metalle der Alkalien.

Härte = 1 — 3,5. Specifisches Gewicht zwischen 1,5 — 4,6. Weiße Farbe vorherrschend, meist Glasglanz. Mehr oder minder leicht schmelzbar.

VI. Gruppe. Kalium.

Findet sich nicht rein in der Natur, sondern stets in oxydirttem Zustande, in Verbindung mit andern Metalloxyden.

Die Mineralien, hierher gehörig, besitzen ein specifisches Gewicht von 1,7 — 2. Härte = 2 — 3. Durchsichtig. Glasglanz. Weiß. Salziger Geschmack. Auflöslich in Wasser. Schmelzbar.

11. Kali-Salpeter.

Syn. Prismatisches Natrumsalz. Einfach-salpetersaures Kali. Potashe nitraté. Nitrate of Potash.

Kernform: Gerade rhombische Säule. $M \parallel M = 119^\circ$ und 61° . Die beobachteten Combinationen sind Erzeugnisse der Kunst.

Nadelförmige Krystalle, flockige oder berbe Massen in traubigem, rindenartigem Ueberzug. Textur zuweilen faserig. Oberfläche parallel den Randanten gestreift.

Unvollkommen spaltbar nach den Seiten der Kernform. Bruch: muschelrig. Härte = 2. Milde. Spec. Gew. = 1,93 — 2. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Farblos. Weiß, grau. Strich: weiß. Geschmack salzig, kühlend.

B. d. L. schmilzt er leicht zu einer weißen, durchscheinenden Masse. Auf Kohle geschmolzen verpufft er sehr lebhaft. An der Luft unveränderlich. In Wasser leicht löslich. Die Auflösung gibt mit salzsaurem Natron einen gelben Niederschlag. Chemische Zusammensetzung:

Kali..... 53,43

Salpetersäure .. 46,57

100,00

Der in der Natur vorkommende Kali-Salpeter gewöhnlich mit andern salpetersauren Salzen verunreinigt.

Ausblühend aus verschiedenen kalkigen und mergeligen Gesteinsarten, in Höhlen, als Ueberzug auf der Erdoberfläche. Burkhardtshöhle unfern Homburg in Baiern; Pulo di Molfetta in Apulien; Malta, Sicilien, Ungarn, Spanien, Brasilien, China, Ceylan.

Er wird zur Darstellung des künstlichen Salpeters benutzt, welcher vielfältigen Gebrauch findet, wie zur Bereitung des Schießpulvers (75 Theile Salpeter, 13 Kohle, 12 Schwefel), der Salpetersäure, als Schmelzmittel, zum Reinigen edler Metalle u. s. w. Auch als Heilmittel wird er bei entzündlichen Krankheiten angewendet.

12. Schwefelsaures Kali.

Syn. Potasse sulfatée. Sulphate of Potash.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M \parallel M = 67^{\circ} 52'$ und $112^{\circ} 8'$.

Krystalle meist nadelförmig, ferner krystallinische, stalaktitische und pulverige Massen.

Unvollkommen theilbar in der Richtung der Diagonalen der P-Flächen. Bruch: muschelig ins Unebene. Härte = 2,5 — 3. Spröde. Spec. Gew. = 1,73. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Weiß ins Graue und Gelbe. Strich: weiß. Geschmack salzig, bitter.

Decrepitirt beim Erhitzen und schmilzt auf der Kohle. Luft beständig; auflöslich in Wasser. Chemische Zusammensetzung:

Kali..... 54,75

Schwefelsäure.. 45,25

100,00

Findet sich in manchen Laven des Vesuv.

VII. Gruppe. Natrium.

Das Natrium wird nicht frei in der Natur getroffen, sondern in Verbindung mit mehreren anderen Stoffen, namentlich in großer Menge mit Chlor als Kochsalz.

Die Mineralien dieser Gruppe besitzen ein spezifisches Gewicht von 1,5 — 2,8. Härte = 1 — 3. Meist Glasglanz. Weiß. Leicht schmelzbar; auflöslich in Wasser.

13) Natron-Salpeter.

Syn. Soude nitrée. Nitrate of Soda.

Kernform: stumpfes Rhomboeder $P \parallel P = 106^{\circ} 30'$ über den Scheitellanten; $73^{\circ} 30'$ über den Randlanten.

Nur die Kernform ist bis jetzt beobachtet.

Krystalle und krystallinische Massen mit körniger Textur. Oberfläche glatt.

Sehr vollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform.

Bruch: muschelig. Härte = 1,5 — 2. Wenig spröde bis milde; sehr zerbrechlich. Spec. Gew. = 2,09. Durchsichtig. Glasglanz. Farblos. Weiß. Strich: weiß. Geschmack bitterlich, kühlend.

B. d. L. schmelzend, die Flamme gelb färbend. Berpufft auf Kohle, aber schwächer als Kali-Salpeter. Löslich in Wasser; es erfolgt kein Niederschlag mit salzsaurem Platin. Chemische Zusammensetzung:

Natron..... 36,7

Salpetersäure.. 63,3

100,0


Kommt in Lagern von verschiedener Mächtigkeit in Ihon auf 50 Meilen Erstreckung, im Distrikte Atakama in Peru vor.

Wird gewonnen und zur Darstellung des Kali-Salpeters verwendet.

14. Steinsalz.

Syn. Salzsaures Natron. Hexaedrisches Steinsalz. Natürliches Kochsalz. Soude muriatée. Muriate of Soda.

Fig. 36.



Kernform: Würfel. Vorkommende Formen: 1) Kernform (Fig. 1. pag. 17); 2) entetzt (Fig. 24. pag. 23.); 3) entantet, Fig. 36.; 4) dergleichen bis zum Verschwinden der Kernflächen, Rauten-Dodekaeder (Fig. 4 pg. 17).

Krystalle, einzeln aufgewachsen, zu Drusen und Gruppen, zuweilen treppenartig, verbunden, krystallinische Massen, plattenförmig, stalaktitisch, eingesprengt, verb. Asterkrystalle nach Witterspath-Rhomboedern. Textur blätterig (blättriges Stein-

salz), mehr oder minder fein faserig bis strahlig, theils gerade laufend, theils gebogen (faseriges Steinsalz), auch feinförnig bis grobförnig (förniges Steinsalz). Oberfläche der Krystalle glatt, häufiger rauh oder uneben.

Vollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muscheligg. Härte = 2, wenig spröde. Spec. Gew. = 2,2 — 2,3. Durchsichtig bis durchscheinend. Glas: bis Fettglanz. Farblos. Weiß, auch grau, roth, gelb, grün, blau in verschiedenen Mä-
n-
zen, zuweilen gefleckt oder geflammt. Geschmack angenehm salzig.

B. d. L. leicht schmelzbar, an dem Platindraht bei längerem Blasen sich verflüchtigend. Die Flamme gelb färbend. In Was-
ser leicht löslich, in feuchter Luft allmählig zerfließend. Das so-
genannte Knister-salz, das zu Wieliczka in krystallinisch-förnigen Massen vorkommt, stößt, wenn man es in Wasser legt, wäh-
rend es sich auflöst, unter verhältnißmäßig starken Detonationen große Gas-Blasen aus (Kieferstein). Das sich entbindende Gas ist, nach Dumas Versuchen, Wasserstoffgas, welches auch in den Wieliczkaer Gruben zuweilen vorkommt. Selbst beim Daraufschlagen läßt es schwache Knalle hören. — Chemische Zusammen-
setzung:

Natrium.. 39,66

Chlor 60,34

100,00

In der Natur oft mit schwefelsaurem Natron, Kalk, Talk, bituminösem Thon oder Eisenoryd verunreinigt.

Kommt sehr häufig vor, und zwar in Lagern, in großen Stöcken, oder eingesprengt; im Uebergangsfall begleitet von Schwefel zu Ber, Hallein im Salzburgischen; häufiger im Flözgebirge, namentlich zwischen dem Gyps und Thon der Muschelkalk-Formation: Gegend zwischen Heilbronn, Kochendorf und Sulz in Württemberg, Rappennau und Dürheim in Baden, Cardona in Spanien; Wit in Lothringen in der Keuper-Formation; Wieliczka und Bochnia in Gallizien im grünen Sandstein. Ferner findet es sich in England, Sicilien, Afrika, Amerika.

Als vulkanisches Erzeugniß an Feuerbergen, die Oberfläche der Laven bekleidend. Vesuv (1794, 1805, 1820). Hecla. Eiland Bourbon.

Als Ausblühung der Erdoberfläche oft weite Strecken über-

ziehend; die Steppen am kaspischen Meere und Aralsee; die Salzebene von Dankali in Habesch; die ganze Wüste längs des Nordabfalls des afrikanischen Hochlandes, wie Dombé, Bornu u. s. w.

Es erscheint aufgelöst in vielen Salzquellen, in dem Wasser des Meeres, und in dem mancher Binnenseen.

Das Steinsalz, eins der wichtigsten Bedürfnisse für alle Völker und Stände, wird, je nach der Art und Weise wie es vorkommt, verschieden gewonnen, theils bergmännisch durch unterirdischen Bau, theils durch Tagebau, wie zu Cardona in Spanien, wenn die Massen bedeutend sind; ferner wird es durch Verfließen aus den Salzquellen und dem Meerwasser erhalten. Eine der wichtigsten Erfindungen neuerer Zeit ist die Coolen-Gewinnung durch Bohrwerke, wie dieß in den Nectar-Gegenden geschieht. Man geht nämlich mit dem Bergbohrer so lange in dem Steinsalz-Gebirge nieder, bis eine Quelle siedwürdiger Coole aufgeschlossen wird, welche man dann durch ein in das Bohrloch zu setzendes Pumpwerk zu Tage hebt. Die Anwendung des Salzes in der Hauswirthschaft ist allgemein bekannt, es dient ferner als Heilmittel; zum Reinigen von Metall- und Glaswaaren; zur Bereitung des Saffrans, der Salzsäure, des Salmiaks u. s. w.; zur Fabrikation des Weiskupfers; als Zusatz in Färbereien; als Flussmittel verschiedener strengflüssiger Körper, als Glasurmittel in der Töpferei, zum Rösten der Silbererze vor ihrer Amalgamation u. s. w. Das unreine Stein- oder Kochsalz wird zur Fütterung des Viehes, zuweilen auch zum Düngen verwendet. Zu Wieliczka, Cardona u. a. D. werden aus rein- oder schöngefärbten Steinsalzmassen manche Geräthschaften, Spielzeuge u. a. Dinge gebreht.

15. Thenardit.

Kernform: gerade rhombische Säule $M \parallel M = 125^\circ$ und 55° . Abänderungen: 1) entrandet zum Verschwinden der M -Flächen; 2) entrandet zum Verschwinden der Kernflächen.

Krystalle und krystallinische Massen.

Spaltbar parallel den Kernflächen, vollkommen mit P. Bruch: muschelrig. Specifisches Gewicht = 2,73. Durchsichtig bis durchscheinend; an der Luft bedeckt er sich durch Aufnahme atmos-

phärischen Wassers, mit einem erdigen Ueberzug. Wasserhell, weiß.
Strich: weiß.

Im Kolben etwas Feuchtigkeit gebend, v. d. L. bei starker Hitze schmelzend. Löslich in Wasser. Chemische Zusammensetzung nach Casaseca:

Schwefelsaures Natron 99,78

Kohlenjaures Natron.. 0,22

100,00

Findet sich zu Salines d'Espartinas, 5 Stunden von Madrid, auf dem Boden eines Bassins. Zur Winterzeit bringt hier salzhaltiges Wasser hervor, welches verdunstet, sich concentrirt und den Thénardit absetzt. Zu Villamanrique in Toledo, als Ausblühung.

Man wendet ihn zur Bereitung von Soda in der Glasfabrik von Aranjuez an.

16. Glaubersalz.

Syn. Schwefelsaures Natron. Prismatisches Glaubersalz. Soude sulfatée. Sulphate of Soda.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 93^\circ 29'$ und $86^\circ 31'$. $P \parallel M = 102^\circ 49' 40''$ und $77^\circ 10' 20''$. Abgeleitete Gestalten sind Kunst-Erzeugnisse.

Nadelförmige und spießige Krystalle, tropfsteinartig, krustenartiger Ueberzug, mehligter Beschlag. Textur: körnig.

Vollkommen spaltbar parallel der kleinen Diagonale der P-Fläche. Bruch: muschelig. Härte = 1,5 — 2. Milde. Spec. Gew. = 1,48 — 1,5. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Wasserhell, weiß ins Graue und Gelbe. Geschmack kühlend, dann salzig bitter.

V. d. L. im Kolben schmilzt es leicht und gibt viel Wasser. Löslich in Wasser. Die Auflösung mit salzsaurem Baryt einen weißen Niederschlag gebend. Chemische Zusammensetzung nach Berzelius:

Natron..... 19,2

Schwefelsäure .. 24,8

Wasser 56,0

100,0

Eingesprengt in Gyps zu Mühlingen im Kanton Aargau, auswitternd aus Gyps und Mergel zu Ischel, Aulsee u. a. O. in Oesterreich, Hallein in Salzburg, Hall in Tyrol u. s. w.; aus-

bläsend aus Lava, wie am Vesuv (1813); als Absatz mineralischer und salziger Quellen: Eger, Saidschitz u. a. D. in Böhmen, Sibirien, Asien, Aegypten.

Findet es sich in größerer Menge, so wird es zur Darstellung von Soda und zur Spiegelfabrikation benutzt. Man gewinnt es meist als Nebenprodukt bei Bereitung des Kochsalzes.

17. Trona.

Syn. Urao.

Kernform: schiefe rhombische Säule: $M||M=152^{\circ}30'$ und $47^{\circ}30'$. $M||P. 105^{\circ}11'21''$ und $47^{\circ}48'39''$. Es kommen Entspitzungen vor.

Nadelförmige Krystalle. Verb. Textur.: strahlig.

Vollkommen spaltbar parallel der P-Fläche. Bruch: uneben. Härte = 2,5. Wenig spröde. Spec. Gew. = 2,112. Durchsichtig. Glasglanz. Farblos, weiß, gelblich oder graulich. Geschmack alkalisch.

B. d./P. im Kolben leicht schmelzend und viel Wasser gebend. An der Luft nicht verwitternd. Leicht löslich in Wasser. Chemische Zusammensetzung:

Natron..... 37,93

Kohlensäure.... 40,24

Wasser..... 21,83

100,00

Findet sich in großer Menge im Innern der Barbarei, in der Provinz Sufena, wo es den Erdboden überzieht; dann in einigen Natronseen bei Memphis in Aegypten, in denen des Thales Lagumilla in Columbien, eine Tagreise von Meriba.

Wird wie Soda verwendet; in Aegypten soll man es, da es nicht verwittert, zum Bau der Mauern der Festung Cosca gebraucht haben.

18. Kohlenfaures Natron.

Syn. Soda. Hemiprismatisches Natronsalz. Soude carbonatée. Carbonate of Soda.

Kernform: schiefe rhombische Säule: $M||M=79^{\circ}41'$ und $100^{\circ}19''$; $P||M=109^{\circ}20'40''$ und $70^{\circ}39'20''$.

Krystalle sehr selten, meist krystallinische Theile in krustenartigem Ueberzug, als mehliger Beschlag.

Unvollkommen spaltbar nach den Diagonalen der Endflächen. Bruch: muschelig. Härte = 1, — 1,5. Milde. Spec. Gew. = 1,423. Durchsichtig. Glasglanz. Farblos, weiß, gelblich oder graulich. Geschmack scharf alkalisch.

B. d. L. im Kolben leicht schmelzend und viel Wasser gebend. Das wasserfreie Salz schmilzt zu einem klaren, beim Abkühlen sich trübenden Glase, und färbt die Flamme gelb. Im Wasser leicht löslich. Mit Salzsäure brausend. An der Luft schnell zu weißem Pulver verwitternd. Chemische Zusammensetzung:

Natron 21,81

Kohlensäure..... 15,42

Wasser 62,77

100,00

Man findet es ausblühend aus Fels-Gesteinen, aus Glimmerschiefer zu Bilin in Böhmen, aus Laven am Vesuv, Aetna, Pic de Teyde, aus salzigem Thone in Mexiko, oder aus der Dammerde zu Debreczin in Ungarn, Tartarei, zwischen Psari und Dohai in Hindostan, Sibirien; ferner in den Natronseen Aegyptens, zumal in jenen der Wüste Makarius; im Tezcucó-See in Mexiko; Mongolei, China, Persien u. s. w. Auch ist es in vielen Mineralmassen enthalten.

Man verwendet es zur Fabrikation der Seife, zum Bleichen, als Zusatz bei Fertigung feinerer Glaswaaren, zum Bindemittel mancher Farben u. s. w. Auch in der Heilkunde wird es, wie wohl selten, gebraucht; aber in den meisten Mineralquellen ist es enthalten, und wirkt als Abführungsmittel.

19. Boraxsaures Natron.

Syn. Tinkal, Borax. Prismatisches Boraxsalz. Soude boratée. Borate of Soda.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M || M = 86^{\circ} 30'$ und $93^{\circ} 30'$; $P || M = 101^{\circ} 20'$ und $78^{\circ} 40'$. Es kommt Entmittelfeitung und Entscharfrandung vor.

Krystalle, krystallinische Massen mit körniger Textur. Oberfläche glatt, auch gestreift.

Unvollkommen spaltbar parallel den Seitenflächen und den beiden Diagonalen der Endflächen. Bruch: muschelig. Härte = 2,0 — 2,5. Wenig spröde. Spec. Gew. = 1,5 — 1,7. Durch-

sichtig, mit doppelter Strahlenbrechung, bis durchscheinend. Fettglanz. Farblos, weiß, grau, grünlich, gelblich oder bräunlich. Geschmack süßlich alkalisch.

B. d. L. bläht es sich auf und schmilzt zu farblosem Glase; im Kolben gibt es viel Wasser. Auflöslich in Wasser. Chem.

Zusamf. nach Klaproth: nach Gmelin:

Natron.....	14,5	—	—	16,7
Borarsäure ..	37,0	—	—	36,4
Wasser.....	47,0	—	—	46,9
	98,5			100,0

Findet sich auf dem Grunde und am Ufer des Sees Man mon-ta-lei in Tibet.

Wird zur Darstellung des raffinirten Boraxes verwendet, welchen man als Heilmittel, als Flussmittel bei der Glasfabrikation und bei metallurgischen Arbeiten u. s. w. gebraucht.

Eithium; kommt nur als Dryd in Verbindung mit andern Stoffen in einigen Mineralien vor.


VIII. Gruppe. Ammoniak*).

Findet sich nur mit Säuren verbunden. — Die Mineralien hierher gehörig, besitzen eine Härte von 1, 5—2. Spec. Gew. = 1,5. Glasglanz. Farbe: weiß. Verflüchtigen sich in starker Hitze; entwickeln mit Kalilauge übergossen Ammoniakdämpfe; sind leicht auflöslich in Wasser.

20. Salmiak.

Syn. Oktaedrisches Ammonialsalz. Ammoniaque muriatée. Muriate of Ammonia.

Fig. 37. Kernform: regelmäßiges Oktaeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform (Fig. 2. pg. 17.); 2) enteckt zum Verschwinden der Kernflächen, Würfel (Fig. 1 pg. 17.); 3) Vierfach enteckt in der Richtung und zum Verschwinden der Kernflächen, Trapezoeder Fig. 37.; 4) entkantet zum Verschwinden der Kernflächen. Rauten-Dodekaeder (Fig. 3. pg. 17.).



*) Ist zwar eine Verbindung von Wasserstoff und Stickstoff, allein es hat in mancher Beziehung so viel mit den Alkalien gemein, daß seine Verbindungen wohl hier aufgeführt werden können.

Krystalle, krystallinisch, haarförmig, stalaktitisch, traubig, kugelig, flockige Massen, als krustenartiger Ueberzug und mehrlartiger Beschlag. Textur zuweilen faserig. Oberfläche der Krystalle glatt.

Spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig. Härte = 1,5 — 2. Milde. Spec. Gew. = 1,45. Durchsichtig. Glasglanz. Wasserhell. Weiß, gelblich, graulich, grünlich, braunlich, schwärzlich. Geschmack scharf, stechend.

Verflüchtigt sich in der Hitze, leicht auflöslich in Wasser. Chem. Zusamf. nach Gmelin:

Ammoniak. 31,5

Salzsäure.. 68,5

100,0

Findet sich als vulkanisches Sublimat auf der Oberfläche und in den Spalten und Höhlungen der Laven. Aetna (in großer Menge bei den Eruptionen von 1635, 1669, 1763, 1792, 1811), Vesuv (1794, 1805), Lipari, Lancerote (1824), Bourbon; Vulkane der Tartarei und Amerika's. — Auch als Produkt brennender Kohlen-Flöze hat man ihn gefunden zu St. Etienne bei Lyon und bei Glan in Rheinbaiern.

Er wird, wo er in größerer Menge vorkommt, zur Darstellung des künstlichen Salmiaks benutzt, der unter andern in der Heilkunde, beim Verzinnen und Löthen der Metalle, beim Goldschmelzen, in der Färberei u. s. w. seine Anwendung findet.

21. Mascagnin.

Syn. Ammoniaque sulfatée. Sulphate of Ammonia.

Kernform: gerade rhombische Säule $M||M=90^{\circ} 38'$ und $89^{\circ} 22'$.

Tropfsteinartig, als mehligter Beschlag.

Spaltbar parallel den M-Flächen. Bruch: uneben. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Gelblich, weiß, zitronengelb, graulich. Geschmack scharf, bitterlich.

Auf der Kohle vor dem Löthrohre schmilzt er leicht unter Schäumen, und verdampft. Im Kolben gibt er Wasser und sublimirt sich. Auflöslich in Wasser. Chem. Zusamf. nach L. Gmelin:

Ammoniak... 22,7

Schwefelsäure 53,3

Wasser 24,0

100,0

Findet sich als vulkanisches Erzeugniß am Vesuv und Aetna, dann aufgelöst in den Lagunen von Siena in Toscana und auswitternd aus der Erdoberfläche in der Umgegend von Turin.

Wird zuweilen als Arzneimittel angewendet.

IX. Gruppe. Baryum.

Kommt nicht rein in der Natur vor, sondern hauptsächlich in Verbindung mit Schwefel- und Kohlen säure.

Die Mineralien, hierher gehörig, besitzen eine Härte von 3,0 — 3,4 und ein spezifisches Gewicht von 4,3 — 4,58. Schmelzen zu ihrem Emaill.

22. Schwefelsaurer Baryt.

Syn. Schwerspath. Prismatischer Hal-Baryt. Baryte sulfatee. Sulphate of Barytes.

Kernform: gerade rhombische Säule: $M||M=101^{\circ}42'23''$ und $78^{\circ}17'37''$.

Fig. 38.



Fig. 40.




Fig. 39.





Fig. 41.



Unter den zahlreichen Gestalten (Hauy führt deren 73 an), welche, außer der Kernform (Fig. 16. pg. 21.), vorkommen, erscheinen vorzüglich häufig 1) entspißect; 2) enteck zum Verschwinden von M, Fig. 38.; 3) enteck, Fig. 39., oft schreitet die Enteckung bis zur Schärfung über den Seiten vor; 4) entstumpfec oft zur Schärfung über P und den stumpfen Seiten, Fig. 40.; 5) zweifach entstumpfec und entspißect zur Schärfung über den Seiten, Fig. 41.; 6) entschärfec; 7) entstumpfec; 8) entschärfec und zweifach entstumpfec zur Schärfung über den

stumpfen Seiten, Fig. 42.; 8) entseitet und enteck, Fig. 43.; 10) enteck, entrindet und entschärft u. s. w.

Fig. 42.





Fig. 43.



Der Habitus der Krystalle tafelartig; krystallinische und de be Massen; Textur blätterig, strahlig, faserig, körnig; dicht und kräftig, nach welchen Verhältnissen die verschiedenen Arten unterschieden werden. Die Oberfläche der Krystalle meist glatt, Kanten und Ecken mancher Abänderungen zuweilen abgerundet.

Vollkommen spaltbar parallel den Kernflächen, am deutlichsten mit P. Bruch: unvollkommen muschelig. Härte = 3,0 — 3,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,3 — 4,58. Durchsichtig bis durchscheinend. Strahlenbrechung doppelt. Glas- bis Fettglanz. Selbst wasserhell, gewöhnlich gefärbt, weiß, grau, gelb, roth, blau, braun, in verschiedenen Nuancen. Strich: weiß. Durch Bestrahlung mit Erwärmung Phosphoreszenz erlangend, geglähte Stücke leuchten nach einiger Zeit noch im Dunklen.

B. d. L. gewaltsam deceptitirend, schmelztig schmelzt zu einem weißen Email, die Flamme gelblichgrün färbend. Zerkleinert ohne Wirkung. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Baryum..... 65,5

Schwefelsäure. 34,5

100,0

Dem Baryt ist zuweilen Kalk, Kiesel oder Eisenoryd bingemengt.

Arten:

1) Barytspath.

Syn. B. s. cristallisée et laminaire; lamellar Heavy-Spar.

Krystalle, auf- und in einandergewachsen, manigfach gruppiert, zumal fächer-, mandel- und rosenförmig; krystallinische Massen, gerade- oder krummschalig, stängelig, nadelförmig, zuweilen büchelartig gruppiert (Stängenspath), kugelig, nierenförmig, dorb. Häufig mit Quarzkrystallen, Chalzedon, Eisenorydhydrat u. s. w.

Blum, Dryptognose.

überzogen. Textur: blätterig. Weiß, gelblichweiß, gelblichgrau, wachsgelb, graulichweiß ins Rauchgraue, röthlichweiß bis fleischroth, smalte- bis indigblau, pomeranzengelb, graulichschwarz. — W. Nicol fand in einem Barytspathkrystall eine Flüssigkeit, die, als er sie sorgfältig herausgebracht hatte, an der Luft krystallisirte und zu geraden rhombischen Säulen des Baryts anschoß.

Erscheint auf Gängen, vorzüglich im älteren Gebirge, begleitet von verschiedenen Erzen. Schriesheim, Randern, Münsterthal, Badenweiler in Baden, Freiberg (hier u. a. der Stangenspath auf der Grube Lorenz Segentrum), Marienberg, Joachimsthal im Erzgebirge; Iberg, Grund, Wolfstein und Klausthal am Harz, Harzowig, Prziham, Mies in Böhmen, Schemnitz, Kremnitz, Kapnik, Felsőbanya, Offenbanya u. a. O. in Ungarn, Leogang im Salzburgischen, Champex, Coude, la Courtade in Auvergne Derbyshire, Tyrol u. s. w. Neuerlich wurde auf der Grube Watergate-Pit zu Middle Hulton bei Bolton in Lancashire ein Barytspath-Gang, mit Kalkspath untermengt, die Kannelkoble durchschend, gefunden. — Der Hepatit, ein mit bituminösen Stoffen gemengter Baryt, welcher beim Reiben oder Schlagen einen hepatischen Geruch entwickelt, kommt im Alaunschiefer bei Andrarum in Schonen, auf Gängen bei Kongsberg in Schweden und zu Burton in Derbyshire vor.

2) Strahliger Baryt.

Syn. Strahlbaryt. Bologneserspath. B. s. radiée; radiated Heavy-Spar.

Runde oder plattgebrückte Stücke, von strahliger Textur, mit unebener Außenfläche. Durchscheinend. Asch-, gelblich- oder grünlichgrau.

Findet sich in einem gypsführenden Thonmergel am Monte Paterno bei Bologna und zu Amberg in der Oberpfalz.

3) Faseriger Baryt.

Syn. Faserbaryt. B. s. concrétionnée fibreuse; fibrous Heavy-Spar.

Kugelige, traubige, nierenförmige und knollige Massen, mit auseinanderlaufend faseriger Textur. Weiß, gelblichweiß ins Gelbe und Braune.

In Thonschichten am Battenberg bei Neu-Lemningen in Rhein-Baiern; auf Eisenerz-Gängen im Thonschiefer zu Chaubontaine bei Lüttich; im Kupferschiefer-Gebirge zu Etchelberg unfern Kahl im Speessart. Sachsen, Ungarn, Amerika.

4) Körniger Baryt.

Syn. B. s. granulaire; granular Heavy-Spar.

Derbe Massen mit klein- und feinkörniger Textur. Durchscheinend. Weiß ins Graue, Gelbe und Rothe.

Auf Lagern im älteren Gebirge zu Rauroth unfern Wiesbaden in Nassau; zu Peggau in Steyermark, Rehverbühl in Tyrol, Servoz in Savoyen; Graubünden, Irland, Sibirien.

5) Dichter Baryt.

Syn. Barytstein. B. s. compacte; compact Heavy-Spar.

Derb, selten nierenförmig oder knollig. Dicht. Bruch splinterig ins Erdige. Schimmernd. Blaulichgrau, gelblich, röthlich und graulichweiß.

Auf Gängen und Lagern. Niechelsdorf in Hessen, Rammelsberg bei Goslar am Harz; Halsbrücke bei Freiberg; Val Lanzo in Piemont, Servoz in Savoyen, Derbyshire, Tyrol, Steyermark.

6) Erdiger Baryt.

Syn. Baryterde. B. s. terreuse; Heavy-Spar-Earth.

Staubartige, selten schuppige Theilchen, als Ueberzug oder eingesprengt. Matt. Röthlich oder gelblichweiß. Mager anzufühlen.

Drusenräume erfüllend auf Barytspath-Gängen, oder nur die Wandungen derselben überkleidend zu Niechelsdorf und Bieber in Hessen, Kanstein in Westphalen, Freiberg, Schriesheim in Baden, Ungarn, Derbyshire.

Der Baryt wird zur Darstellung des salzsauren Baryts verwendet, zum Verfälschen des Bleiweißes, als Streusand, zur Soda-Fabrikation und zur Darstellung verschiedener Baryt-Präparate.

23. Kohlensaurer Baryt.

Syn. Witherit. Diprismatischer Halbaryt. Baryte carbonatée. Carbonate of Barytes.

Kernform: gerade rhombische Säule $M||M=118^{\circ} 30'$ und $61^{\circ} 30'$. Vorkommende Gestalten: 1) entschärft und entspizect zur Schärfung über P; 2) entschärft, entspizect und entrandet; 3) dergleichen zur Spizung über P; 4) Zwillinge.

Krystalle, zu Büscheln oder drusig verbunden; krystallinische Massen mit stänglicher Zusammensetzung; nierenförmig, traubig, kugelig, stalaktitisch, zerfressen, als rindenartiger Ueberzug; derb, eingesprengt. Textur blätterig ins Strahlige. Oberfläche gestreift, drusig oder rauh.

Unvollkommen spaltbar parallel den Flächen der Kernform und in der Richtung der kleinen Diagonale. Bruch: uneben. Härte = 3, — 3,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,3. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz, auf Bruchflächen Fettglanz. Gelblich- oder graulichweiß, weingelb, graulich, grünlich, röthlich. Strich: weiß. Durch Erwärmung phosphoreszirend.

B. d. L. leicht zu einem weißen Email schmelzend; mit Borax unter heftigem Brausen zu einem klaren Glase. In verdünnter Salzsäure unter Brausen lösbar. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Baryt.....	77,5	79,66
Kohlensäure	22,5	20,00
		0,33 Wasser
	<hr/> 100,0	<hr/> 99,99

Findet sich auf Gängen zu Arkendale in Cumberland; Alston-moor in Durham; Anglesark in Lancashire; Shropshire; Westmoreland; Mariazell in Steyermark; Leogang im Salzburgerischen; Szlana in Ungarn.

Warmblütigen Thieren ein tödtliches Gift; wird in England zur Vertilgung der Ratten verwendet.

X. Gruppe. Strontium.

In der Natur noch nicht in reinem Zustande gefunden, sondern in Verbindung mit Schwefel und Kohlensäure.

Die Mineralien dieser Gruppe besitzen eine Härte von 3, — 3,5, eine Eigenschwere von 3,6 — 4,0. Glasglanz. Schmelzbar.

24. Schwefelsaurer Strontian.

Syn. Célestin. Prismatoidischer Halbaryt. Strontiane sulfatée. Sulfate of Strontian.

Fig. 44.





Fig. 45.



Kernform: gerade rhombische Säule $M \parallel M = 104^\circ 48'$ und $75^\circ 12'$. Die wichtigsten vorkommenden Gestalten sind: 1) entspißect zur Schärfung über den scharfen Seiten, Fig. 44.; 2) desgleichen und zur Schärfung über P (ähnlich Fig. 38, pg. 96.); 3) desgleichen und entstumpfect; 4) entspißect zur Schärfung über den scharfen Seiten und entstumpfect; 5) desgleichen und entrandet, Fig. 45. u. s. w.

Krystalle. Krystallinisch. Verb. Textur: blätterig, strahlig, faserig, auch dicht. Oberfläche glatt, zuweilen gestreift.

Vollkommen spaltbar, parallel den P-Flächen, weniger deutlich in der Richtung der Seitenflächen und der beiden Diagonalen der Endflächen. Bruch: unvollkommen muschelig, uneben. $H. = 3, = 3,5$. Spröde. Spec. Gew. 3,85 — 3,96. Durchsichtig bis durchscheinend. Strahlenbrechung doppelt. Glas- bis Fettglanz; zuweilen Perlmutterglanz. Wasserhell. Weiß ins Graue, Blaue, Gelbe und Rothe. Strich: weiß. Durch Erwärmen phosphoreszirend.

B. d. L. verknisternd, zu weißem Email schmelzend; die Flamme purpurroth färbend; mit Borax zu einem klaren Glase, das aber abgekühlt gelb oder braun wird. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusams. nach L. Gmelin.

Strontian... 56,52

Schwefelsäure 43,48

100,00

Zuweilen mit schwefelsaurem Baryt, Eisenoxyd und Kalk verunreinigt.

Arten:

1) Celestine, spath.

Syn. Späthiger schwefelsaurer Strontian. St. s. cristallisé et laminaire; foliated Celestine.

Krystalle, zuweilen nadelförmig, zu Drusen und Gruppen verbunden; krystallinische Massen, mit schaliger oder blätteriger

Textur. Austerkrystalle nach Gypsformen. Blaulichweiß, blaulich-grau bis smalte- und himmelblau, selten röthlich oder olivengrün.

In secundären Gebirgsarten, häufig begleitet von Kalkspath und Schwefel; Val di Noto, Val Mazzara, St. Cataldo, Ger-
genti u. a. D. auf Sicilien; Süntel und Northen in Hannover
(im Muschelfalk), Meudon unfern Paris; Seisser-Alpe in Tyrol,
Aarau in der Schweiz, Monte Viale in Vicenza, Bristol in
England, Baltimore, Lac Erie. In der Braunkohle der Umge-
gend von Paris. Im Augit-Porphyr: Montecchio maggiore und
Castellgomberto im Vicentinischen, Calton-Hill bei Edinburgh.
Auf Erzgängen, Scharfenberg bei Meissen; Leogang im Salzbur-
gischen. Grube Bergwerks-Wohlfahrt zu Clausethal.

2) Strahliger Celestin.

Syn. Strahliger schwefelsaurer Strontian. St. s. fibro-laminaire;
radiated Celestine.

Krystallinische Massen mit strahliger Textur. Schnee-, milch-
und gelblichweiß.

Aarau in der Schweiz, Northen in Hannover. Seisser-Alpe,
Girgenti in Sicilien, Spanien u. s. w.

3) Faseriger Celestin.

Syn. Faseriger schwefelsaurer Strontian. St. s. fibreuse-conjointe
fibrous Celestine.

Krystallinische Massen mit gleichlaufend-faseriger Textur.
Zuweilen Perlmutterglanz. Indig-, smalte-, himmelblau ins
Graue und Weiße.

In dünnen Lagen im Mergel des Muschelfalks, Dornburg
bei Jena; Bouvron in Frankreich, Bristol in England; Molina
in Arragonien; Frankstown in Pensylvanien.

4) Dichter Celestin.

Syn. Kalkhaltiger schwefelsaurer Strontian. St. s. calcariarifere; com-
pact Celestine.

Derbe, sphäroidische Massen, im Innern aufgebürstet und
rissig; Textur feinkörnig ins Dichte. Gelblich- und grünlich-
grau ins Gelbe und Braune. Mit 8—9 p. c. kohlensauren
Kalkes verunreinigt.

Im Grobkalk: Montmartre bei Paris.

Wird zur Darstellung des salz- und salpetersauren Strontians, den man zum Hervorbringen des rothen Feuers gebraucht, und verschiedener Präparate verwendet.

25. Kohlensäurer Strontian.

Syn. Strontianit. Peritomer Halbaryt. Strontians carbonatée. Carbonate of Strontian.

Kernform: gerade rhombische Säule $M \parallel M = 62^\circ 44'$ und $117^\circ 16'$. Vorkommende Formen: 1) entschärfseitig; 2) beßgleichen entrandet und entspißet; 3) zweifach entrandet und entschärfseitig; 4) beßgleichen und zweifach entspißet, in der Richtung von P; 5) Zwillinge, ähnlich denen des Arragonits.

Krysalte, zuweilen nadelförmig, zu Büscheln und Gruppen verbunden; krystallinische Massen mit strahliger Textur. Verb. Oberfläche häufig rauh oder parallel dem Rande gestreift.

Hiemlich vollkommen spaltbar parallel den Seiten. Bruch: uneben ins Kleinmuschelige. Härte = 3,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,6 — 3,7. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz, auf Bruchflächen Fettglanz. Weiß ins Graue, Gelbe und Grüne; apfel- oder pistaziengrün. Strich: weiß. Phosphoreszirt durch Erwärmung.

B. d. L. rasch erhitzt verknisternd, an den Kanten schmelzend, unter Austreibung von kleinen weiß leuchtenden Aschen; die Flamme purpurroth färbend; mit Borax unter heftigem Brausen zu Flarem Glase. Lösbar unter Brausen in verdünnter Salzsäure. Chem. Zusamf. nach L. Gmelin.

Strontian 70,3

Kohlensäure .. 29,7

100,0

Enthält oft kohlensauren Kalk, kohlensaures Manganoxyd und Wasser beigemengt.

Findet sich auf Gängen: Strontian in Argyleshire, Bräunsdorf bei Freiberg; Leogang im Salzburgischen, Popayan in Peru.

XI. Gruppe. Calcium.

Dasjenige Alkali-Metall, welches am häufigsten vorkommt; es findet sich jedoch nicht im reinen Zustande, sondern in Verbindung mit andern Stoffen, vorzüglich mit Kohlensäure, Flußsäure, Schwefelsäure, Kieselerde u. s. w.

Die Mineralien hierher gehörig besitzen eine Härte von 1,5 — 5. Spec. Gew. = 1,9 — 3,4. Glasglanz. Farblos; oder weiße Farbe vorherrschend. Außer kohlensaurem Kalk und Arragonit, mehr oder minder leicht oder schwierig schmelzbar.

26. Kalksalpeter.

Syn. Salpetersaurer Kalk. Mauersalpeter. Chaux nitratée.

Barte haar- und nadelförmige Krystalle, welche regelmäßige sechsseitige Säulen zu seyn scheinen; krustenartiger Ueberzug, flockige Effloreszenzen und erdiger Beschlag.

Weich, aber etwas spröde. Durchscheinend. Wasserhell, öfter schneeweiß. Strich: weiß. Geschmack scharf und bitter.

Auf glühenden Kohlen verpufft er schwach; hinterläßt einen weißen Rückstand, der die Reaction des Kalkes zeigt. An der Luft zerfließend; in Wasser leicht löslich. Chem. Zusam. nach Kirwan, des trockenen Kalksalpeters nach L. Gmelin:

Kalk.....	32,0	34,6
Salpetersäure.	57,5	65,4
Wasser,	10,5	
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Findet sich als Ausblühung der Erdoberfläche in manchen Gegenden Afrikas, Spaniens u. s. w., an Wänden alter Strecken, an Mauern von Kellern, Gewölben, Kasematten, Viehställen u. s. w. Auf Ceylon und in Bengalen ist das Gestein vieler Höhlen, welches aus einem Gemenge von Kalk und Feldspath bestehen soll, mit Kalksalpeter imprägnirt.

Wird zur Darstellung des Kalisalpeters benutzt.

27. Flußsaurer Kalk.

Syn. Fluß. Octaedrisches Flußhaloid. Chaux apatée. Fluats of Lime.

Kernform: regelmäßiges Octaeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform (Fig. 2. pg. 17.); diese selten so verzogen, daß ein spitziges Rhomboeder daraus entsteht, bei welchem jedoch die Kanten zugerrundet erscheinen; 2) entect (Fig. 24. pg. 22.); 3) beßgleichen z. Verschw. der Kernflächen (Würfel Fig. 1. pg. 17.); 4) entkantet (Fig. 33. pg. 81.); 5) beßgleichen z. Versch. der Kernflächen (Kanten-Dodekaeder) (Fig. 3. pg. 17.); 6) Vier-

fach enteckt in der Richtung der Kanten und 3. Verschw. der Kernflächen (Würfel zweifach entkantet 3. Versch. der Kernflächen), Fig. 46.; 7) fünffach enteckt 3. Verschw. der Kernflächen (Würfel zweifach entkantet), Fig. 47.; 8) enteckt und entkantet, Fig. 48, u. s. w.

Fig. 46.




Fig. 47.




Fig. 48.



Krystalle. Derbe Massen, zuweilen mit körniger oder stänglicher Textur. Dicht. Erdig. Oberfläche meist glatt, auch drusig oder rauh.

Sehr vollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig ins Unebene. Härte = 4. Spröde. Spec. Gew. = 3,1 — 3,17. Durchsichtig bis durchscheinend. Starker Glasglanz. Selten ungefärbt, meist weiß, grau, gelb, grün, blau, roth in verschiedenen Nuancen. Strich: weiß. Als Pulver, seltener in Bruchstücken oder Krystallen, auf glühendem Eisenblech mit grünem oder blauem Lichte phosphoreszirend.

B. d. L. zerknisternd, auf Kohle bei einem guten Feuer zu einer unklaren Perle schmelzend; mit Borax zu klarem Glase; ebenso mit Gyps, wo das Glas aber bei der Abkühlung unklar wird. Das Pulver entwickelt, mit Schwefelsäure übergossen, flussaure Dämpfe, die das Glas ähen. Chemische Zusammensetzung nach Berzelius:

Kalk..... 72,137

Flußsäure..... 27,863

100,000

Arten:

1) Flußspath.

Syn. Ch. fl. cristallisée et laminaire. Fluor-Spar.

Krystalle, Ecken und Kanten zuweilen zugerundet, einzeln auf- oder zu mehreren durcheinander gewachsen, drusig verbunden, treppenförmig gruppiert; krystallinische Massen, mit stänglicher,

körniger oder schalliger Zusammensetzung; eingesprengt, selten als Versteinerungsmittel von Entrochyten (Derbyshire): Weiß, röthlich-, gelblich-, grünlichweiß; grau, gräulich- und blaulich-schwarz; viol-, lasur- und himmelblau; span-, seladon-, smaragd-, pistazien-grün; wein- und wachsgelb; carmin- bis rosenroth, gelblichbraun. Zuweilen Ecken und Kanten dunkler gefärbt, oder verschiedene Farben an einem Krystall; ferner dunkler gefärbte Krystalle von hellern oder anders gefärbten umschlossen; manche Krystalle beim Darauffehen saphirblau, beim Durchsehen smaragdgrün.

Ist sehr verbreitet und kommt vorzüglich auf Gängen, seltener auf Lagern vor. Schriesheim, Münsterthal, Hofsgrund in Baden; Zinnwald, Altenberg, Freiberg, Gersdorf u. a. D. im Erzgebirge; Andreasberg und Lauterberg am Harz; Moldawa und Kapnik in Ungarn; Tyrol; St. Gotthard; Montblanc; Frankreich; Derbyshire, Cornwall, Devonshire, Cumberland, Northumberland, Rongsberg in Norwegen, Finland (zumal im körnigen Kalk in zugerundeten Körnern bei Gröby); Sibirien, Amerika u. s. w. - Im Grobkalk bei Paris; in Auswürflingen des Vesuv.

2) Flußstein.

Syn. Dichter Fluß. Ch. fl. compacte; compact Fluor.

Derbe Massen. Dicht. Bruch: flachmuschel. Durchscheinend. Schimmernd oder matt. Weiß. Grünlichgrau oder grünlichweiß; roth, zuweilen gefleckt oder geflammt.

Auf Gängen. Stolberg am Harz; Maurienne in Savoyen; Rongsberg; Yrsjö in Schweden, Grönland u. s. w.

3) Flußerde.

Syn. Erdiger Fluß. Ch. fl. terreuse; earthy Fluor.

Staubartige Theile, lose verbunden, häufig als Anflug oder Ueberzug. Matt. Violblau, lavendelblau, perlgrau.

Wahrscheinlich aus zerstörtem Flußspath hervorgegangen. Marienberg in Sachsen, Welfendorf in Baiern, Rongsberg, Devonshire, Durham, Ratofka im Gouvernement Moskwa (daher der Name Ratofkit).


Einige flussaure Kalle entwickeln beim Reiben oder Schlagen einen unangenehmen Geruch, wie der von Wessendorf u. s. w. (hepatischer Fluß).

Wird als Zuschlag beim Kupfer-, Eisen-, und Silberschmelzen gebraucht, ferner zum Probiren der Eisensteine; im Gemenge mit Gypsspath zum Ueberzug für kupferne und messingene Kochgeschirre; bei der Fabrikation von Porzellan und Glas. In Buxton, Derby und andern Orten in Derbyshire schneidet, dreht und polirt man den Flußspath zu Ringsteinen, zu Knöpfen, Vasen, Tafeln, Bechern, Tellern, Tassen, Leuchtern u. s. w. — Die dem Minerale eigenthümliche Säure, Flußsäure, wendet man zum Aetzen in Glas an. Von Heinrich Schwanhard in Nürnberg 1670 zuerst gebraucht.

28. Schwefelsaurer Kalk.

Syn. Anhydrit. Muriazit. Prismatisches Gypshaloid. Chaux anhydro-sulfatée; anhydrous Gypsum.

Fig. 49.



Kernform: gerade rektanguläre Säule. Beobachtete Gestalten: 1) entseitet; 2) dreifach entseitet in der Richtung der M-Flächen, Fig. 49.

Krystalle, krystallinische Massen von blättriger, strahliger und körniger Textur. Dicht. Oberfläche glatt oder parallel den Kanten gestreift.

Vollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: unvollkommen muschelig. Härte = 3, — 3,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,7 — 2,89. Durchsichtig bis durchscheinend. Glas, zuweilen Perlmutterglanz. Farblos, meist aber weiß, blaulich, graulich, röthlich. Strich: graulichweiß.

B. d. L. rasch erhitzt zerknisternd; in starker Hitze zu weißem Email; mit Borax zu klarem Glase schmelzend. In Säuren nicht auflöslich. Chemische Zusammensetzung

nach L. Gmelin: nach Bauquelin:

Kalk	41,2	40
Schwefelsäure	58,8	60
	<hr/> 100,0	<hr/> 100

Arten:

1. Anhydritspath.

Syn. Cube-Spar.

Krystalle, ein- oder zu mehreren durcheinander gewachsen, drusig gruppiert; krystallinische Massen mit blätteriger Textur. Doppelte Strahlenbrechung. Farblos, blaulichgrau, smalte- oder violettblau, fleischroth.

Findet sich im Steinsalz- und älteren Gypsgebirge, namentlich im Salzthone mit eingesprengtem Steinsalz. Hall in Tyrol; Salzberg; Berchtesgaden; Lüneburg; Ber im Kanton Waadt; Savoyen. Selten auf Erzgängen. Kapnik in Ungarn; Riehelsdorf in Hessen, Lauterberg am Harz.

Der Anhydritspath von Pesey (Ch. sulfatée épigène) erleidet eigenthümliche Aenderungen, indem er Wasser aufnimmt, verliert er Durchsichtigkeit, Glanz und an Härte, er wird zu Gyps.

2) Strahliger Anhydrit.

Syn. Strahl-Anhydrit; radiated anhydrous Gypsum.

Derbe Massen mit strahliger Textur. Perlmutterglanz, zuweilen nur schimmernd. Weiß ins Graue, smalteblau, röthlich.

Im Steinsalz-Gebirge: Sulz am Neckar; Osterode am Harz, Ilde bei Braunschweig.

3) Körniger Anhydrit.

Syn. Ch. anh. sulf. sublamellaire; granular anhydrous Gypsum.

Derbe Massen mit fleinschuppiger und körniger Textur. Weiß ins Graue, Blaue, Rothe, selten grünlich.

Sulz am Neckar; Ber; Hallein; Eisleben; Bochnia, Wieliczka; Riehelsdorf u. s. w.

Der Vulpinit (Ch. anhydro-sulfatée quarzifère) von Vulpino unfern Bergamo, ist ein körniger Anhydrit, der mehr oder weniger Quarz beigemengt enthält.

4. Dichter Anhydrit.

Syn. Compact anhydrous Gypsum.

Derbe Massen, dicht; zuweilen in darmförmig-gewundenen Lagen von gefrösartigem Aussehen. (Gefrösstein); Bruch un-

eben ins Splitterige; an den Kanten durchscheinend. Grau, graulichschwarz, bräunlich, röthlich.

Bildet ganze Lagen im Salzthon des Steinsalz-Gebirges: Hallein, Salzburg, Hall, Ber, Bochnia, Wieliczka (hier der Gekröstein) u. s. w.

Der Anhydrit, besonders der blaue, wird, da er eine schöne Politur annimmt, zu Verzierungen in der Baukunst verwendet; jedoch darf man ihn der Einwirkung der Luft nicht zu sehr aussetzen, indem er leicht oberflächlich verwittert.

29. Wasserhaltiger schwefelsaurer Kalk.


Syn. Gyps. Prismatoidisches Gypshaloid. Chaux sulfatee. Gypsum.

Kernform: schiefe rektanguläre Säule. $P||M=113^{\circ}6'$ und $66^{\circ}54'$. Unter den vielen Gestalten, welche vorkommen, sind vorzüglich folgende zu bemerken: 1) entseitete z. Verschw. von M und entnebenrandet zur Schärfung über P., Fig. 50.; 2) beßgleichen und entspißet zur Schärfung über dem scharfen Rand; 3) zweifach entseitete zum Verschw. von M, entnebenrandet zur Schärfung über P und entschärfandete, Fig. 51.; 4) Zwillinge der Form No. 1. Fig 52. u. s. w.

Fig. 50.

Fig. 51.

Fig. 52.



Krystalle, krystallinische Massen mit blätteriger, faseriger, schuppiger und körniger Textur; auch dicht und erdig. Oberfläche gestreift, uneben oder glatt.

Spaltbar parallel den Kernflächen, vollkommen mit P. Bruch: flachmuschelrig, selten wahrzunehmen. Härte = 2. Milde, in dünnen Blättchen biegsam. Spec. Gew. = 2,26 — 2,4. Durchsichtig bis durchscheinend. Glas- bis Perlmutterglanz. Farblos, weiß, grau, gelb, braun, roth.

Im Kolben gibt er Wasser. B. d. F. trübe und weiß werdend, unter Knistern sich blätternd und zu einem weißen Email fließend. Mit Flußspath leicht zu einer klaren Perle schmel-

zend, die beim Abkühlen emailweiß wird; mit Borax unter Brausen zu einem klaren Glase, das später gelb wird. In 460 Theilen Wasser auflöslich. Chemische Zusams. nach Bucholz:

Kalk.....	33
Schwefelsäure	46
Wasser.....	21
	<hr/>
	100

Arten:

1. Gypsspath.

Syn. Blätteriger Gyps. Marien- oder Frauenglas. Fraueneis. Ch. s. cristallisée ou laminaire. Sélénite; sparry Gypsum.

Krystalle, oft sehr verlängert, zuweilen mit converen Flächen oder zugerundeten Ecken und Kanten, einzeln oder in freien Krystall-Gruppen eingewachsen in Thon oder dichten Gyps; ferner auf- und durcheinander gewachsen und mannigfach gruppirt; krystallinische Massen mit blätteriger Textur, zuweilen auseinander laufend strahlig (Strahlgyps, Gypserosen); angeblich kommen auch stalaktitische Bildungen zu Villarubia de Ocaña in Spanien vor. Doppelte Strahlenbrechung; zuweilen irisirend. Wasserhell, graulich-, gelblich-, röthlichweiß; asch- und rauchgrau, gaulichschwarz; fleisch-, blut- und ziegelroth; wachsgelb, geblich-braun, selten grün oder blau.

Findet sich am häufigsten in den Gyps- und Steinsalzformationen verschiedener Perioden. Ber im Kanton Waadt; Hertin in Baden; Nordhausen; Osterode; Liebe bei Braunschweig; Riehelsdorf in Hessen; Girgenti in Sicilien; Montmartre bei Paris, St. Jago de Compostella in Spanien; Orford, Newhaven, Suffer in England; am Irtsich in Sibirien u. s. w. — Ferner kommt er in der Braunkohlen-Formation des Siebengebirges vor; auf Klüften im Porphyr an verschiedenen Orten im Erzgebirge; in Drusenräumen von Basalt zu Hofgeismar in Hessen; auf Erz-Gängen zu Wolfach, Leogang, Kapnik, Chumnitz; als sekundäres Erzeugniß in alten Grubengebäuden: Rammelsberg am Harz, Freiberg; in Sinkwerken: Hallein; Hall in Tyrol u. s. w. In den Ebenen längs der Meeresküste von Granada als Sand.

2) Faseriger Gyps.

Syn. Faser-Gyps. Federweiß. Ch. s. fibreuse; fibrous Gypsum.

Derbe Massen mit faseriger Textur. Perlmutterglanz. Weiß, fleischroth, röthlichweiß, grau, selten gelblich.

In den verschiedenen Gypsformationen, besonders in der des Muschelkalks, auch in den bunten Mergeln des Keupers in Lagen oder Trümmern vorkommend. Hasmersheim in Baden; Heilbronn; Jena, Wernigerode, Haubern bei Frankenberg in Hessen; Tyrol, Salzburg u. s. w.

3) Schaumgyps.

Syn. Ch. s. niviforme.

Schuppige, locker verbundene Theile. Perlmutterglanz. Schnee- und gelblich-weiß.

Im Gypse des Jechsteins: tiefer Graben am Schellenberge bei Steyerthal am Harz; im Süßwasser-Gyps des Montmartre bei Paris.

4) Körniger Gyps.

Syn. Alabaster zum Theil. Gypse saccharoïde; granular Gypsum.

Derbe Massen mit grob- und feinkörniger Textur. Weiß ins Rothe, Gelbe und Graue, ziegelroth; zuweilen gefleckt oder gestreift.

Als eigenthümliche Felsart aller Perioden. In Glimmerschiefer eingelagert und Glimmer eingemengt enthaltend, im Canaria-Thale; Harz; Thüringen; Württemberg; Baden; Gegend von Paris u. s. w.

5) Dichter Gyps.

Syn. Alabaster zum Theil. Gypsstein. Ch. s. compacte; compact Gypsum.

Dichte Massen. Bruch: splitterig. Durchscheinend. Schnee-, graulich-, blaulichweiß, röthlich-grau, fleischroth; schwärzlichgrau.

Vorkommend wie die vorhergehende Art. Schwarz und Faltenstein in Tyrol; Riechelsdorf; Ilmenau; Frankenberg in Hessen; Osterode; Beyerode im Schmalkaldischen u. s. w.

6) Erdiger Gyps.

Syn. Gypserde, Mehlgyps. Ch. s. terreuse, farinaceous Gypsum.

Staubartige, lose oder wenig zusammenverbundene Theile. Schwach schimmernd. Weiß ins Gelbe und Graue.

In Höhlungen der Gypsgebirge vorkommend: Lauenstein in Hannover; Johannesberg bei Nordhausen; Saalfeld; Jena; Wimmelberg; Paris u. s. w.

Manche Gypsarten entwickeln beim Schlagen oder Reiben einen unangenehmen Geruch. Hierher der Stinkgyps, Gyps-Leberstein.

Man wendet den Gyps, gemahlen, roh oder gebrannt, zur Verbesserung des Bodens an; besonders auf Wiesen und bei Futterkräutern leistet er gute Dienste. Das Mahlen geschieht in eigenen Mühlen; das Brennen in Oefen, wie beim Kalk, oder in Meilern. Der gebrannte Gyps (Spar Kalk) wird zu Stuckatur-Arbeiten, womit Decken und Wände von Zimmern geschmückt werden, gebraucht; ferner zum Gießen der Fußböden (Strich) in Zimmern; als Gypsmörtel zum Mauern an Stellen, die der Einwirkung von Wasser nicht ausgesetzt sind; zur Fertigung von Gyps-Abgüssen, von Statuen, Basen, Modellen für Bildhauer-Arbeiten u. s. w., wozu besonders Gypspath verarbeitet wird; zur Bereitung des Gypsmarmors, womit Wände, Säulen und dergleichen überzogen werden, die dann geschliffen und polirt dem Marmor gleichen; als Zusatz beim Reaumur'schen Porzellan, zur Glasur und zum Glase; als Grundmassen der Pastellfarben. Der reine feinkörnige und dichte Gyps wird unter dem Namen Alabaster zu architektonischen Zwecken benutzt; man verarbeitet ihn ferner zu Statuen, Dosen, Basen, Tischplatten, Uhrgehäusen u. s. w. Der Fasergyps wird hie und da als Streusand benutzt, der Gypspath als Polirmittel zum Putzen des Silbers, so wie der Edelsteine und Perlen.

30. Brongniartin.

Syn. Glauberit, prismatisches Brithynsalz. Glaubérite.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M||M=83^{\circ} 20'$ und $96^{\circ} 40'$. $P||M=104^{\circ} 15'$ und $75^{\circ} 45'$. Oefters vorkom-

mende Gestalten sind: 1) entstumpfrandet; 2) dergleichen zum Verschwinden der M-Flächen.

Kristalle, einzeln und gruppirt, krystallinische Massen. Textur: blätterig. Oberfläche uneben oder gestreift,

Vollkommen spaltbar parallel den P-Flächen, nur unvollkommen nach den Seitenflächen. Bruch: muschelig bis uneben, Härte = 2,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,73 — 2,8. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz, zuweilen fettartig. Farblos, grau, röthlich, gelblichweiß, weingelb, meist unrein. Strich; weiß. Geschmack schwach salzig.

B. d. L. zerknisternd, dann zu einem klaren Glase schmelzend. In Wasser zum Theil auflöslich. Chem. Zusamm. nach Brongniart:

Schwefelsaurer Kalk... 49

Schwefelsaures Natron 51

100

Findet sich in Steinsalz und Salzthon eingewachsen? Villaruba bei Ocaña in Spanien, Aussee in Oesterreich.

31. Phosphorsaure Kalk.

Syn. Apatit. Rhomboedrisches Flußhaloid. Chaux phosphatée. Phosphate of Lime.

Kernform: regelmäßige sechsseitige Säule (Fig. 18. pg. 23). Außer dieser kommen noch häufig folgende Combinationen vor: 1) entseitigt, Fig. 53.; 2) entrandet, Fig. 54.; 3) dergleichen zur Spitzung über P; 4) entrandet zur Spitzung über P und entseitigt; 5) entrandet und enteckt, Fig. 55.; 6) dergleichen und entseitigt; 7) zweifach entrandet, enteckt und entseitigt; 8) dreifach enteckt, dreifach entrandet und entseitigt u. s. w.^{b)}

Fig. 53.




Fig. 54.





Fig. 55.



^{b)} No. 1, 2, 5 und 6 besonders häufig im Erzgebirge, 7 und 8 am Gotthard.

Blum, Dreytognose.

Krystalle, meist kurz und tafelartig, verb, erdig. Textur: blätterig und faserig. Die Oberfläche rauh oder uneben. Die M-Flächen zuweilen gestreift.

Unvollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: muschelig. Härte = 5. Spröbde. Spec. Gew. = 3,17 — 3,25. Durchsichtig bis durchscheinend. Glas bis Fettglanz. Farblos, meist aber weiß, grau, blau, grün, gelb oder braun in lichten Nuancen. Strich: weiß. Das Pulver durch Erwärmen, der Phosphorit durch Reiben phosphoreszirend.

B. d. L. schwierig und nur an dünnen Kanten zu einem farblosen oder weißen Glase fließend, mit Borax zu einem klaren Glase. In Salz- und Salpetersäure ist das Pulver leicht und vollkommen auflöslich. Chem. Zusammensetzung nach G. Rose: Apatit von Snarum, von Capo de Gata, von Faldigol in Tyrol.

Kalk	55,17	55,73	55,86
Phosphorsäure	41,48	41,09	42,01
Salzsäure	2,10	0,43	0,05
Flußsäure	1,25	1,93	2,08
	<u>100,00</u>		<u>99,18</u>		<u>100,00</u>

Arten:

1. Apatitspath.

Syn. Spargelstein. Moroxit. Apatite.

Krystalle, zuweilen mit zugerundeten Kanten und Ecken, einzeln ein- oder aufgewachsen, auch zu Drusen und Gruppen verbunden; krystallinische Massen, rundliche Körner, deren Aeußeres oft wie geflossen erscheint, verb, eingesprengt. Textur: blätterig. Wasserhell, graulichweiß ins Perlgraue, viol-, indig-, himmel- und smalteblau, berg-, seladon- und pistaziengrün, weingelb, braun. Bei den weißen Varietäten zuweilen bläulicher Lichtschein senkrecht auf die Hauptaxe gesehen.

Findet sich eingewachsen, meist in abnormen Gebirgs-Gesteinen: in Gneiß am Roskopf in der Gegend von Freiburg; in Granit zu Greifenstein in Sachsen, Four au Diable und Hux-Moreau unfern Nantes, Iglofsöit in Grönland, Baltimore in Maryland; in Lalk am Greiner im Zillerthal; in Hornblendegestein zu Faldigol in Tyrol; in körnigem Kalk zu Ershy u. a.

D. in Finland; in Glimmerschiefer zu Snarum in Norwegen; in Dolerit am Kaiserstuhl in Breisgau u. s. w.; auf Gängen und Drusenräumen: Ehrenfriedersdorf in Sachsen, Zinnwald, Schlaggenwalde in Böhmen; St. Gotthard, Cornwall u. a. D.; auf Lagern von Magneteisen: Arendal, Grengesberg, Raringbrika und Gellivara in Schweden; in vulkanischen Gesteinen: Laacher-See, Caprera bei Radiz, Albano bei Rom, Vesuv.

2. Faseriger Apatit.

Syn. Phosphorit.

Traubige, nierenförmige, stalaktitische Massen mit strahlig-faseriger Textur. Bruch: uneben ins feinsplitterige. Fettglanz, auch nur schimmernd, Gelblich oder graulichweiß, ockergelb, gelblichbraun, roth gefleckt.

Findet sich auf Zinnerzgängen zu Schlaggenwalde; im Zarsalk des Erzbergs bei Amberg; als Felsmasse zu Logrosan in Estremadura.

3. Erdiger Apatit.

Syn. Erdiger Phosphorit. Ch. ph. pulvérolente.

Feinerdige lose Theile. Graulichweiß, grünlichgrau.

Eine Kluft im Quarze füllend bei Szigeth in Ungarn.

32. Arseniksaurer Kalk.

Syn. Pharmakolith. Hemiprismatisches Gypsöhaloid. Chaux arseniatée. Pharmacolite.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M||M=117^{\circ} 24'$ und $62^{\circ} 36''$. $P||M=95^{\circ} 46' 40''$ und $84^{\circ} 13' 20''$

Haidinger beobachtete folgende Gestalten: 1) entnebenseitet, entseitenect und entspiect zum Verschwinden von P; 2) dergleichen zweifach entmittelseitet und entstumpftrandet. Die Krystalle meist sehr verlängert in der Richtung der kleinen Diagonale.

Krystalle selten frei und deutlich erkennbar, meist haar- und nadelförmig, büschel-, stern- und kugelförmig gruppirt; krystallinische Massen, traubig, stalaktitisch, rindenartiger Ueberzug, mehrliger Beschlag oder als Anflug. Textur: strahlig. Oberfläche: gestreift.

Vollkommen spaltbar in der Richtung der kleinen Diagonale der P-Fläche. Bruch: uneben. Härte = 2 — 2,5. Milde, in dünnen Blättchen biegsam. Spec. Gew. = 2,64 — 2,73. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz, Spaltungsflächen zeigen Perlmutterglanz und die Zusammenhängungen haarförmiger Krystalle Seidenglanz. Wasserhell. Schnee-, graulich-, gelblich- und röthlich-weiß; rosenroth durch arseniksaures Kobalt, grünlich-weiß durch Nickeloryd gefärbt.

B. d. L., unter Entwicklung arsenikalischen Geruchs, zu weißem Email schmelzend. Im Kolben viel Wasser gebend. Lösbar in Salpetersäure. Chem. Zusamm. nach Klaproth.

Kalk, 25,00

Arseniksäure .. 50,54

Wasser 24,46

100,00

Das hemiprismatische Gypshaloid besteht nach Turner aus Arseniksaurem Kalk 79,01

Wasser 20,99

100,00

Findet sich als secundäres Erzeugniß in den Klüften und Höhlungen von Gängen, begleitet von Kobalt- und Arsenkieserzen, und in alten Grubengebäuden; Wittichen in Baden; Markirchen im Elsaß; Richelsdorf und Bieher in Hessen; Andreasberg am Harz; Joachimsthal in Böhmen.

Der *Pikropharmakolith*, welcher trauben- und nierenförmig in den Kobaltgruben zu Richelsdorf vorkommt, ist ein kalkhaltiger arseniksaurer Kalk. Der *Roselit* von Schneeberg in Sachsen scheint ebenfalls ein arseniksaurer Kalk zu seyn, dem aber Kalk und arseniksaures Kobaltoryd beigemengt sind, von welchem letzterem seine rothe Farbe herrühren mag.

Ferner gehört noch eine andere Species von arseniksaurem Kalk, das *diatome Gypshaloid* von Haidinger, hierher. Die Krystalle lassen sich auf eine gerade rhombische Säule zurückführen. In seinen übrigen Eigenschaften kommt es im Allgemeinen mit dem arseniksauren Kalk überein. Chem. Zusamm. nach Turner:

Arseniksaurer Kalk 83,34

Wasser 16,66

100,00

Der Fundort dieser Species, so wie jener der deutlich krystallischen von Haidinger beschriebenen Varietät des arseniksauren Kalkes, ist nicht bekannt.

33. Kohlensäurer Kalk.

Syn. Rhomboedrisches Kalkhaloid. Chaux carbonatée. Carbonate of Lime.

Kernform: Rhomboeder, $P||P=105^{\circ} 5'$, über den Scheitelfanten; $=74^{\circ} 55'$ über den Rand.

Es gibt keine Mineral-Gattung, bei welcher die Anzahl der vorkommenden verschiedenen Formen so groß wäre, als gerade beim Kalkspath; Hany hat 155 Varietäten in seinem Werke beschrieben; Graf Bournon führt deren nahe an 700 an. Wir müssen uns hier darauf beschränken einige der wichtigsten und am häufigsten vorkommenden Gestalten anzuführen. 1) Kernform (Fig. 20. pg. 22.); sie erscheint im Ganzen selten; 2) entscheidet zum Verschwinden der Kernflächen (stumpfes Rhomboeder) Fig. 56.; 3) durch verschiedene Entrandung zum Verschwinden der Kernflächen erhält man mehrere spitze Rhomboeder, wie unter anderen Fig. 57. durch einreihige, Fig. 58. durch dreireihige Entrandung; 4) entscheidet; 5) zweifach zweireihig entrandet; 6) desgleichen zum Verschwinden der Kernflächen, Fig. 59.; 7) entrandet zur Säule (ähnlich Fig. 60., statt der Flächen g sind die Flächen des primitiven Rhomboeders P vorhanden); 8) desgleichen und entscheidet zum Verschwinden der Kernflächen (sechseckige Säule Fig. 22. pg. 23); 9) entrandet zur





Säule und entscheltelkantet zum Verschwinden der Kernflächen, Fig. 60.; 10) entrandet zur Säule und entscheltelkantet zum Verschwinden der Kernfl., Fig. 61.; 11) entrandet zuweilen zur Säule und zweifach zweireihig entrandet zum Verschwinden der Kernflächen, Fig. 62.; 12) verschiedene Arten von Zwillingen, wie z. B. von No. 6. Fig. 63. u. n. v. a. F.

Fig. 60.

Fig. 61.

Fig. 62. Fig. 63.



Krystalle, meist säulenförmig; krystallinische Massen mit blätteriger, stänglicher, faseriger, körniger und schaliger Textur; auch verb und erdig. Die Oberfläche der Krystalle eben, zuweilen auch gekrümmt, gewisse secundäre Flächen zeigen sich brüsig, rauh oder gestreift.

Sehr vollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig, splitterig, eben. Härte = 3. Spröde. Spec. Gew. = 2,64 — 2,75. Durchsichtig bis durchscheinend. Ausgezeichnete doppelte Strahlenbrechung. Glas-, Perlmutter- oder Fettglanz. Wasserhell, weiß, grau, gelb, blau, grün, roth, braun und schwarz, in verschiedenen, meist lichten Abänderungen. Strich: weiß. Durch Reiben electrisch werdend.

B. d. L. bei einem gewissen Hitzeegrad blendend weiß leuchtend, aber nicht schmelzend; brennt sich laustisch, erhitzt sich dann mit Wasser übergossen, und reagirt alkalisch. Mit Borax zu einem klaren Glase schmelzend. In Salpetersäure unter Brausen auflöslich. Chem. Zusamf.

nach Gmelin: Analyse des Doppelspathes von Island von Bucholz:

Kalk.....	56,43	56,5
Kohlensäure..	43,57	43,0
Wasser.....			0,5
	<hr/> 100,00		<hr/> 100,0

Arten:

1. Kalkspath.

Syn. Doppelspath. Ch. carb. cristallisée. Calcareous Spar.

Krystalle, zuweilen mit zugerundeten Ecken und Kanten, vollkommen ausgebildet, einzeln aufgewachsen, häufiger aber zu Gruppen oder Drusen verbunden; spießig, nabelförmig; krystallinische Massen, oft mit ausgezeichnet stänglicher Absonderung (stänglicher Kalkspath). Als Versteinerungs-Mittel. Textur: blätterig. Bruch: muschelig, selten wahrzunehmen. Wasserhell, weiß, grau, asch- und rauchgrau, gräulichschwarz, grünlich, stroh-, wachs- oder weingelb, röthlich, braun. Dünne Spaltungsstücke, besonders des isländischen Kalkspaths, werden schon durch den bloßen Druck zwischen den Fingern stark elektrisch. Zuweilen von bituminösen Substanzen durchdrungen, und dann beim Schlagen oder Reiben einen heftigen unangenehmen Geruch entwickelnd (stinkender Kalkspath, blätteriger oder späthiger Stinkstein, auch stänglich abgesondert, stänglicher Lufulan).

Der Kalkspath findet sich in allen Formationen unter den verschiedensten Verhältnissen und allgemein verbreitet. Als Fundorte ausgezeichnete Krystall-Varietäten sind bekannt: Andreasberg, Clausthal, Osterode und Iberg am Harz; Freiberg, Gersdorf, Bräunsdorf und Tharand in Sachsen; Joachimsthal und Przibram in Böhmen; Wiesloch und Donaueschingen in Baden; Siegen; Haring und Ringenwechsel in Tyrol. Schemnitz; Hüttenberg in Kärnthen; Derbyshire; Alston-moor in Cumberland; Chalanches, Poitiers, Oisans in Frankreich u. s. w.

Man verwendet den Kalkspath zur Beschickung der Erze; zu chemischen und pharmazeutischen Präparaten; gebrannt und gepulvert zum Reinigen der Edelsteine.

Der quarzige Kalkspath (krystallisirter Sandstein von Fontainebleau. Ch. carb. quarzifère) ist ein mit Quarzsand übermengter, und in der Varietät Fig. 57. krystallisirter Kalkspath, der in dem Sandsteinbruche la Rocher-Germain bei Fontainebleau unfern Paris vorkommt. — Eine ähnliche Erscheinung findet man zwischen den Lagen des oberen quarzigen Keuper-Sandsteins der Gegend von Stuttgart.

Plumbo-Calcit wurde neuerdings von Johnston ein

kohlen-saurer Kalk genannt, der 7,8 p. c. kohlen-saures Blei beigemengt enthält.

2. Faseriger Kalk.

Syn. Faserkalk. Eisenblüthe und faseriger Kalksinter zum Theil. Ch. carb. fibreuse. Satin-Spar.

Stalaktitisch, kugelig, nieren-, stauben- oder plattenförmig. Verb. Textur: theils gleich-, theils auseinanderlaufend faserig. Durchscheinend an den Kanten. Perlmutter- oder Seidenglanz. Schnee- oder röthlichweiß; manchmal roth, blau oder grün in verschiedenen Nuancen gefärbt.

Auf Andern und schmalen Gängen, dann in Höhlen, hier namentlich der faserige Kalksinter, und alten Gruben. Derbyshire, Northumberland, Alston-moor in Cumberland; Andrarum, Schemniz; Ringenwechsel und Sterzing in Tyrol; Richelsdorf; Schneeberg, Pottschappel u. s. w.

Da manche Faserkalke eine gute Politur annehmen, und sich besonders durch ihren schönen Seidenglanz auszeichnen, so werden sie, namentlich in England, zu verschiedenen Gegenständen des Luxus: zu Ohrgehängen, Perlen, Tabatieren u. s. w. verarbeitet.

3. Körniger Kalk.

Syn. Marmor. Ch. carb. lamellaire ou saccharoide; granular Limestone.

Derbe Massen mit körnig-blättriger bis höchst feinkörniger Textur. Durchscheinend, oft nur an den Kanten. Weiß ins Graue, Röthliche und Grünliche; zuweilen rosenroth, blaß himmel- oder indigblau. Beim Reiben manchmal einen Geruch nach Hydrothionsäure (besonders der von Paros) entwickelnd.

Bildet lagerähnliche Massen zwischen Gneiß, Glimmerschiefer, Thonschiefer etc. Auerbach in der Bergstraße; Wunsiedel im Fichtelgebirge; Baveno, Carrara u. a. D. in Italien; Werslar (hier der rothgefärbte), Eröby in Finland; Paros in Griechenland u. s. w.

Der körnige Kalk wird auf mannigfache Weise angewendet; der weiße einfarbige Statuen-Marmor dient für Bildhauer-Arbeiten, der farbige, gefleckte oder geaderte, Architektur-

Marmor, für architektonische Arbeiten, Säulen &c. Auch verarbeitet man Vasen, Leuchter, Stockknöpfe &c. aus ihm. Ferner wird er als Baustein gebraucht u. s. w.

4. Schieferspath.

Syn. Ch. carb. nacréé. Schiefer-Spar.

Krystallinische Massen mit schallig-blättriger Textur. Perlmutterglanz. Weiß ins Gelbe, Graue, Rothe und Grüne.

Auf Lagern und Gängen im älteren Gebirge. Schwarzenberg. Scheibenberg. Kongsberg. Cornwall, Island, Sibirien &c.

Die Argentine von Southampton und Williamsburgh in Massachusetts ist ein mit Kiesel gemengter Schieferspath.

5. Kalkstein.

Syn. Dichter Kalkstein. Ch. carb. compacte; common Limestone.

Derbe Massen; häufig dickschiefertig (Kalkschiefer), fest, stänglich oder kegelförmig-schallig abgesondert (Magerkalk, Luttenmergel); als Versteinerungsmittel. Bruch: splitterig ins Flachmuschlige. Durchscheinend an den Kanten. Grau ins Gelbe, Braune, Rothe und Schwarze, mannigfach gezeichnet, geädert, geflammt, gefleckt; baum- und ruinenförmig (Florentiner- oder Ruinen-Marmor) &c.

Einen großen Theil der geschichteten Gebirgs-Massen aller Formationen ausmachend und allgemein verbreitet.

Wird als Marmor zu Säulen, Vasen, Tischplatten u. s. w. verarbeitet. Er dient ferner als Bau- und Pflasterstein, zum Belegen der Chaussees; als Zuschlag bei Eisenschmelzen; gepulvert als Verbesserungsmittel des Bodens; gebrannt zur Bereitung des Mörtels, zum Tünchen, zum Düngen der Felder u. s. w.

Der opalisirende Muschelmarmor ist ein Kalk, der fossilen Muscheln einschließt, welche in bunten Farben spielen. Er wird in Kärnten und Tyrol gefunden.

Man unterscheidet noch folgende Abänderung des Kalksteins:

a) Stinkstein (Stinkkalk. Ch. carb. fétide; Stinkstone).

Ein bitumenhaltiger Kalkstein, der, beim Schlagen oder Reiben einen eigenthümlichen Geruch entwickelt. Matt. Meist braun

oder grau. — Fast jeden Kalkformationen sind Lagen dieses Gesteins eigen.

b) Anthrakonit (Madreporit). Kalk durch Kohle gefärbt. Meist stänglich abgesondert, zuweilen mit krummblättriger Textur. Derb. Schwacher Glanz. Graulichschwarz, schwarz.

Andreasberg am Harz; Abtenau in Salzburg; Eger, Christiania in Norwegen, Andrarum in Schonen u. s. w.

c) Mergel (Marno. Marl.). Ein Kalk mit Thon übermengt, theils fest (verhärteter Mergel), theils erdig (Mergelerde), häufig dickschieferig (Mergelschiefer), weiß, grau, gelb, roth, braun in verschiedenen Nuancen.

Bildet Lagen in geschichteten Gebirgsmassen verschiedenen Alters, besonders aber in der Keuper- und Zechstein-Formation.

Der bituminöse Mergelschiefer (Schiste marno-bitumineux, bituminous Marl-slate), ist ein bitumenhaltiger schieferiger Mergel, der, wenn er einen bedeutenden Kupfererz-Gehalt besitzt, Kupferschiefer (Schiste cuivreux) genannt wird. Letzterer der Zechstein-Formation eigen.

d) Kogenstein (Dolith, Ch. carb. compacte globuliforme. Oolite). Ein Gemenge aus feinkugelligen Kalktheilen durch Kalk- oder Mergel-Zäment gebunden. Findet sich besonders in der Juraz, bunten Sandstein- und Zechstein-Formation verbreitet.

e) Kalktuff (Tuffstein. Duffstein. Ch. carb. incrustante ou concrétionnée; tufaceous Limestone). Derbe Massen, porös, durchlöchert, tropfsteinartig, röhrenförmig, zellig (besonders der Travertino), dicht. Als Kalkinations-Mittel vegetabilischer und animalischer Substanzen. Ein Gebilde neuerer Zeit, das sein Entstehen Niederschlägen kalkhaltiger Wasser zu danken hat und häufig vorkommt, unter andern zu Rannstadt, Urach u. v. a. O. in Württemberg; Binau in Baden; Richelsdorf in Hessen, Böhmen, Ungarn, Tyrol u. s. w.

Sprudelstein wird der Kalk-Absatz der heißen Quellen von Wiesbaden, Karlsbad u. s. w. genannt.

Unter Erbsenstein (Pisolith. Pea-stone) versteht man die derben Massen, die aus größeren oder kleineren runden Körnern (häufig von der Größe einer Erbse), welche fein-concentrisch-schalig zusammengesetzt sind, bestehen. Der Mittelpunkt der

einzelnen Körner ist gewöhnlich ein Quarzbrüchen, um welches sich die Kalkrinde angelegt hat. Karlsbad in Böhmen; Gell-
Felső in Ungarn.

6. Kalkerde.

a) Kreide (Ch. carb. crayeuse. Craie. Chalk). Derb; als Ueberzug, Bruch: feinerdig. Undurchsichtig. Matt. Schnee-, gelblich und röthlichweiß. Sehr weich. Abfärbend und schreibend. Rau anzufühlen.

Ein Glied des jüngeren Fldzgebirges; sehr verbreitet in Frankreich, Dänemark, England u. s. w.

Die Kreide wird vorzüglich zum Schreiben auf Holz, Schiefer u. angewandt; zur Tünche oder zum Weißen der Zimmer; zum Grund für hölzerne Verzierungen, Rahmen u. s. w., die vergolbet oder versilbert werden sollen. Zum Putzen von Metallen; zu Pastell- und Mahlerfarben; zu Bausteinen; zur Verbesserung von thonigem und nassem Boden; zu verschiedenen chemischen und pharmazeutischen Zwecken; gebrannt zum Mörtel u. s. w.

b) Bergmilch (Montmilch. Ch. carb. pulvérulente. Rock-Milk). Derbe, poröse, schwammförmige Massen, zusammengesetzt aus locker verbundenen staubartigen Theilen; als Ueberzug oder Anflug. Matt. Undurchsichtig. Graulich-, röthlich- oder gelblichweiß.

Ein jugendliches Gebilde, das aus Zersetzung von Kalkspath oder durch Niederschlag kalkhaltiger Wasser entstanden ist und sich besonders in Höhlen und Klüften von Kalksteinen findet. Urach in Württemberg, Streibberg im Baireuthischen; Tiefenkasten bei Chur und andern Orten in der Schweiz; Böhmen; Tyrol; Steyermark; Piemont; Schottland u. a. D. m.

34. Gaylussit.

Syn. Natro-Calcit. Gay-Lussacite.

Kernform: schiefe rhombische Säule $M \parallel M = 111^{\circ} 10'$ und $68^{\circ} 50'$. $P \parallel M = 96^{\circ} 30'$ und $83^{\circ} 30'$. Vorkommende Formen: 1) entspißet, entseitenet, entschärfraudet; 2)

entseitenect zur Spitzung über P und zur Schärfung über den Nebenseiten (rhombisches Ditetraeder); 3) entschärfandect, entseitenect zur Schärfung über P, entspizect und entmittelseitet.

Krystalle, selten vollständig ausgebildet, einzeln ein- oder durcheinandergewachsen, Oberfläche meist mehr oder minder stark gestreift, auch rauh und uneben.

Spaltbar parallel den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig ins Uebene. Härte = 2,5. Sehr spröde. Spec. Gew. = 1,92, — 1,95. Durchsichtig bis durchscheinend. Starke doppelte Strahlenbrechung. Glasglanz; außen häufig matt. Wasserhell, gelblichweiß oder graulich. Strich: graulichweiß.

B. d. L. heftig verknistern, zu einer trüben Perle schmelzend, die alkalisch reagirt und schmeckt. In Wasser nur wenig, in Salpetersäure aber mit lebhaftem Aufbrausen lösbar. Chem. Zusamm. nach Bunsingault:

Kalk..... 17,70

Natron..... 20,44

Kohlensäure.. 28,66

Wasser..... 32,20

Thon..... 1,00

100,00

Findet sich bei dem indischen Dorfe Lagunella unfern der Stadt Merida in Amerika in einzelnen Krystallen in einem Thon, welcher ein Lager von kohlensaurem Natron bedeckt. Sangershausen in Sachsen.

35. Baryto-Calcit.

Syn. Barocalcit.

Kernform; schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 95^{\circ} 15'$ und $84^{\circ} 45'$. $P \parallel M = 110^{\circ} 59' 12''$ und $69^{\circ} 0' 48''$. Vorkommende Formen: 1) entseitenect und entnebenseitig; 2) entseitenect zur Schärfung über P und entnebenseitig; 3) entspizect, entseitenect und zweifach entnebenseitig.

Krystalle einzeln ein- oder zu Drusen aufgewachsen, krystallinische Massen. Textur: blätterig. Oberfläche glatt, häufig auch auf den Seitenflächen gestreift, oder mit einer Barytspath-Rinde überzogen.

Vollkommen spaltbar parallel den Entseitenectungs- und Entspizectungs-Flächen. Bruch: uneben. Härte = 4. Spröde. Spec.

Gew. = 3,66. Durchsichtig, bis durchscheinend. Glasglanz. Weiß ins Grauliche, Gelbliche und Grünliche. Strich: weiß.

B. d. L. anfangs weiß und trübe werdend, dann sich mit einem grünlichen Glas überziehend (v. Kobell); färbt die Flamme gelblichgrün. Brennt sich alkalisch. Mit Borax leicht unter starkem Brausen zu einem Glas, das nach dem Abkühlen hyazinth-roth wird. In verdünnter Salzsäure leicht löslich unter Gasentwicklung. Die Krystalle verwittern leicht an der Luft. Chem. Zusamm. nach Children:

Kohlensaurer Kalk.. 33,6

Kohlensaurer Baryt. 65,9

99,5

Auf Gängen mit Barytspath zu Alston-moor in Cumberland.

36. Arragon.

Syn. Prismatisches Kalkhaloid. Arragonite.



Kernform: rektanguläres Ditetraeder. (Fig. 13. pg. 20). $M||M=116^{\circ} 16' 24''$ und $63^{\circ} 43' 36''$. $P||P=108^{\circ} 27' 2''$. Kupffer. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entquerscheitelt, Fig. 64.; 3) beßgleichen und zweifach entseitenectt; 4) entquerscheitelt, zweifach entseitenectt und Entnebenkantet, Fig. 65.; 5) dreifach entquerscheitelt und entnebenkantet, Fig. 66., oft sehr spießig; 6) verschiedene Arten von Zwillingen und Gruppirungen, so daß häufig Gestalten, sechsseitigen Säulen ähnlich wie Fig. 67, entstehen u. s. w.

Fig. 64.

Fig. 65.

Fig. 66.

Fig. 67.



Krystalle, meist in der Richtung der Seiten sehr in die Länge gezogen, theils säulenförmig, theils pyramidal; krystallinische Massen mit stänglicher, strahliger und faseriger Textur. Oberfläche glatt, rau oder gestreift, auch zerfressen.

Spaltbar. parallel den Kernflächen, sehr deutlich in der Richtung der Entquerscheitelung. Bruch: unvollkommen muschelia.

Spalte = 3,5 — 4. Spedde. Spec. Gew. = 2,92 — 3,0. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Wasserhell, gelblich, graulich, grünlich, röthlich. Strich: graulichweiß. Gepulvert auf glühendem Eisenblech phosphoreszirend.

N. d. L. wird er weiß, ist unschmelzbar und zerfällt zu einem weißen, groben Pulver; reagirt alkalisch. In Salzsäure unter starkem Brausen auflöslich. Chem. Zusamm. kohlensaurer Kalk mit 1 — 4 p. Et. kohlensaurem Strontian.

Arten:

1. Arragonit.

Syn. Arragonspath.

Krystalle, zuweilen spießig oder nadelförmig, einzeln einzeln oder aufgewachsen, häufiger drusig verbunden und mannigfach gruppirt; krystallinische Massen mit stängelicher Zusammensetzung (stängeliger Arragon). Textur: undeutlich blätterig. Farblos, gelblich, graulich, röthlich, grünlichweiß, grau, weingelb, grün, violettblau; zuweilen mehrere Farben an einem Individuum.

Auf Gängen und Lagern im älteren Gebirge; Joachimsthal in Böhmen; Leogang in Salzburg; Schwarz u. a. D. in Tyrol. Schemnitz in Ungarn; Banlochhead in Schottland; Kertschinsk in Sibirien u. In Thon und Gyps eingewachsen (und hier zwar besonders die Gruppirungen zu sechsseitigen Säulen): Molina in Arragonien; Mingranilla in Balenzia; Dar in Frankreich. — In Serpentin: Montrosa in Piemont. — Auf Braun-Eisenstein-Lagern: Saalfeld und Ramsdorf in Thüringen; Reisenbach und Annaberg in Sachsen; Alston-moor in Cumberland; Harz, Steyermark. Lagen- und trümmerweise in Basalten und basaltischen Gesteinen: Kaiserstuhl in Breisgau; Rüdersberg im Siebengebirge; Elitzow, Walsch und Edlitz in Böhmen; Fassathal; Auvergne, Schottland; Garder u. s. w. In Laven: des Vesuv, Aetna u. s. w.

2. Strahliger Arragon.

Syn. Arragonite fibreux radié.

Derbe, unförmliche Massen. Textur: strahlig ins Feinstängel-

liche. Zwischen Glas- und Festglanz. Weiß ins Gelbe, weingelb.

Kommt unter ähnlichen Verhältnissen, wie die vorige Art vor, ausgezeichnet aber am Kaiserstuhl im Breisgau, Tschopau, Jungferenberg im Siebengebirge, Gergovia in Auvergne, Alston-moor in Cumberland u. a. a. Orten.

3. Faseriger Arragon.

/ Syn. Faser-Arragon. Eisenblüthe und faseriger Kalksinter zum Theil. Arragonite coralloide et fibreux conjointe.

Korallen- und staudenförmige, zackige, plattenförmige Massen. Textur theils gerade-, theils auseinanderlaufend faserig. Perlmutterglanz. Schnee- und rüthlichweiß; grün, blau oder roth, durch Metallsorbye, gefärbt.

Vorkommen ähnlich dem des Arragonits; besonders aber auf Eisenerz-Lagerplätzen: Eisenerz in Steyermark, Hüttenberg in Kärnthen, Beiler in Ungarn, Taroko in Siebenbürgen, Alston-moor in Cumberland, Reuhof in Böhmen.

II. O r d n u n g.

Metalle der Erden.

Es gibt acht einfache Stoffe, welche hierher gehören; doch kommt keiner derselben rein in der Natur vor, sondern sie bilden theils mit nichtmetallischen, theils mit Alkalimetallen oder unter sich verbunden die verschiedensten Mineralien. Die Härte derselben ist sehr verschieden und liegt zwischen 1 und 9. Das specifische Gewicht übersteigt nicht 4,5. Glasglanz, so wie weiße Farbe vorherrschend.

XII. Gruppe. Magnium.

Erscheint nicht rein in der Natur, meist mit verschiedenen Säuren oder mit Kalkerde zu Mineralien verbunden. Härte derselben zwischen 1,5 und 5. Spec. Gew. 1,7 — 3,1. In verd. Säuren oder als Pulver in Säuren löslich.

37. Talk-Hydrat.

Syn. Bittererde, oder Magnesia-Hydrat. Brucit zum Theil. Magnésie hydratée. Hydrate of Magnesia.

Kernform: sechsseitige Säule.

Krystalle sehr selten, krystallinische und derbe Massen mit blätteriger und strahliger Textur; zuweilen auch faserig (hierher Nutt als Nematit).

Vollkommen spaltbar parallel den Endflächen. Bruch: uneben ins Splitterige, selten wahrnehmbar. Härte = 1,5 — 2. Milde, in dünnen Blättchen etwas elastisch biegsam. Spec. Gew. = 2,35 — 2,44. Halbdurchsichtig, bis an den Ranten durchscheinend; durch Einwirkung der Luft undurchsichtig werdend. Schwarzer Perlmutter-, auch Seidenglanz. Weiß, graulich, blaulich, grünlich, röthlich. Strich: weiß. Schwach an der Lippe hängend. Fett anzufühlen.

B. d. L. undurchsichtig; weiß werdend, unschmelzbar. Reagirt alkalisch. Im Kolben Wasser gebend. Mit Borax zu klarem Glas schmelzend. In Salz- und Salpetersäure ist das Pulver leicht und ohne Brausen auflöslich. Chem. Zusamm.

nach L. Gmelin: Analyse von Fyffe.

Talk....	69	69,75
Wasser..	31	30,25
	<u>100</u>	<u>100,00</u>

Findet sich auf schmalen Gängen oder Adern im Serpentin zu Hoboken in New-Jersey, zu Ewinaness auf der Shetland-Insel Unst, zu Portsoy in Schottland. Kraubat in Steyermark.

38. Bittersalz.

Syn. Prismatisches Bittersalz. Magnésie sulfatée. Sulphate of Magnesia.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M = 90^\circ 38'$ und $89^\circ 22'$. Ausgebildete Krystalle bis jetzt nur durch chemische Kunst erzeugt.

Haarförmige Krystalle zu Büscheln oder Flocken verbunden, wollig, krystallinische Massen mit stänglicher, körniger oder faseriger Textur, traubig, nierenförmig, stalaktitisch, krustenartig, als mehliges Beschlag.

Spaltbar parallel den Kernflächen, am deutlichsten in der Richtung der kleinen Diagonale der Endflächen. Bruch: muschlig. Härte = 2 — 2,5. Wenig spröde. Spec. Gew. = 1,75. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Farblos, weiß, graulichweiß, grau ins Grüne, Gelbe, Rothe. Geschmack salzig bitter.

B. d. L. zu einer weißen Masse schmelzend, die wasserfrei und bei einem gewissen Hitze-grad unschmelzbar wird, mit weißem Scheine leuchtet und schwach alkalisch reagirt. An der Luft verwitternd. In Wasser leicht auflöslich. Chem. Zusams. nach Gay-Lussac:

Talk 16,04

Schwefelsäure. 32,53

Wasser 51,42

100,00

Als Ausblühungen des Bodens, zuweilen in so unglaublicher Menge, besonders nach starken Regengüssen, daß er grau davon gefärbt erscheint, wie in den Steppen Sibiriens, in Andalusien, Catalonien, in der Gegend von Calatayud in Arragonien, auf dem Silande Milo; in geringerer Menge auf Gebirgs-steinen in alten Bergwerken, Steinbrüchen, Höhlen u. s. w. auswitternd, Clausthal und Goslar auf schiefrigem Gestein; Montmartre, Jena und Madrid auf Gyps; Idria auf Alaunschiefer; Freiberg auf Gneiß; Berchtesgaden, Herrngrund bei Neusohl in Ungarn u. s. w. Außerdem aufgelöst in vielen Mineralwassern (Bitterwasser) wie zu Seidlich, Eger, Seidschütz zc.

Das Bittersalz wird in der Heilkunde als abführendes Mittel gebraucht.

40. Phosphorsaurer Talk.

Syn. Wagnerit.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M||M=95^{\circ} 25'$ und $84^{\circ} 34'$. $P||M=109^{\circ} 20'$ und $70^{\circ} 40'$ (Levy).

Kry-
stalle mit starker vertikaler Streifung auf den Seitenflächen, die anderen Flächen glatt.

Spaltbar nach den Seitenflächen. Bruch: muschel-
ig und Unebene. Härte = 5 — 5,5. Spec. Gew. = 3,13. Halbdurchsichtig. Glasglanz. Weingelb, zuweilen ins Drangengelbe, auch graulich. Strich: weiß.

B. d. L. schmilzt er für sich sehr schwer, unter Entwicklung einiger Luftbläschen, zu einem dunkelgrünlich-grauen Glase; mit

Borax und Phosphorsalz leicht und vollkommen zu einer klaren Kugel. Von Salpeter- und Schwefelsäure wird das Pulver, unter Mitwirkung der Wärme, aufgelöst und entwickelt dabei flussaures Gas. Chem. Zusamsf.

nach L. Gmelin: Analyse von Fuchs:

Talk.....	49,2	46,66
Phosphorsäure	44,2	41,73
Flusssäure	6,6	6,50
Eisenoxyd		5,00
Manganoxyd.		0,50
	<hr/> 100,0	<hr/> 100,39

Findet sich in den Klüften eines sehr mürben, thonschieferartigen Gesteins im Höllengraben bei Werfen in Salzburg. Angeblich auch in Nord-Amerika.

41. Magnesit.

Syn. Kohlen saure Talkerde. Magnésie carbonatée. Carbonate of Magnesia. Fig. 68.



Kernform: Rhomboeder $P||P=107^{\circ} 25'$ über den Scheitellanten; $=72^{\circ} 35'$ über den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseittelantet, Fig. 68.

Krystalle, derbe Massen. Textur blätterig und körnig. Dicht.

Vollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: flachmuschelig. Härte $=4-4,5$. Spröde. Spec. Gew. $=2,9-3,1$. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz. Weiß, gelb, grau, braun. Strich: weiß.

B. d. L. für sich unschmelzbar, mit Borax zu einem klaren Glase. Das Pulver in Salz- und Schwefelsäure auflöslich. Chem. Zusamsf. nach L. Gmelin (a), Analyse des dichten Magnesits aus Mähren von Lampadius (b) und des Magnesitspathes vom St. Gotthard von Stromeyer (c).

	a	b	c
Talk.....	47,6	47,0	42,40
Kohlen säure. .	52,4	51,0	49,67
		Wasser 1,6	Eisenoxydul 6,47
			Manganoxyd 0,62
	<hr/> 100,0	<hr/> 99,6	<hr/> 99,16

Arten:

1. Magnesitspath.

Syn. Brachytupes Talkhaloid. Breunerit.

Krystalle, mit theils glatter, theils rauher Oberfläche; krystallinische Massen mit blätteriger und körniger Textur. Verb. Glasglanz, auf den Spaltungsflächen zuweilen Perlmutterglanz. Durchsichtig bis durchscheinend. Weiß, grau, weingelb, gelblich-braun, schwarz, (durch beigemengte Kohle, Anthrako-Magnesitspath).

Findet sich in Chlorit eingewachsen am rothen Kopf im Salzburgerischen Zillerthale und im Fassathal, in Talk am St. Gotthard. — Hall in Tyrol. Insel Unst.

2. Dichter Magnesit.

Syn. Giobertit.

Derbe kugelige, nierenförmige, traubige und knollige Massen. Dicht. Rauh, zerfressen oder rissig. An den Kanten durchscheinend. Matt. Weiß ins Röthliche und Grünliche, Graue und Gelbe. Hängt der feuchten Lippe an.

In großen Massen im Serpentin; Güssen in Steyermark; Eyben- schitz und Hrubschitz in Mähren; Baumgarten in Schlesien. Indien.

Auf Gängen in einem talkartigen Gestein kommt zu Bau- dissaro und Castellamonte in Piemont ein kohlen-saurer Talk vor, der 12 — 13 p. c. Kiesel enthält und quarziger Magnesit genannt wird. Spec. Gew. = 2,78. Undurchsichtig. Schneeweiß ins Gelbe. Lösbar in Schwefelsäure mit Hinterlassung eines Kiesel-Rückstandes.

42. Borazit.

Syn. Oktaedrischer Borazit. Magnésie boratée. Borate of Magnesia.

Kernform: Tetraeder. Vorkommende Gestalten: 1) dreifach enteckt in der Richtung der Flächen und entkantet (Fig. 70. ohne die Fläche c). Je nachdem nun die secundären Flächen, die zu dem Würfel (f) oder zu dem Rautendodekaeder (o) führen, in verschiedenem Verhältniß vorschreiten, entstehen Formen wie Fig. 69. (Würfel entkantet und polarisch enteckt) und Fig. 70.

Fig. 69.





Fig. 70.



(Kantendobelaeder entstaetoberseitelt und polarisch entrhomboederseitelt); 2) entantet und vierfach entect, drei Enteckungsflächen in der Richtung der Flächen, Fig. 71. Dehnt sich die Fläche o besonders weit aus, so entlicet ein regelmässiges Ostaedet, das entect und entantet ist, Fig. 72.

Fig. 71.





Fig. 72.



Krystalle, theils glatt, theils rauh, auch porös oder mit zerfressener Oberfläche; einzeln eingewachsen oder zu mehreren verbunden; kleine plattrunde Massen aus seidenglänzenden Fasern bestehend.

Sehr unvollkommen spaltbar nach den Kernflächen und der Entseitelungsfläche c. Bruch: muschelighis uneben. Härte = 7. Spröbde. Spec. Gew. = 2,9 — 3. Durchsichtig bis durchscheinend. Starker Glasglanz. Zuweilen durch äußere Einwirkung matt. Farblos, weiß, graulich-, grünlich-, auch röthlichweiß, bräunlich. Strich: weiß. Durch Erwärmen polarisch-elektrisch werdend.

B. b. L. unter Aufschäumen zu einer Perle schmelzbar, deren Oberfläche beim Abfühlen mit nadel förmigen Krystallen anschießt. Mit Borax leicht zu einem klaren Glase. Färbt die Flamme schön grün. Das Pulver ist in Salz- und Salpetersäure ziemlich leicht und vollkommen löslich (v. Kobell). Chem. Zusamm. nach Stromeyer's Analyse.

Kalk..... 33

Boraxsäure.. 67

100

Findet sich eingewachsen in körnigem Gyps: Kalkberg und Schildstein bei Lüneburg; Segeberg in Holstein; der nicht krystallisirte Borazit kommt im Gypse der Keuper-Formation, zwischen den Gesteinlagen oder auch in kleinen Höhlungen der Felsart, in der Gegend von Lüneville vor.

43. Polyhalit.

Syn. Polyhalite.

Kernform: gerade rhombische Säule, $M||M = 115^\circ$ und 65° (Haidinger).

Kristalle selten und meist unvollständig ausgebildet. Dürbe Massen mit blätteriger, stänglicher, strahliger oder faseriger Textur.

Spaltbar nach den Seitenflächen. Bruch: splitterig ins Unebene. Härte = 2,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,73—3,78. Durchscheinend. Wachs-, auch Perlmutterglanz. Siegel- oder fleischroth, rauch- oder aschgrau. Strich: röthlichweiß. Geschmack schwach salzig bitter.

Schmilzt schon in der Flamme des Kerzenlichts zu einer bräunlich-rothen Perle; mit Borax unter starkem Brausen zu einem klaren Glase, das beim Abkühlen klar und dunkelroth wird. Im Kolben Wasser gebend. Das Pulver in Wasser ziemlich leicht auflöslich, mit Hinterlassung eines Rückstandes von schwefelsaurem Kalk. Gehalt nach Stromeyers Analyse des Polyhalits von Ischel.

Schwefelsaurer Kalk 20,0347

Schwefelsaurer Kalk 44,7429

Schwefelsaures Kali 27,6347

Wasser 5,9335

98,3458

Findet sich im Steinsalz-Gebirge: Ischel in Oestreich; Berchtesgaden in Baiern; Aussee in Steyermark; Bie in Lothringen.

44. Bitterkalk.

Syn. Matrotypos Kalkhaloid. Chaux carbonatée magnésifère.

Kernform: Rhomboeder, $P||P = 106^\circ$ Fig. 73.

15' über den Scheitellanten; $= 73^\circ 45'$ über den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform (ähnlich Fig. 22. pg. 22.); 2) durch verschiedene Entdeckungen in der Richtung der Scheitellanten 3. Verschw. der Kernfläche, die spitzeren Rhomboeder Fig. 57. und 58; 3) entschleift und entrandet 3. Verschw. der Randlanten, Fig. 73.; 4) beßgleichen 3. Verschw. der Kernflächen (Fig. 73. ohne P).



Kristalle, krystallinische Massen mit blätteriger und körniger Textur. Oberfläche meist glatt, zuweilen rauh oder gestreift.

Vollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig. Härte = 3,5 — 4. Spröde. Spec. Gew. = 2,8 — 3. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glas- bis Perlmutterglanz. Farblos, weiß, roth, gelb, grün in verschiedenen Nuancen. Durch Erwärmen, Reiben oder Schlagen phosphoreszierend.

B. b. L. unschmelzbar, mit Borax zu einem klaren oder grünlich gefärbten Glase. Das Pulver wird von Salzsäure mit Beihülfe von Wärme unter Brausen aufgelöst. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin: Analyse von Klaproth.

Kohlensaurer Kalk 45,7 45

Kohlensaurer Kalk 54,3 52

Eisen- und Manganorydul 3

100,0

100

Manche Bitterkalle enthalten zuweilen bis 14 p. c. kohlensaures Eisenorydul und bis 6 kohlensaures Manganorydul.

Arten:

1. Bitterspath.

Syn. Rautenspath. Braunkalk. Braunspath. Ankerit. Matrotypes Kalkhaloid. Chaux carbonatée magnésifère et ferro-manganesifère. Bitterspar. Brown-Spar.

Krystalle, oft mit konkaven oder konvexen Flächen oder zugrundeten Ranten, einzeln eingewachsen, zu Drusen verbunden, kugelig zusammengelagert; krystallinische Massen, zuweilen mit stänglicher, auch ins Faserige übergehender Zusammensetzung (stänglicher Bitterspath, Niemit, Faseriger Brauns'path), tropfsteinartig, kugelig, nierenförmig, staudenförmig, zellig. Austerkrystalle nach Kalkspath-Formen; diese häufig hohl. Farblos; weiß; röthlich-, gelblich, grünlichweiß; rosenroth bis fleisch- und braunroth; weingelb, ockergelb, gelblichbraun; olivengrün, schwärzlichgrün, schwarz.

Auf Gängen in Felsarten verschiedener Zeit; eingewachsen in Chlorit- oder Talkschiefer. Wolfach in Baden; Andreasberg am Harz; Bilin und Joachimsthal in Böhmen; Goldenstein in Mähren; Schemnitz und Kapnik in Ungarn; Freiberg, Bräunsdorf, Gersdorf, Schneeberg u. a. D. in Sachsen; Riechelsdorf in Hessen; Cumberland; Derbyshire; Pfiffisch und Grainer in Tyrol;

Billerthal; Gastein in Salzburg; Eisenerz, Raibing u. a. D. in Steyermark; Riemo in Toskana; Beresowsk in Sibirien, Norwegen, Schottland, Finland u. s. w. Eingewachsen in Gyps bei Hall in Tyrol. In Höhlungen von Dolerit-Mandelstein zu Sasbach im Breisgau.

2. Dolomit.

Syn. Ch. carb. magnésifère granulaire. Dolomie.

Derbe Massen mit grob- bis höchst feinkörniger Textur; zuweilen auch dicht. Perlmutterglänzend bis schimmernd. Schnee-, gelblich-, graulichweiß, asch-, rauch-, gelblichgrau, gelblichbraun, graulichschwarz. Häufig porös, die Höhlungen mit kleinen Biterspath-Rhomboedern ausgekleidet.

Findet sich auf lagerartigen Räumen im Glimmerschiefer: Campolongo am St. Gotthard; im Wallis in Kärnthen, Ungarn; New-York u. s. w. Ferner kommen fast in allen Kalk-Formationen, vom Uebergangskalk bis zur Kreide, Dolomite vor; im Uebergangskalk-Gebirge zu Gerolstein in der Eifel, Gegend von Sießen; im Bergkalk: Bristol in England, Bensberg unfern Eöln; im Zechstein: Kahl im Speßart, Rückingen unfern Hanau, Mansfeld und Eisleben in Thüringen, im Muschelkalk: Fassathal in Tyrol, Ubstatt in Baden; im Jurakalk: Sternenbergr u. a. D. in Württemberg (hier oft so lose verbunden, daß ein Dolomit-Sand daraus entsteht), Bleiberg in Kärnthen, Dalmatien u. s. w. Am Monte Somma, und als Auswürfling des Vesuv.

Der weiße und feste Dolomit wird, wie der weiße Marmor, zu Bildhauer-Arbeiten verwendet; die andern Arten dienen zu Bau- und Chauffee-Steinen, und zum Theil auch zur Bereitung von Mörtel, der vorzüglich gut bei Bauten unter Wasser zu gebrauchen seyn soll.

Anhang:

a) Gurhofian.

Derb, dicht, zuweilen zellig und rissig. Bruch: flachmuschel. Durchscheinend, an den Kanten matt. Schnee-, gelblich- oder grünlichweiß. Braust etwas mit Salzsäure. Chemischer Bestand nach Klaproth's Analyse:

Kohlensaurer Kalk 29,5

Kohlensaurer Kalk 70,5

100,0

Kommt auf Gängen im Serpentin in der Gegend von Gurhof in Oestreich vor.

b) Konit.

Tropfsteinartig, als Ueberzug, verb, dicht. Bruch: uneben ins Splitterige. Undurchsichtig; matt. Gelblich-, grünlich- und aschgrau; röthlichweiß. Chemischer Bestand nach Johns Analyse:

Kohlensaurer Kalk..	67,5
Kohlensaurer Kalk..	28,0
Kohlensaures Eisen.	3,5
	<hr/> 99,0

Auf Gängen zu Freiberg. Als Geschiebe am östlichen Abhang des Meißners in Hessen; in Kollstücken auf Island.

Beryllium kommt nicht rein und nur in geringer Menge in der Natur vor, und zwar in Verbindung mit Thon- und Kieselerde.

XIII. Gruppe. Yttrium.

Findet sich selten und nur in Verbindung mit Phosphorsäure und verschiedenen Metalloxyden.

45. Phosphorsaure Yttererde.

Syn. Phosphate of Yttria.

Kernform: gerade quadratische Säule. Bis jetzt wurde nur die Entrundung zur Spizung über P beobachtet.

Krystalle, krystallinische und verbe Massen, blätterig.

Spaltbar parallel den M-Flächen. Bruch: uneben ins Splitterige. Härte = 5. Spec. Gew. = 4,55. Durchscheinend. Fettglanz, zuweilen matt. Gelblichbraun. Strich, lichtebraun.

B. d. L. unschmelzbar; mit Borax langsam zu einem farblosen Glase; mit Soda unter Brausen zu einer hellgrauen unschmelzbaren Schlacke. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusams. nach der Analyse von Berzelius:

Yttererde.....	62,58
Phosphorsäure mit etwas Flußsäure	33,49
Basisch phosphorsaures Eisenoxyd ..	3,93
	<hr/> 100,00

Zu Granit zu Finesnäs in Norwegen und zu Guterby in Schweden.

XIV. Gruppe. Aluminium.

Kommt nicht rein, aber in Verbindung mit Sauerstoff als Alaunerde, Thonerde, in großer Menge vor, jedoch meist wieder mit andern Stoffen, am häufigsten mit Kiesel-erde zc. verbunden.

Die Mineralien dieser Gruppe zeigen sich sehr verschieden hinsichtlich der Härte, diese variiert zwischen 9, und 1,6. Spec. Gew. = 1,6 — 4,1. Glasglanz. Farbe meist weiß.

46. Korund.

Syn. Rhomboedrischer Korund. Corindon, Corundum.

Kernform: Rhomboeder. $P||P=86^{\circ}6'$ über den Scheitellanten; $=93^{\circ}54'$ über den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseittelt, oft z. Versch. der Scheitellanten Fig. 74.; 3) entrandet zur sechsseitigen Säule und entseittelt, (Fig. 76. ohne die Flächen r); 4) beßgl. z. Versch. der Kernflächen (sechsseitige Säule); 5) zweifach entrandet in der Richtung der Flächen z. Versch. der Kernflächen (Bipyramidal-Dodekaeder); 6) beßgleichen und entseittelt, Fig. 75.; 7) zweifach entrandet, entrandet zur Säule und entseittelt, Fig. 76. u. f. w.

Fig. 74.




Fig. 75.





Fig. 76.



Krystalle, manchmal mit gewölbten Flächen, krystallinische Massen mit körniger Textur. Dicht. Oberfläche rauh oder gestreift.

Spaltbar parallel den Flächen der Kernform und oft sehr deutlich in der Richtung der Entseittelungsfläche o. Bruch: muschel-ig ins Unebene. Härte = 9. Spröbde. Spec. Gew. = 3,9 — 4,0

Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz. Blau, roth, gelb, grau und braun. Strich: weiß.

B. d. L. für sich unveränderlich; mit Borax schwierig, aber vollkommen zu klarem Glase auflöslich. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusamm. nach v. Kobell:

Aluminium 53,3

Sauerstoff. 46,7

100,0

Gewöhnlich mit etwas Kiesel-erde und Eisenoryd verunreinigt.
Arten:

1. Saphir.

Syn. Rubin. Salamstein. Corindon hyalin. Tébésie. Sapphire; perfect Corundum.

Krystalle lose, oft zugerundet, Geschiebe, Körner. Starker Glasglanz. Durchsichtig mit doppelter Strahlenbrechung. Manche Abänderungen zeigen, besonders wenn sie senkrecht gegen die Hauptaxe und convex geschliffen sind, einen sechsstrahligen weißen Lichtschein (Sternsaphyr, Astérie). Wasserhell; Berlinerblau, auch indig-, lasur-, smalte-, lavendel- und violblau, grau; karmin-, purpur-, karmoisin-, rosen- und fleischroth; röthlichweiß, gelblichweiß bis weingelb; grünlichblau; gelblichgrün; grün. Die Farben meist rein, selten ein und derselbe Krystall an verschiedenen Stellen verschieden gefärbt.

Wird im aufgeschwemmten Lande, im Sande der Flüsse gefunden auf Ceylon, in Siam, China, Hohenstein in Sachsen, Meronitz in Böhmen, le Puy in Frankreich u.; eingewachsen in Basalt: Jungfernberg bei Cassel am Rhein, Quegstein im Siebengebirge; in verflacktem Basalt: Erpailly bei le Puy, Niedermendig unfern des Raacher-Sees.

Seiner Härte, der schönen Farben und des lebhaften Glanzes wegen, ist der Saphir ein sehr beliebter Edelstein, der in der Bijouterie besonders zu Nadel- und Ringsteinen und andern Gegenständen des Luxus verwendet wird. Der Verschiedenheit der Farbe nach erhält er im Handel verschiedene Benennungen: Rubine werden die rothen, Sapphire die blauen, orientalische Topase die gelben, orientalische Amethyste die violblauen Abänderungen genannt u. Schlechte Stücke und

Abgang beim Schleifen gebraucht man zum Schleifen minder harter Steine. In neuerer Zeit hat man den lichtblauen Saphir mit großem Erfolg zu Linsen für Mikroskope benutzt; auch zum Drahtziehen wird der Saphir neuerdings mit Vortheil angewendet.

2. Korund.

Syn. Diamantspath. Corindon harmophane; common Corundum.

Krystalle, rauh, mit fremdartiger Rinde überzogen, matt, einzeln eingewachsen; zuweilen Geschiebe. Durchscheinend bis an den Ranten durchscheinend. Schwacher Glasglanz, in Fettglanz übergehend. Grünlich- und perlgrau; seladon- und berggrün; viol-, smalte- und berlinerblau; ziegel-, fleisch- und karmoisinroth, kastanien- und röthlich-braun. Die Farben meist trübe und unrein.

Eingewachsen in Granit, Glimmerschiefer, Dolomit u.: Mozzo in Piemont; China; Ostindien; Baltimore; Chamouni-Thal in Savoyen, Campolongo; Schweden; hoher Ilmeen unfern Miasf in Rußland.

Die Korunde, welche schöne und reine Farben besitzen, werden zu Schmucksteinen verarbeitet. Die unreinen verwendet man gepulvert zum Schleifen und Poliren anderer harten Edelsteine.

3. Smirgel.

Syn. Corindon granulaire. Emeril. Emery.

Derbe Massen mit körniger Textur, auch dicht, eingewachsen oder eingesprengt. Durchscheinend an den Ranten. Wenig- und fettglänzend, oft nur schimmernd. Blaulichgrau, unrein smalteblau.

Auf einem Talklager im Glimmerschiefer am Ochsenkopf bei Schwarzenberg in Sachsen. — Razos, Smirna, Spanien, England u. s. w.

Der Smirgel wird gepulvert und in Wasser oder Del geschlemmt, und dann zum Schleifen oder Poliren vieler Edelsteine, so wie von Glas und Metallen verwendet; auch zum Zersägen weicherer Steinarten gebraucht man ihn.

47. Diaspor.

Syn. Thonerde-Hydrat. Eisenschüssiger Kyanit. Antophyllit z. Th. Alumine hydratée.

Kernform: rhombische Säule $M||M=130^\circ$ und 50° ungefähr; erhalten durch Spaltung.

Krystallinische Massen mit strahlig-blättriger Textur; häufig mit einer feinen Rinde von Eisenorydhydrat überzogen.

Spaltbar parallel den Flächen der Kernform, deutlicher in der Richtung der Diagonalen der P-Fläche. Bruch: uneben ins Splitterige. Härte = 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,43. Durchscheinend. Glasglanz, auch Fettglanz. In dünnen Blättchen weiß; auch gelblichweiß, gelblichbraun. Angehaucht gibt er einen starken Thongeruch.

B. d. L. auf Kohle unschmelzbar; im Kolben mit großer Hestigkeit decrepitirend und in kleine glänzend-weiße Schuppen zerfallend. Gibt viel Wasser. Mit Borax werden die Schuppen zu einem klaren farblosen Glase aufgelöst. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusams. nach Heß:

Thonerde 85,44

Wasser.. 14,56

100,00

Das Eisenoryd, welches Chibren und Bauquelin bei ihren Analysen erhielten, ist, wie Berzelius zeigte, dem Minerale mechanisch beigemengt, indem dasselbe durch Salzsäure ausgezogen werden kann, ohne daß jenes eine andere Veränderung als daß es weiß wird, zu erkennen gäbe.

Findet sich mit Glimmer in der Gegend von Gornoschit im Gouvernement Perm am Ural.

48. Gibbsite.

Stalaktitische, röhrenförmige Massen mit auseinander laufend faseriger Textur.

Härte = 3,5. Spec. Gew. = 2,4. Schwach durchscheinend. Schimmernd oder wenig glänzend. Weiß, graulich- oder grünlichweiß.

B. d. L. für sich unschmelzbar, aber weiß werdend; mit Ko-

baltauflösung ein schönes Blau gebend. In Borax ohne Rückstand auflöslich. Gibt im Kolben Wasser. Chem. Gehalt nach Torre's Zerlegung:

Thonerde 64,8

Wasser . 4,37

99,5

Findet sich zu Richmond in Massachusetts in einer verlassenen Braun-Eisenstein-Grube.

49. Fluellit.

Kernform: rhombisches Oktaeder. $P||P=109^\circ$ über den stumpfen Scheitellanten; $=85^\circ$ über den scharfen Scheitellanten; $=144^\circ$ über den Randlanten.

Ist bis jetzt nur krySTALLISIRT und zwar in entschiedensten Oktaedern gefunden worden. Durchsichtig; weiß.

Besteht nach Wollaston aus Thon und Flußsäure, in unbekanntem Verhältniß.

Kommt mit Wadellit in Kornwall vor.

50. Kryolith.

Syn. Prismatisches Kryonhaloid. Alumine fluatée alkaline. Cryolite.

Kernform: gerade rektanguläre Säule; durch Spaltung erhalten.

KrySTALLINISCHE Massen mit blätteriger Textur.

Spaltbar parallel den Seiten der Kernform, am deutlichsten mit P. Bruch: uneben oder unvollkommen muschelig. Härte = 2,5 — 3. Spröde. Spec. Gew. = 2,9 — 3,0. Durchscheinend. Glasglanz. Perlmutterglanz auf der vollkommeneren Spaltungsfläche. Farblos; schnee-, graulich- und gelblichweiß, braunlich, gelblich, röthlich. Strich: weiß.

Schon in der Flamme des Kerzenlichts schmelzbar; v. d. L. zur wasserhellen Perle, die beim Abkühlen unklar wird. In der Glasröhre geschmolzen Reaktion auf Flußsäure gebend. Das Pulver entwickelt mit concentrirter Schwefelsäure übergossen, bei Zusatz von etwas Wasser, flüßsaure Dämpfe. Chem. Zusamf. nach der Analyse von Berzelius:

Thon..... 24,40

Flußsäure.. 31,35

Natron.... 44,25

100,00

Auf Lagern im Gneiß mit Bleiglanz, Quarz, Eisen- und Kupferkies zu Ivikaet in West-Grönland.

51. Aluminst.

Syn. Reine Thonerde. Wehsterit. Alumine hydratée.

Bis jetzt noch nicht krystallisirt gefunden, sondern in höchst feinen krystallinischen oder erdigen Theilen, die zu nierenförmigen, knolligen Stücken verbunden sind; verb. als Ueberzug.

Bruch: feinerdig. Weich und zerreiblich. Spec. Gew. = 1,66 — 1,7. Undurchsichtig. Matt. Schneeweiß ins Gelblich- und Graulichweiße. Strich: weiß. Wenig abfärbend und schwach an der feuchten Lippe hängend.

B. d. L. etwas einschrumpfend aber unschmelzbar. Im Kolben viel Wasser gebend, und dann, bei anfangender Glühung, schwefelige Säure. Leicht und ohne Brausen in Salzsäure lösbar. Chem. Zusamm.

nach L. Gmelin: Analyse von Stromeyer:

Thon..... 29,6 29,868

Schwefelsäure 23,3 23,370

Wasser 47,1 46,762

100,0 100,000

Findet sich im Letten: Garten des Pädagogiums zu Halle; mit Gyps im Mergel: Morl bei Halle; in Klüften der Kreide: Newhaven in England. Eprenay in Frankreich.

52. Alaunstein.

Syn. Alunit. Alaunspath; rhomboedrisches Alaunhaloid. Alumine sous-sulfatée alkaline; rhomboidal. Alumstone.

Kernform: Rhomboeder $P||P=87^{\circ} 8'$ über den Scheitelfanten; $=92^{\circ} 52'$ über den Randfanten. Außer der Kernform kommen noch Entschittelungen vor, Gestalten ähnlich Fig. 74. pg. 137.

Krystalle, meist klein, häufig mit convergen Flächen, zu Gruppen und Drüsen verbunden, krystallinische Massen mit blätteriger, körniger oder stänglicher Textur, auch dicht und erdig. Oberfläche glatt oder gestreift; oft mit Eisenoxydhydrat überzogen.

Spaltbar parallel den Flächen der Kernform, deutlicher in der Richtung der Entschätelungsfläche. Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 5. Spröde. Spec. Gew. = 2,6 — 2,73. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glas-, auch Perlmutterglanz. Wasserhell, weiß ins Gelbliche, Grünliche und Röthliche; braun. Strich: weiß.

B. d. L. unschmelzbar; mit Borax unter Brausen zu klarem wasserhellem Glase. Das Pulver wird von Schwefelsäure größtentheils aufgelöst. Nach dem Glühen auch durch Salzsäure löslich. Chem. Zusams.

Analysen von

nach L. Gmelin: Collet-Descotils und Cordier:

Thon	42,2	40,0	39,654
Schwefelsäure ..	33,1	36,6	35,495
Kali	9,9	13,8	10,021
Wasser	14,8	10,6	14,830
	100,0	100,0	100,000

Findet sich auf Gängen und Drüsenräumen im Alaunfels und Trachyt: Tolfa bei Civita-Vecchia im Kirchenstaate; Puy de Sancy an der Quelle des Dor in Auvergne; auf den Inseln Milo und Argentiera.

Der römische Alaun wird aus ihm bereitet.

53. Alaun.

Syn. Oktaedrisches Alaunfz. Alumine sulfatée alcaline; Alun. Sulphate of Alumina. Alum.

Kernform: nageknäbiges Oktaeder.

Krystalle der Kernform vollkommen ausgebildet, glatt oder uneben; haarförmig, krystallinische Massen stänglich oder von faseriger Textur; stalaktitisch, als erdiger Beschlag.

Unvollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig. Härte = 2 — 2,5. Wenig spröde. Spec. Gew. = 1,7

Blum, Oryktognosie.

—1,8. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Farblos, weiß, zuweilen ins Graue oder Gelbe. Süßlich-herber Geschmack.

B. d. L. schmilzt er Anfangs und schwillt zu einer weißen Masse an, die nicht weiter schmelzbar ist (v. Kobell). Im Kolben schmilzt er, bläht sich auf und gibt Wasser. Leicht auflöslich in Wasser. Die Chemie unterscheidet zwei Arten, je nachdem das Alkali entweder Kali oder Ammoniak ist. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

1. Kalialaun.

Thonerde....	10,8
Kali.....	10,1
Schwefelsäure	33,7
Wasser.....	45,4
	<hr/> 100,0

2. Ammonialaun.

Thonerde....	11,5
Ammoniak...	3,8
Schwefelsäure	36,0
Wasser.....	48,7
	<hr/> 100,0

Mit Aetzalkali zusammengerieben oder mit Kalilauge übergossen entwickelt der Ammonialaun Ammoniak.

Als Ausblühung auf Thon-, Alaun- und Kohlenschiefer: Reichenbach in Sachsen; Andrarum, Christiania; Pottschappel bei Dresden; Schweiz; England u. s. w.; in der Nähe entzündeter Steinkohlenlager: Duttweiler; Lassalle in Frankreich; in der Umgegend mancher Feuerberge in Klüften und Spalten von Lavas: Montenovvo, Grotta de Alume und Solfatara unfern Neapel; Vesuv; Vulkano, Stromboli, Sicilien.

Der natürliche Alaun wird, wo er in größerer Menge vorkommt, wie der künstliche, der meist aus Alaunstein, Alaunschiefer u. gewonnen wird, verwendet, und zwar besonders in der Heilkunde, bei der Papierfabrikation, beim Weißgerben, Schußfarben u. s. w.

Das Federsalz und die Bergbutter scheinen Gemenge von Alaun mit Eisenvitriol zu seyn.

5A. Wavellit.

Syn. Devonit, Eastonit. Alumine hydro-phosphate. Subphosphate of Alumina.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M = 122^{\circ} 15'$, nach Gemff $= 126^{\circ} 25'$. Es werden Entstumpfungen zur Schärfung oben u. und etwige andere Gestalten, als vorkommend angeführt.

Krystalle, meist sehr klein und undeutlich, nadel- auch haarförmig, zu Büscheln und Nieren gruppiert, kugelig, traubig, statolithisch mit schmalstrahliger und faseriger Textur.

Spaltbar parallel den Seiten- und der Entstumpfungsflächen. Härte $= 3,5 - 4$. Spröde. Spec. Gew. $= 2,2 - 2,4$. Durchsichtig bis durchscheinend. Glas- bis Perlmutterglanz. Farblos. Grünlichweiß, graulich, blaulich, braunlich. Die Farben manchmal in Streifen wechselnd. Strich: weiß.

B. d. L. unerschmelzbar, schmilzt etwas auf und wird weiß. Gibt im kochenden Wasser und Flußsäure. Das Pulver wird von Salz- und Salpetersäure vollkommen aufgelöst. Chem. Bestand nach den Analysen von

Wenzelius und Fuchs.

Thonerde	35,35	36,56
Phosphorsäure	33,40	34,72
Wasser	26,80	28,00
Flußsäure	2,06	
Eisenoxyd	1,25	
Kalkerde	0,50	
	99,36	99,28

Findet sich auf Klüften im Thonschiefer: Barnstaple in Devonshire; Springhill in Irland; in Kiefelschiefer: Diensberg bei Gießen, Frankenberg in Sachsen; im Granit: St. Austle in Cornwall; in Sandstein: Bítrow in Böhmen; auf Braun-Eisenstein: Amberg in Bayern; Villa Rica in Brasilien; Grönland n. s. w.

Breithaupt's Striegisan scheint Wavellit zu seyn.

Anhang:

Kalait.

Syn. Türkis. Mineral-Türkis. Dichter Hydrargillit. Turquoise. Calait.

Nierenförmig, stalaktisch; dörb, als Ueberzug, eingesprengt, in Geschieben.

Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 6. Spec. Gew. = 2,86 — 3. Undurchsichtig, höchstens an den Ranten durchscheinend. Schwacher Wachsglanz, matt. Smaltblau und himmelblau, spärlich bis pistaziengrün; auch gelblich; Strich weiß.

B. d. L. sich braun färbend, unschmelzbar; mit Borax zu klarem Glase. Im Kolben etwas Wasser gebend; während er heftig decrepitiert. Salzsäure ohne Wirkung. Nach Berzelius eine Mengung von phosphorsaurem Thonerde mit phosphorsaurem Kalk und Kieselerde, gefärbt durch kohlensaures Kupfer und Kupferoxydhydrat.

Auf schmalen Klüften im Rieselfeld bei Gersdorf bei Stein in Schlessen; Dalsnig und Reichenbach im Böhmerlande; Persien, hier auch als Geschiebe.

Der Türkis wird, wenn er eine gleichmäßige Farbe besitzt, zu verschiedenen Gegenständen des Schmucks, zu Ring- und Nadelsteinen u. verwendet. Von den ächten Türkisen sind die abendländischen oder Zahn-Turkise zu unterscheiden; letztere sind Stücke fossiler Thierzähne durch Kupferoxyd gefärbt; die geringere Härte und das blätterige Gefüge unterscheiden sie leicht vom Ersteren.

55. Amblygonit.

Kernform: rhombische Säule. $M || M = 106^{\circ} 10'$ und $73^{\circ} 50'$, durch Spaltung erhöht.

Krysalle: undeutlich und rauh; eingewachsen in krysallinische Massen.

Spaltbar parallel den Seitenflächen der Kernform. Bruch: uneben. Härte = 6. Spröde. Spec. Gew. = 3,9. Halb durchscheinend. Glasglanz. Grünlichweiß ins Berg- und Gelbgrüne.

B. d. L. leicht zu einem klaren Glase schmelzend, das jedoch beim Abkühlen unklar wird; in Borax leicht löslich. Im Kolben etwas Feuchtigkeit gebend, mit Reaktion von Flußsäure. Nach Berzelius halb phosphorsaures Thonerde-Lithion gemengt mit den Fluor-Verbindungen derselben Radikale.

Der mineralogisch-chemischen Formel entspricht die Mischung.

Thonerde 38,96

Phosphorsäure 54,12

Lithion 6,92

100,00 (v. Kobell).

In Granit zu Ehresdorf unfern Penig in Sachsen.

56. Phosphorsaurer Thon.

Syn. Phosphorsaure Alaunerde.

Erdig.

Verreiblich. Sehr leicht. Weiß ins Gelbliche. Fettig anzufühlen. Stark an der feuchten Lippe hängend.

B. d. L. phosphoreszirend und blendend weiß werdend. In Salpeter- oder Salzsäure leicht lösbar. Chem. Bestand nach Bauquelin's Analyse:

Thon 46,67

Phosphorsäure. 30,50

Ammoniak 3,13

80,30

In der Höhle eines vulkanischen Gesteins auf dem Eilande Bourbon.

57. Turnerit.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M||M=96^{\circ} 10'$ und $83^{\circ} 50'$. $P||M=99^{\circ} 50'$. Es kommen sehr verwickelte Combinationen vor.

Nur Krystalle.

Spaltbar parallel den Diagonalen der P-Fläche. Härte = 6. Durchsichtig bis durchscheinend. Diamantähnlicher Glanz. Gelblichbraun. Strich: weiß ins Graue.

Chem. Bestand nach Children: Thon, Kalk, Talk, etwas Eisen und wenig Kiesel.

Am Berge Corel in der Dauphinée mit Bergkrystall, Abular, Anatas, Ehrichtonit u. s. w.

58. Lazulith.

Syn. Blauspath. Prismatischer und prismatoëdischer Lasurpath. Klaprothit. Lasulite. Azure-Spar.

Kernform: rhombisches Octaeder. $P||P=96^{\circ}32'$ über den scharfen Scheitellanten; $\pm 99^{\circ}9'$ über den stumpfen Scheitellanten; $=136^{\circ}38'50''$ über den Randlanten.

Krystalle, selten ausgebildet oder sehr verwickelte Combinationen, drusig verbunden, krystallinische Massen mit unvollkommen blätteriger bis körniger Textur; derb, eingesprengt.

Spaltbar parallel den Endrandungs-Flächen. Bruch: uneben. Härte $=5,5$. Spröde. Spec. Gew. $=3,0-3,1$. Durchscheinend bis undurchsichtig. Glasglanz. Berliner-, indig-, himmel- und smalteblau; bläulich- oder grünlichweiß, selten grau oder braun. Strich: weiß.

B. d. L. unschmelzbar, verliert seine Farbe, zerklüftet sich und zerfällt in kleine Stücke; mit Borax zu klarem Glase. Im Kolben Wasser gebend. In Säuren unauflöslich; nach dem Glühen jedoch durch Salz- und Salpetersäure beinahe ganz auflösbar. Chem. Bestand nach den Analysen von Fuchs (Lazulith) und Brandes (Blauspath):

Thonerde.....	35,73	34,50
Phosphorsäure	41,81	43,32
Talkerde.....	9,34	13,56
Kieselerde.....	2,10	6,50
Kalkerde.....		0,48
Eisenoxydul...	2,64	0,80
Wasser	6,06	0,50
	<u>97,68</u>	<u>99,66</u>

Findet sich in Klüften von Thonschiefer mit Quarz und Eisenspath am Radelgraben bei Werfen in Salzburg; auf Quarzlagern im Glimmerschiefer: Fischbach und Boraus in Steyermark; Rathhausberg in Salzburg; Wienerisch-Neustadt in Ober-Oesterreich.

Der Childebrenit von Lavistock in Devonshire scheint zum Lazulith zu gehören.

59. Spinell.

Syn. Dodekaedrischer Korund. Spinelle. Alumne magnéside.

Kernform: regelmäßiges Oktaeder (Fig. 2. pg. 17.). Außer diesem kommen noch häufig folgende Gestalten vor: 1) entkantet, Fig. 77.; 2) beßgl. z. Verschw. der Kernflächen. Raute-dodekaeder; 3) vierfach entknt in der Richtung der Flächen, Fig. 78.; 4) beßgleichen und entkantet; 5) Zwillinge der Kernform, Fig. 79.

Fig. 77.




Fig. 78.





Fig. 79.



Krystalle. Körner. Oberfläche meist glatt, auch rauh.

Schwierig spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig. Härte=8. Spröde. Spec. Gew.= 3,48 — 3,64. Durchsichtig bis undurchsichtig. Starker Glasglanz. Roth, blau, schwarz.

B. d. L. für sich unschmelzbar; mit Borax schwierig zu einem klaren wenig gefärbten Glase, der Pleonast zu eisengrünem Glase. Das Pulver wird von Phosphorsalz leicht und ohne Rückstand aufgelöst. Säuern ohne Wirkung. Chem. Bestand nach den Analysen von Abich: I von rothem Spinell aus Ceylan, II von blauem von Aker und III vom Pleonast aus Tyrol.

	I	II	III
Thonerde....	69,01	68,94	66,89
Talkerde.....	26,21	25,72	23,61
Kieselerde....	2,02	2,25	1,23
Chromorydul.	1,10		
Eisenorydul..	0,71	3,49	8,07
	<u>99,05</u>	<u>100,40</u>	<u>99,80</u>

Der Gehalt an Eisenorydul im Pleonast variiert sehr: Abich gibt vier Analysen von verschiedenen Fundorten, wo derselbe zwischen 5,06 und 19,29 beträgt.

Arten:

1. Rother Spinell.

Syn. Rubin z. Th. Rubia-spinelle. Spinel-Ruby.

In Granit eingewachsen: Broddbo und Finbo bei Fahlun in Schweden.

61. Basisches Fluorcerium.

Syn. Basisch-flusssaures Cerer.

Krystallinische Massen mit Spuren von Blätter-Durchgängen. Verb.

Bruch: muschel. Härte = 4,5. Undurchsichtig. Zwischen Glas- und Fettglanz. Gelb ins Rothe und Braune. Strich: braunlichgelb.

Für sich im Kolben Wasser gebend und dunkler werdend. B. d. F. auf der Kohle verändert es die Farbe, und sieht, wenn es beinahe glüht, schwarz aus; aber während des Abkühlens wird es dunkelbraun, schön roth, und endlich dunkelgelb. Diese Erscheinung läßt das neutrale Fluorcerium nicht wahrnehmen. Unschmelzbar. Mit Phosphorsalz zu einem rothen, nach dem Abkühlen wasserklaren Glase auflöslich. Von Soda schwer zersetzbar. Auflösl. in Salzsäure unter Entwicklung von Chlor. Chem. Zusamm. nach Berzelius:

Ceroryd .. 84,20

Flußsäure 10,85

Wasser ... 4,95

100,00

In Feldspath eingewachsen: Finbo bei Fahlun in Schweden.

62. Kohlen saures Cerorydul.

In krystallinischen Blättchen und erdigen Massen, als Ueberzug.

Undurchsichtig. Perlmutterglänzend. Weiß ins Graue und Gelbliche. Strich: weiß.

B. d. F. im Kolben gibt es etwas Feuchtigkeit und brennt sich braungelb. Mit Flüss. gibt es die Reaction des Ceroryds. Unter Brausen in Säuren auflöslich. Chem. Zusamm. nach der Analyse von Hisinger.

Cerorydul .. 75,7

Kohlensäure 10,8

Wasser 13,5

100,0

Auf einem Kupferfieslager im Gneiß, mit Cerit, Allanit u. s. w. Bastnäs bei Riddarhyttan in Schweden.

63. Ytterocerit.

Syn. Cerium oxyde yttrifere.

Kernform: schiefe rhombische Säule $M||M=108^{\circ} 30'$ und $73^{\circ} 30'$ ungefähr, Ergebnis der Spaltung.

Krystallinische Massen. Verb. Textur: unvollkommen blätterig.

Deutlich spaltbar parallel den Seitenflächen der Säule und nach zwei verschiedenen Endflächen. Bruch: uneben. Härte = 4,5. Spec. Gew. = 3,44. Undurchsichtig. Wenig, glas- bis perlmutterglänzend. Lavendel- und violblau, graulich, weißlich.

B. d. L. weiß werdend, unschmelzbar; mit Borax und Phosphorsalz zu klarem Glase. Das Pulver leicht und ohne Rückstand in Salzsäure löslich; von der Schwefelsäure unter Entwicklung von Flußsäure zersetzbar. Chem. Zusamm. nach Berzelius:

Ceroryd ..	13,78
Yttererde ..	19,02
Flußsäure ..	32,55
Kalkerde ..	31,25
Thonerde ..	3,40
	<hr/>
	100,00

Eingewachsen in Quarz oder Feldspath: Finbo und Broddbo bei Fahlun.

XVI. Gruppe. Silicium.

Das Silicium findet sich in großer Menge auf unserer Erde verbreitet, jedoch nicht rein, sondern, mit Sauerstoff verbunden, als Oxyd, und als solches theils rein, theils mit andern Metalloxyden vereinigt, die meisten unserer sogenannten Steinarten zusammensetzend.

Die Zahl der Mineralien dieser Gruppe ist sehr groß; die

Härte derselben steigt bis zu 8,5, das specifische Gewicht jedoch nicht über 4,5. Weiß glasglänzend; weiße Farbe vorherrschend.

64. Quarz.

Syn. Rhomboedrischer Quarz. Quarz.

Kernform: Rhomboeder $P \parallel P = 94^{\circ} 24'$ über den Scheitellanten; $= 85^{\circ} 36'$ über den Randlanten. Außer der Kernform, die jedoch sehr selten erscheint, kommen folgende Gestalten vor: 1) entrandeckt (z) in der Richtung der Scheitellanten und entrandet (r) zur Säule, Fig. 80.; 2) entrandeckt in der Richtung und 3. Verschw. der Scheitellanten (Bipyramidal-Dodekaeder) Fig. 81.; 3) desgleichen und entrandeckt zur Säule, Fig. 82.; 4) entrandeckt zur Säule, Fig. 80. ohne die Flächen z.; 5) Zwillinge und andere verwickelte Formen.

Fig. 80.




Fig. 81.




Fig. 82.



Krystalle, unter ihnen besonders die Abänderung Nr. 3. am häufigsten, jedoch sind die Flächen oft sehr ungleich ausgedehnt, wodurch die bizzarsten Gestalten entstehen, krystallinische und derbe Massen; eingesprengt, Körner. Oberfläche der Krystalle, meist glatt, nur die Säulenflächen häufig horizontal gestreift.

Unvollkommen spaltbar parallel den Kern- und den Flächen der Säule. Bruch: muschel. Härte = 7. Spröde. Spec. Gew. = 2,5 — 2,8; reiner Bergkrystall nach Deubant = 2,654. Durchsichtig bis undurchsichtig. Doppelte Strahlenbrechung. Senkrecht gegen die Hauptaxe geschnittene Platten zeigen farbige Ringe im polarisirten Lichte. Glas-, zuweilen auch Fettglanz. Wasserhell; weiß, grau, schwarz, roth, gelb, braun, grün und blau in verschiedenen Nuancen. Durch Aneinanderreibung zweier Stücke phosphoreszirend. Gibt am Stahle, unter Entwicklung eines hyenzlichen Geruchs, Funken.

B. d. L. für sich unschmelzbar; mit Natron zu Glas. Säuren, mit Ausnahme der Flußsäure, ohne Wirkung. Im reinsten Zustande: Kieselerde, deren chemische Zusammensetzung nach Berzelius folgende ist:

Silicium... 48,72

Sauerstoff.. 51,28

100,00

Häufig mit etwas Thonerde, Eisen- oder Manganoxyd verunreinigt.

Arten:

1) Bergkrystall.

Syn. Quarz hyalin limpide. Rock Crystall.

Krystalle, zuweilen von bedeutender Größe, selten eingewachsen, meist zu Gruppen und Drusen verbunden; Geschiebe (Rheinfelsel). Gewöhnlich durchsichtig oder halbdurchsichtig. Starker Glasglanz, auf den Bruchflächen Fettglanz. Wasserhell; grau-lich- oder röthlichweiß; perl-, rauch- oder gelblichgrau; weingelb (Citrin), gelblich- bis nelfenbraun (Rauchtopas), selten pechschwarz (Morion). Schließt zuweilen haarförmige Krystalle von Amianth, Epidot, Turmalin, Strahlstein, Rutil u. s. w. ein (Haar- oder Nadelstein), auch Schuppen von Glimmer, Chlozit, Blättchen von Gediengen-Silber, Eisenglanz u., selten bewegliche Wassertropfen (Elba. Schemnitz.)

Findet sich vorzüglich in den Drusenräumen oder größeren Höhlungen (Krystallfesseln) abnormer Gebirgs-Gesteine, oder in denen der Gänge, welche diese Felsarten durchsetzen. Tyrol; Grimsel, Gotthart, Schreckhorn, Ursernthal u. a. D. in der Schweiz; steyerische und salzburger Alpen; Savoyen; Sibirien; Norwegen; F inland; Madagaskar; Nisans in der Dauphinée; Ceylan; Arran u. s. w.; in Gyps eingewachsen: Tonna im Götthalschen. — Als Geschiebe in vielen Flüssen.

Der Bergkrystall wird zu nächstem Diamantschmuck verarbeitet, besonders zu Ring- und Nadelsteinen, dann auch zu Petschaften, Gemmen, Dosen, Kron- und Armluchtern, Wägen und dergl. mehr. Ferner bereitet man aus ihm die feineren Glasflüsse, mit welchen man, durch Versehung mit verschiedenen Metalloryden, die farbigen Edelsteine nachzuahmen sucht.

2) Amethyst.

Syn. Quarz hyacin violet; violet Quarz.

Kryskalle, besonders die Formen Fig. 80 und 82 zeigend, jedoch meist mit ihren Seiten verwachsen und zu Drusen verbunden; kelsförmig stängelig zusammengesetzt, zuweilen sternförmig auseinander laufend; verb und in Geschieben. Violblau, perlgrau, graulich oder grünlichweiß; rauchgrau, nelfenbraun; zuweilen mit fortificationsartigen Farbenzeichnungen.

Auf Gängen in älterem Gebirge: Schemniz und Kapnik in Ungarn; Wolfenstein, Wiesenbad, Schlottwitz im Erzgebirge; Strassberg am Harz; Steyermark; Schlessen; England. — In den Achattugeln der Mandelsteine: Oberstein in der Pfalz; Zillerthal, Schottland, Sibirien. — Als Geschiebe: Ceylan, Spanien; Brasilien.

Er wird zu verschiedenen Gegenständen des Schmucks verarbeitet, namentlich zu Ring- und Nadelsteinen, zu Dosen, Petschaften u. s. w. Auch läßt sich derselbe gut schneiden, und zu erhaben und vertieft geschnittener Arbeit verwenden.

3) Gemeiner Quarz.

Syn. Quarz hyaline amorphe ou opaque; common Quarz.

Kryskalle, fast nur in den Formen Fig. 81. und 82.; in Ausfüllungs-Pseudomorphosen nach Fluß-, Kalk-, Baryt- und Gypsspath-Formen; verb, traubig, nierenförmig, stalaktitisch, zellig, zerfressen, mit Eindrücken, in Platten, eingesprengt, in Geschieben, Körnern und als Sand. Textur: zuweilen körnig. Bruch: uneben ins Splitterige und unvollkommen Muschelige. Durchscheinend, oft nur an den Kanten. Weiß, grau, gelb, roth, braun, selten blau oder grün, in verschiedenen Nuancen.

Außerordentlich verbreitet, theils als eigenthümliche Gebirgsart (Quarzfels), theils als wesentlicher Gemengtheil vieler Felsarten, namentlich der meisten krystallinischen Gesteinen, so wie der verschiedenen Sandstein-Formationen, theils als Geschiebe und Sand in den Diluvial- und Alluvial-Gebilden.

Die älteste und wichtigste Anwendung des Quarzes ist die zur Bereitung des Glases. Ferner benutzt man ihn bei der Fabrikation des Porzellans, Steinguts, der Smalte u. s. w. Der Sand wird vorzüglich zur Bereitung des Mörtels verwendet.

Auch gebraucht man den Quarz, als Baustein, Hausstein, oder man fertigt Mählsteine, Reibsteine, Glättsteine u. s. w. daraus.

Als Varietäten des gemeinen Quarzes sind besonders folgende zu beachten.

a) Rosenquarz (Milchquarz. Quarz hyalin rose. Rose-Quarz). Derb in großen Massen. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Rosenroth, zuweilen ins Weiße und Graue.

Auf lagerartigen Fundstätten im Granit und Gneiß. Rhenstein bei Zwiesel in Baiern; Hohenstein in Sachsen; Kolyma; Finland; Schottland; Brasilien; Ceylan.

b) Siderit (Saphirquarz). Derb. Indigo- und Berlinerblau.

In kleinen Gangtrümmern: Gosling in Salzburg; lagerartig im Granit: Grönland. Ceylan.

c) Stinkquarz (Quarz hyalin fetide). Derb. Grau. Entwickelt beim Zerbrechen oder Reiben einen unangenehmen Geruch.

Lagerartig im Gneiß: Chanteloube und Rantes in Frankreich; Schottland; Eiba.

d) Katzenauge (Schillerquarz. Quarz hyalin chatoyant. Cat's-eye). Derb, in stumpfseitigen Stücken und Geschieben. Grünlich, asch, gelblichgrün; olivengrün; gelblich oder röthlich-bräun; ziegelroth. Zeigt ein eigenthümliches Schillern, welches besonders nach convexer Schleifung, als pupillenartiger Lichtschein hervortritt.

In Gangtrümmern: Treseburg am Harz, Hof im Fichtelgebirge; als Geschiebe: Ceylan, Kasse-Malabar.

Wird zu Ring-, Nadel- und anderen Schmucksteinen verwendet.

e) Prasem (Quarz hyalin vert-obscur. Prase). Krystallin oder derber Quarz, der innig mit Strahlstein durchwebt und verschmolzen ist, und daher leuchtgrün erscheint.

Breitenbrunn in Sachsen, Bischof in Tyrol, Eiba.

Er wird zu Ring- und Nadelsteinen, auch zu Dosen und anderen Bijouterie-Waaren verarbeitet. Bei der Mosaik verwendet man ihn zum Laubwerk.

f) Faserquarz. Derb, in Platten mit feinstängeliger bis höchst feinfaseriger Textur. Schneeweiß, Graulich oder röth-

schwarz, selten in brauner, rothen und gelblichen Streifen wechselnd.

In Serpentin am Monte Frasinetto im Nure-Thal in Parma. — Auvergne. Spanien.

Wird zu Schmutz für Armhänder, Celliers u. s. w. verarbeitet.

g) Aventurin. Krystallisiert, häufiger körnig; als Gesteine. Braun oder roth, mit gelb- oder messinggelben schimmernden Einschlüssen; auch durch beigemengte Glimmer-Blättchen wird diese Erscheinung zuweilen bewirkt.

Man findet ihn aus Ural, bei Mariagzell in Steyermark, in der Gegend von Madrid, bei Nantes, in Schottland.

Der Aventurin wird zu Ringsteinen, Ohrgehängen, Dosen und dergl. m. verarbeitet.

h) Eisenerz-Eisenstein (Quarz-hyalin hématoids. Ferruginous Quartz); ein mit Thon und rothem oder braunem Eisenocker innig gemengter krystallisierter oder körniger Quarz. Die Krystalle zuweilen um einen einzelnen strahlig auseinander laufend (zu Hirschhorn). Undurchsichtig. Roth, gelb oder braun.

Auf Eifenerz-Gängen: Hirschhorn in Westphalen; Eibenstock und Johann-Georgenstadt im Erzgebirge, Harz, Tyrol u. s. w. — Sehr ausgezeichnet in einzelnen Krystallen in Gyps eingewachsen zu St. Jago de Compostella in Spanien (Hyazinth von Compostella).

i) Hirschhorn (Bläschen, Bläschen-Tube. Tube subminaire. Vitreous Tubes). Röhren, entstanden durch Einschlagen des Blasen in mehr oder minder feine Quarzsandlagen, oft von bedeutender Länge und Dicke, nach unten enger werdend; außen mit zackigen Hervorragungen versehen, oder mit einer Rinne angefrähter Quarzförner; innen überzogen mit Glasfluß, kleintraubig, porös. Grau ins Gelbliche und Weiße.

Enner Haide im Münsterchen; Regenstein am Harz; Gegend von Dresden; Cumberland, Aegypten u. s. w.

4. Chalzedon.

Syn. Quarz-agathe, calcedoine. Calcédoine. Calcedony.

Krystalle der Nierenform und in der Abänderung No. 4.; Umhüllungs-Pseudomorphosen, namentlich über Kalkspath und

Bergkry stall, kugelig, traubig, nierenförmig, stalaktitisch, in den verschiedensten Gestalten, derb, in Platten, stumpfseitigen Stücken und Geschieben. Als Versteinerungsmittel. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Wenig glänzend. Weiß, lichtegrau, smalt- und violettblau, berg-, lauch- und pistaziengrün (Plasma); hyazinth-, fleisch- und braunlichroth, wachs- und honiggelb, braun, schwarz; oft gewölkt, gefleckt oder gestreift (Onyx), zuweilen mit mossartigen Zeichnungen (Mölkastein).

Als Ausfüllung der Blasenräume von Mandelsteinen: Oberstein; Oppenau in Baden; Island; Garder; Vicenza; Grönland; Sibirien u. s. w. Auf Gängen im Porphyr: Ungarn, Siebenbürgen, Chemnitz in Sachsen. — Auf Silber- und Bleierz-Gängen: Freiberg und Schneeberg in Sachsen; Lörda in Siebenbürgen u. s. w. In Geschieben und Rollstücken: Württemberg; Ceylan, Aegypten, Sibirien u. s. w.

Folgende Varietäten des Chalzedons sind besonders zu bemerken:

a) **Karniol** (Quarz-agathe cornaline. Cornaline. Carnelian). Stumpfseitige Stücke; derb; Geschiebe. Wachs- und blutroth, dunkel- und gelblichroth, weißlich.

Die schönsten Karniole werden als Geschiebe gefunden: Sibirien, Arabien, Aethiopien, Orient u. s. w.; auch als Ausfüllungs-Masse der Blasenräume in Mandelsteinen: Oberstein; Fassathal.

b) **Heliotrop** (Quarz-agathe ponietué. Heliotrope). Derb; stumpfseitige Stücke. Fettglanz. Gelb- und lauchgrün mit blutrothen und gelben Punkten.

Vorzüglich schön kommt er aus dem Orient, Aegypten, Bucharei, Tartarei, Sibirien; ferner findet man ihn in Mandelsteinen: Tyrol, Schottland.

c) **Chrysoprass** (Quarz-agathe Prase. Chrysoprase). Derb und in Platten. Bruch: eben ins Splittetige. Durchscheinend. Fettglanz, zuweilen matt. Apfelgrün, grünlichweiß, bläulich- oder olivengrün. Die grüne Farbe rührt von Nickel oxyd her.

In Serpentin zu Gläsenhof, Rossmühl und Grochau in Schlesien.

Der sogenannte Haytorit, welcher auf den Magneteisengängen zu Hay-Tor in Devonshire gefunden wurde, ist ein Chal-

gedon in Pseudomorphosen nach Datolith-Formen; physikalische Merkmale und chemische Zusammensetzung (er enthält nach Wöhler 98,5 p. c. Kiesel-erde) sprechen dafür.

Aus dem Chalzedon und dessen Abänderungen werden Ring- und Halsnadelsteine, Armschmuck, Dosen, Petschafte, Stockknöpfe, Uhrschlüssel, Vasen und andere Gegenstände mehr gearbeitet. Besonders beliebt sind der Chrysopras und der Karniol; in letzteren wird häufig gravirt, und den Chalzedon-Duxr verwendet man zu Cameen.

5) Feuerstein.

Syn. Quarz-agathe pyromaque. Pierre à fusil. Flint.

Sphäroidische, kugelige Massen, Platten, verb. als Geschiebe und Versteinerungs-Mittel. Bruch: vollkommen muschelig. Durchscheinend an den Ranten. Asch-, rauch- und gelblichgrau; schwarz, braun, gelblich, röthlich, selten blaulich.

Findet sich in den jüngern Flözkalk-Formationen, besonders häufig in der Kreide: Insel Rügen; Mden, Stevens-Klint; Gegend von Paris, Champagne; Schottland, England, Gallizien, Litthauen, südliches Rußland u. s. w. als Geschiebe: Mecklenburg, Württemberg, Spanien &c. In der Gegend von Besançon kommen Feuersteinstücke vor, welche Schwefelerde in ihrem Innern einschließen.

Der sogenannte Schwimmstein scheint aus dem Feuerstein entstanden zu seyn, welchen er auch gewöhnlich umhüllt; er ist knollig, nierenförmig, porös; kommt in der Gegend von Paris vor.

Der vorzüglichste Gebrauch, welchen man vom Feuerstein macht, ist, wie schon sein Name bezeugt, der als Feuerzeug. Durch Spalten und Behandlung mittelst verschiedener Hämmer erhält er die bekannte Form. Ein geübter Arbeiter kann in einem Tage 500 Flintensteine zurichten. Ferner verwendet man ihn zur Bereitung des sogenannten Flintglases, des englischen Steinguts, zu Polir- und Glättsteinen, zu Mörsen und Reibschalen u. s. w.

6) Hornstein.

Syn. Quarz-agathe grossier. Hornatone.

Umhüllungs-Pseudomorphosen nach Kalkspath-Formen, kugelig, tropfsteinartig, derb, als Versteinerungs-Mittel namentlich von Holz (Holzstein, Woodstone). Bruch: muscheliger oder splitterig. Durchscheinend, meist nur an den Ranten. Gelblich- und graulichweiß; perl-, asch- bis gelblichgrau; blaulichgrün, ockergelb; ziegel-, fleisch-, braunroth; gelblichbraun.

Auf Gängen in älterem Gebirge: Joachimsthal in Böhmen; Freiberg, Schneeberg; Harz, Schweden, Sibirien; als Kugeln in manchen Kalkformationen: Kellheim und Hof in Baiern, Wiesloch und Ubstadt in Baden u. s. w. — Der Holzstein findet sich im älteren Sandsteine oder im Alluvium. Bilbel unfern Frankfurt; am Riffhäuser in Thüringen; Schemnitz u. a. O. in Ungarn; Katharinburg und Irkutsk in Sibirien u. s. w.

Aus dem Hornsteine werden, wenn er schöne reine Farben besitzt, Dosen, Petschaste, Kreuze, Reibschalen u. dergl. mehr verfertigt.

7) Jaspis.

Syn. Quarz-Jaspe. Jasper.

Derb, eingesprengt, in Geschieben. Bruch: muscheliger. Undurchsichtig. Wachsartiger Glanz, oft matt. Enthält Thonerde und Eisenoxyd beigemengt. Man unterscheidet:

a) Gemeiner Jaspis. Roth, braun, schwarz, selten gelb oder grün; zuweilen gefleckt. Findet sich auf Gängen in Sachsen (Freiberg, Schneeberg), Böhmen, Tyrol, Ungarn, Frankreich, Sibirien u. s. w.

b) Kugel-Jaspis (Aegyptischer Jaspis. Jaspe Egyptien. Aegyptian Pebble). Rundliche, sphäroidische Stücke, grau, braun und roth, welche Farben sich fast stets in ringförmigen Zeichnungen um einen Kern anschließen. Man findet ihn im Bohnerz der Jurakalk-Formation bei Randern in Baden, und als Geschiebe in Ober-Aegypten.

c) Band-Jaspis (Jaspe rubanné; striped Jasper). Derbe Massen mit gerade laufenden oder gewundenen Streifen von grauen, grünen, gelben, rothen und braunen Farben. Sibirien, Corsika, Tyrol, Harz.

Der Jaspis wird zu Siegelsteinen, Tabatieren, Vasen, Tischplatten, zu architektonischen Arbeiten u. s. w. verwendet.

8) Kiefelschiefer.

Syn. *Lydischer Stein*. Quarz-agathe schistoide. Flintly-Slate.

Dichte Massen. Bruch: muschelig ins Splittterige. Schwarz, graulichschwarz, grau, grünlich. Enthält Thonerde, Kalkerde, Eisenerz und Kohle beigemengt.

Er bildet Lager im Thonschiefer-, Grauwacke- und Uebergangskalk-Gebirge. Baiern, Sachsen, Harz, Schlessen u. s. w. Auch als Geschiebe im Alluvium findet man ihn in Ungarn, Hessen &c.

Man verwendet den Kiefelschiefer zum Straßenbau, zu Reib- und Wehsteinen, so wie zu Probirsteinen für Gold und Silber.

9) Achat.

Syn. Quarz-agathe. Agate.

Ein Gemenge mehrerer Quarzarten, namentlich von Amethyst, Chalcedon und Jaspis, welche auf verschiedene Weise mit einander verbunden sind. Man unterscheidet nach der Zeichnung und dem Verbundenseyn verschiedene Arten: Band- (Onyx), Festungs-, Wolken-, Moos-, Trümmer-, Punkt-, Korallenachat u. s. w.

Er findet sich auf Gängen in Gneiß und Porphyr, vorzüglich schön aber in Mandelsteinen als Ausfüllungs-Masse der Blasenräume. Oberstein; Oppenau; Runnersdorf und Schlottwitz in Sachsen; Ungarn; Farber; Sibirien &c.

Aus dem Achat werden Siegelsteine, Kreuze, Ohrgehänge, Uhrschlüssel, Petschafte, Spielmarken u. s. w. gefertigt; auch zu Reibsteinen, Mörfen, Basen, Reibschalen, Tischplatten und dergleichen Gegenständen mehr wird er verwendet. Die Onyxarten werden zum Schneiden von Cameen gebraucht.

10) Kiefeltuff.

Syn. Kieselinter, Fiorit. Quarz-agathe concrétionné thermogène. Siliceous Sinter.

Stalaktitische, kugelige, traubige, zerfressene, zackige und poröse Massen. Derb. Zuweilen als Ueberzug von Pflanzenstängeln und Blättern. Außen uneben oder rauh. Bruch: muschelig. Durchscheinend bis undurchsichtig. Wachsglanz, schimmernd oder matt. Weiß, grau, röthlich; gefleckt, gestreift oder geädert.

Abfaz heißer Quellen: Island; Mont. Dore und Et. Nectaire in Auvergne; Santa-Fiora in Italien, Ischia, Grönland, Kamtschatka u. s. w.

65. Opal.

Syn. Untheilbarer Quarz. Quarz résinite-Opal.

Nicht krystallisirt, gewöhnlich berbe, glasartige Massen von verschiedener Gestalt.

Bruch: vollkommen bis unvollkommen muschelig ins Unebene. Härte. = 5,5 — 6,5. Sehr spröde. Spec. Gew. = 2,0 — 2,2. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz, zuweilen fettartig. Wasserhell, weiß oder verschieden gefärbt. Strich: weiß. Einige Abänderungen mit mehr oder minder lebhaftem Farbenspiel. Durch Reiben zweier Stücke aneinander phosphoreszirend.

B. d. L. rasch erhitzt verknisternd, trübe und glanzlos werdend, unschmelzbar; mit Borax zu klarem Glase. Im Kolben gibt er Wasser. Chemische Zusammensetzung: Kiesel-erde und Wasser in noch nicht bestimmtem Verhältniß. Der Wassergehalt wechselt zwischen 3 und 11 p. c. Häufig sind dem Opal auch Eisenoryd, Thon- und Kalkerde beigemengt.

Arten:

1) Edler Opal.

Syn. Quarz résinite opalin; precious or noble Opal.

Derb; eingesprengt. Bruch: muschelig. Halbdurchsichtig. Starker Glanz. Wasserhell, milchweiß, weingelb, auch bräunlich mit lebhaftem Farbenspiel in grünen, rothen, blauen und gelben Farben.

Er wird auf regellosen Gängen und Adern oder nesterweise in trachytischen Gesteinen, zumal bei Ezerweniza zwischen Kaschau und Eperies in Ungarn gefunden; eingesprengt in Dolerit: Farber, Frankfurt am Main; in Porphyry: Liebethal bei Leisnig in Sachsen.

Der edle Opal wird vorzüglich zu Ringsteinen, zu Ohr-, Hals- und Kopfschmuck verwendet, und ist ein, wegen seines prachtvollen Farbenspiels, sehr geschätzter Stein. Sein Preis wird durch Schönheit und Größe bestimmt.

2) Feuer-Opal.

Syn. Quarz résinite miellé. Fire-Opal.

Derbe Massen mit muscheligen Bruch. Durchsichtig. Starker Glasglanz. Hyazinthroth ins Honig- und Weingelbe. An manchen Stellen karminroth und apfelgrün irisirend.

In trachytischem Porphyr zu Simpaman in Mexiko und im Mandelsteine auf Eide, einer der Farber.

Sehr dienslich, um Bijouterie-Gegenstände zu verfertigen.

3) Gemeiner Opal.

Syn. Wachsopal, Pechopal. Quarz résinite commun. Common-Opal.

Derb, eingesprengt, stalaktitisch. Bruch; muschel. Durchscheinend bis halbdurchsichtig. Stark glänzend. Milch-, gelblich-, röthlich- und grünlichweiß; wachs-, ocker- und weingelb, fleisch- und ziegelroth; ol- und olivengrün. Die weißlichen Abänderungen zuweilen in rothen und blauen Farben spielend, jedoch immer nur in einer.

Findet sich unter ähnlichen Verhältnissen wie der edle Opal in Ungarn (Tokay, Eperies, Telfebanya u. a. D.); auf Roth-Eisenstein-Gängen zu Eibensköd, Schneeberg und Johann-Georgenstadt in Sachsen; in Serpentin zu Rosemüh in Schlesien; in Mandelstein auf Island und den Farbern.

Wird zu Ringsteinen und Petschaften verarbeitet.

Das Weltauge (Hydrophan. Quarz-résinite hydrophane) ist edler oder gemeiner Opal, der seinen Wassergehalt, und mit diesem Glanz und Durchsichtigkeit verloren hat. Er saugt begierig Wasser ein, und erhält dadurch jene Eigenschaften, und zugleich die in schönen Farben zu spielen, auf kurze Zeit wieder. Trocken ist er weiß, gelblich oder röthlich.

Er wird im Porphyr-Gebirge der Gegend von Hubertsburg in Sachsen gefunden. Auch in der Bretagne, in Ungarn und auf den Farbern soll Weltauge vorkommen.

Der Hydrophan wird manchmal zu Ringsteinen verarbeitet.

4) Halbopal.

Syn. Quarz résinite commun. Semi-Opal.

Derb, eingesprengt, stalaktitisch, selten in Ausfällungs-Pseu-

domorphosen nach Kalkspath-Formen, zuweilen auch als Versteinerungsmittel von Holz (Holzopal), oft noch mit deutlicher Holztextur, selbst mit erkennbaren Jahresringen, Astansätzen u. s. w. Bruch: flachmuscheligen Ebene. Durchscheinend; meist nur an den Kanten. Wachs-, zuweilen auch Glasglanz. Gelblich-, grünlich-, milchweiß; asch-, grünlich-, gelblichgrau; pistaziengrün; wachs- und ockergelb; roth-, kastanien-, leber- und gelblichbraun; zuweilen in gestreiften Zeichnungen.

Man findet ihn auf Gängen im älteren Gebirge bei Freiberg und Bleistadt im Erzgebirge; in Dolerit zu Steinheim bei Hanau; in trachtyartigem Porphyry bei Speries, Tokay, Telfebanya, Schemnitz u. a. D. in Ungarn; in Mandelstein auf Island und den Farbern u. s. w. — Der Holzopal wird vorzüglich schön bei Telfebanya, Tokay und Zastraba in Ungarn und im Siebengebirge am Rhein getroffen.

Man verwendet den Halbopal zu Ringsteinen und kleinen Bijouterie-Gegenständen; aus Holzopal werden vorzüglich Dosen besonders in Wien, verfertigt.

5) Hyalith.

Syn. Quarz-hyalin concrétionné.

Traubig, nierenförmig, stalaktitisch, rindenartiger Ueberzug. Bruch: muscheligen. Durchsichtig. Glasglanz. Wasserhell; auch gelblich-, graulich- oder röthlichweiß.

In doleritischen Gesteinen: Frankfurt am Main; Marköbel unfern Hanau; Kaiserstuhl im Breisgau; Walsch in Böhmen; in Trachyt an mehreren Orten in Ungarn; Ischia, Mexiko u. s. w.

6) Menilith.

Syn. Quarz résinite subluissant.

Knollig, nieren- oder plattenförmig. Bruch: flachmuscheligen. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Wenig fettglänzend bis matt. Kastanienbraun, gelblichgrau; außen oft blau.

In Klebschiefer eingewachsen; Menilsle-Montant u. a. D. bei Paris. Auch in der Gegend von Mans in Frankreich und bei Osmuczan in Mähren soll er vorkommen.

7) Cacholong.

Syn. Quarz-agathe cacholong.

Derb, als Ueberzug, festner nieren- oder plattensförmig. Bruch: flachmuschelig. Undurchsichtig. Wenig perlmutterglänzend bis matt. Milch-, röthlich- oder gelblichweiß.

Findet sich auf ähnliche Weise wie der Chalzedon, auch meist mit diesem in dünnen Lagen wechselnd. Island, Färöer, Grönland. Auf Braun-Eisenstein zu Hüttenberg in Kärnten; lose im Sande des Flusses Eech in der bucharischen Kalmuckei.

Man verwendet ihn hauptsächlich zu Ring- und Halsnadelsteinen, zu Arm- und Halsschmuck, zu Petschaften und dergleichen mehr. Die Kalmucken sollen aus ihm Söhenbithen und mancherlei Hausgeräthe verfertigen.

8) Jaspopal.

Syn. Opaljaspid. Jaspe opal. Jasper opal

Derb, eingesprengt, tropffsteinartig, in knolligen und plattensförmigen Massen. Bruch: flachmuschelig. Undurchsichtig. Starker Fettglanz. Grau, gelb, roth und braun. Zuweilen mit vielem Eisenoxyd gemengt, woher auch das größere specifische Gewicht kommt.

In trachytischen Trümmer-Gesteinen zu Tefke-Banya, Tokay u. a. D. in Ungarn, Sachsen, Kolyman u. s. w.

Er wird zu kleinen Bijouterie-Gegenständen, in der Türkei zu Säbel- und Dolchgriffen verarbeitet.

66. Wollastonit.

Syn. Tafelspath. Schalkstein. Prismatischer Angitspath. Zurlit. Wollastonite. Tabular-spar.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 95^\circ 38'$ und $84^\circ 28'$; $P \parallel M = 104^\circ 48'$ und $75^\circ 12'$ (Brooke). Krystalle, selten und gewöhnlich unvollständig, meist krystallinische Massen mit schaliger oder stängeliger Zusammensetzung und von blätteriger Textur.

Spaltbar parallel den P- und den Entmittelseitungs-Flächen. Bruch: splitterig ins Unebene. Härte = 4,5 — 5. Spröde. Spec. Gew. = 2,8 — 2,9. Halbdurchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glas- oder Perlmutterglanz. Weiß, graulich-, gelblich-, röthlich- und braunlichweiß.

B. d. L. zu halbklaarem farblosen Glase schmelzend; mit Borax leicht zu klarem Glase. In Salzsäure wird er leicht aufgelöst und gibt eine Gallerte. Chem. Zusamsf.

nach L. Gmelin: Analyse von Rose.

Kieselerde...	53,3	51,60
Kalkerde....	46,7	46,41
	<u>100,0</u>	<u>98,01</u>

Häufig mit etwas Kalkerde, Mangan und Eisenoryd verunreinigt.

Zu körnigem Kalk begleitet von Granat, Hornblende, Grammatit u. s. w. Eziklowa im Bannat; Pargas, Perhoniemi, Kuska u. a. O. in Finland; Götum in Schweden; Nuerbach in der Bergstraße; Easton in Pensylvanien &c. — In doleritischem Gesteinen: Gegend von Edinburg, Capo di Bove unfern Rom. — Vesuv.

67. Onenit.

Krystallsystem wahrscheinlich rhombisch.

Derbe Massen mit faseriger und schmalstrahliger Textur.

Härte = 5. Spec. Gew. = 2,28. Durchscheinend, auch nur an den Kanten. Schwacher Perlmutterglanz, schimmernd. Weiß, gelblich- und blaulichweiß.

B. d. L. ziemlich leicht, aber schwerer als Apophyllit, unter Schäumen zu einer porzellanartigen Masse schmelzend. Im Kolben viel Wasser gebend. Das Pulver wird von Salzsäure leicht zerlegt, und scheidet die Kieselerde in aufgequollenen Flocken ab. Chem. Zusamsf. nach v. Kobell.

Kieselerde	56,99
Kalkerde.	26,35
Wasser..	<u>16,66</u>
	100,00


mit etwas Thon- und Eisenoryd verunreinigt.

Findet sich im Mandelstein bei Kudlsat am Waygat auf Disko-Eiland.

68. Datolith.

Syn. Prismatischer Dylomspath. Chaux boratée siliceuse. Borate of Lime.

Fig. 83.



Kernform: schiefe rhombische Säule. $M||M = 77^{\circ} 30'$ und $102^{\circ} 30'$; $P||M = 91^{\circ} 41'$ und $88^{\circ} 19'$. Beobachtete Gestalten: 1) dreifach entmittelseitet ($g^1 g^2 g^3$) entstumpft (a), entstumpftrandet (b), und entseiteneckt (o) Fig. 83.; 2) zweifach entmittel-

seitig, entstumpft, entrandet und entseiteneckt; 3) noch mehrere andere Formen, die jedoch meist sehr verwickelt sind.

Kristalle, kristallinische und derbe Massen mit körniger und faseriger Textur.

Schwierig spaltbar nach den Seitenflächen. Bruch: uneben bis unvollkommen muschelig. Härte = 5 — 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,95 — 3,4. Durchsichtig bis undurchsichtig. Glas-, auch Fettglanz. Farblos, weiß, grau, grünlich. Strich: weiß.

B. d. L. auf Kohle unter Anschwellen zu einem klaren, meist ungefärbten Glase. Im Kolben Wasser gebend. In Salpetersäure leicht auflöslich mit Hinterlassung einer Kiesel-Gallerte. Chem. Zusammens.

nach v. Kobell: Analyse des Datoliths des Botryoliths von Stromeyer, von Klaproth,

Kieselerde..	37,59	37,36	36,0
Kalkerde...	38,62	35,67	39,5
Borarsäure.	18,91	21,26	13,5
Wasser, ...	4,88	5,71	6,5
		Eisenoxyd	1,0
	100,00	100,00	96,5

Arten:

1) Datolith.

Syn. Datolithspath. Humboldt (Levy).

Kristalle, meist mit rauher oder gestreifter, doch auch mit glatter Oberfläche, aufgewachsen und zu Drusen verbunden, derb, zuweilen von körniger Textur. Durchsichtig bis durchscheinend. Farblos, weiß, graulich, blaulich, gelblich, grünlichweiß, selten honiggelb oder seladongrün.

Auf Magneteisen-Lagern im Gneise zu Arendal in Norwegen und auf Utön; auf kleinen Gängen im Diorit bei Andreasberg; auf Kalkspath-Gängen in einem Sandstein der Gelsals bei Sonthofen in Tyrol; in Blasenräumen und Klüften von

Mandelsteinen: Thetis bei Klausen in Tyrol, Geisser-Alpe, Edinburg, Norheim bei Kreuznach; New-Jersey.

2) Botryolith.

Syn. Faser-Datolith. Ch. boratée siliceuse concrétionnée mamelonnée.

Klein nierenförmig, kugelig, traubig. Als Ueberzug auf Kalkspath. Textur: feinfaserig. Durchscheinend bis undurchsichtig. Schwachglänzend, matt. Weiß, aschgrau, rosen- und fleischroth; zuweilen wechseln mehrere Farben in dünnen Streifen.

Auf Magneteisen-Lagern im Gneiß, begleitet von Kalkspath, Quarz, Eisenkies u. s. w. zu Arendal.

69. Apophyllit.




Syn. Ichthyophthalm. Albin. Pyramidaler Kupfenspath. Apophyllite.

Kernform: gerade quadratische Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) enteckt Fig. 84, zuweilen bis zur Schärfung über den Randkanten oder über diesen und den Seitenkanten zugleich, Fig. 85.; 3) enteckt zur Spizung über P. 4) enteckt z. Versch. der Seitenflächen; 5) enteckt z. Versch. der Kernflächen; 6) enteckt und entrandet; 7) enteckt und entseitet; 8) enteckt zur Schärfung über P. und zweifach entseitet Fig. 86.

Fig. 84.

Fig. 85.

Fig. 86.



Krystalle, glatt, seltener gestreift, einzeln auf- oder durcheinander gewachsen, zu Drusen verbunden; krystallinische Massen.

Vollkommen spaltbar parallel den Endflächen. Bruch: muschelrig, uneben. Härte = 4,5. Sehr spröde. Spec. Gew. = 2,33. — 2,50. Durchsichtig bis durchscheinend. Glas- und Perlmutterglanz. Wasserhell, weiß; gräulich-, gelblich-, grünlich-, röthlichweiß; rosen- und fleischroth; braunlich; grünlich. Strich: weiß.

B. d. L. wird er sogleich matt, bläht sich auf und schmilzt

zu einem klaren, farblosen oder weissen Glase. Mit Borax zur wasserhellen Perle. Im Kolben Wasser gebend. Das Pulver wird von Salzsäure sehr leicht zerlegt und scheidet die Kiesel-erde als schleimigen Rückstand ab (v. Kobell). Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kiesel-erde	51,0
Kalk-erde .	26,4
Kali.....	5,6
Wasser...	17,0
	<hr/> 100,0

In den Blasenräumen von Mandelsteinen, basaltischer und phonolithischer Felsarten: Geisseralpe in Tyrol; Auffig in Böhmen; Insel Skye; Hestöde, Naalsöde, Waagöde u. a. Färöer; Grönland; in körnigem Kalk: Drawicza und Eziklowa in Ungarn; auf Magneteisen-Lagern: Utöa; Norweger; auf Gängen mit Kalkspath, Quarz u. Grube Samson zu Andreasberg am Harz.

70. Pektolith.

Derbe, faserige und schmalstrahlige Massen, die sehr viel Aehnliches mit Mesolith zeigen.

Härte = 5. Wenig spröde, schwer zu pulverisiren. Spec. Gew. = 2,69. An den Kanten durchscheinend. Schwacher Perlmutterglanz. Weiss ins Gelbliche und Grauliche.

V. d. L. leicht, unter Entwicklung einiger Luftblasen, zu einem weissen, durchscheinenden, emailartigen Glase schmelzend; im Kolben wenig Wasser gebend. Das Pulver wird durch Salzsäure leicht zerlegt und hinterlässt Flocken von Kiesel-erde, ohne eine Gallerte zu bilden. Nach dem Glühen wird er spröde und bildet mit Salzsäure eine Gallerte. Chem. Zusamm. nach v. Kobell.

Kiesel-erde	52,34
Kalk-erde .	35,20
Natron..	9,66
Wasser ..	2,80
	<hr/> 100,00

Bei der Analyse ergab sich noch etwas Kali, Thonerde und Eisenoryd.


Findet sich mit Mesotyp im Mandelstein des Monte-Balbo; eingewachsen in krystallinischem Feldspath am Montzoni im Fassathal.

71. Andalusit.

Syn. Micaphyllit. Prismatischer Andalusit. Feldspath apyre.

Fig. 87.

Kernform; gerade rhombische Säule.
 $M \parallel M = 91^{\circ} 32' 56''$ und $88^{\circ} 27' 4''$. Vor-
 kommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entspitz-
 eckt, Fig. 87.; 3) entstumpfeckt; 4) enteckt; 5)
 entspitzeckt und entstumpfecktet; 6) beßgleichen und
 entstumpfeckt u. s. w.



Krystalle, verlängert in der Richtung der Hauptaxe, mit
 rauher, auch mit Glimmer bekleideter Oberfläche, ein- oder aufge-
 wachsen, zuweilen stängelich gruppiert, derb mit körniger oder stän-
 geliger Textur.

Spaltbar parallel den Kernflächen, am deutlichsten mit den
 M-Flächen. Bruch: uneben körnig oder splitterig. Härte = 7,5.
 Spröbde. Spec. Gew. = 3,1 — 3,2. Durchscheinend, meist nur an
 den Kanten. Schwacher Glasglanz. Fleisch- oder pfirsichblüthroth,
 perl- und aschgrau; violett, röthlichbraun. Strich: weiß.

B. d. L. für sich unschmelzbar; mit Borax sehr schwierig zu
 klarem Glase. Von Schwefelsäure wird er zwar angegriffen,
 aber nur unvollkommen zerlegt. Chem. Zusamm.

nach L. Gmelin: Analyse von Bucholz:

Kieseelerde	38,5	36,5
Thonerde	61,5	60,5
	Eisenoxyd	4,0
100,0	101,0	

Bauquelin fand 8, Brandes 2 p.c. Kali im Andalusit.


In Granit: Eisens in Tyrol, Banffshire in Schottland, Elba,
 Nord-Amerika; in Gneiß: Herzogau in der Oberpfalz, Iglau in
 Mähren, Aberdenshire in Schottland; in Glimmerschiefer: Frei-
 berg in Sachsen, Landeck in Schlessen, Dartmoor in Devonshire,
 Wicklow in Irland, Insel Unst, u. s. w.

72. Chiasolith.

Syn. Hohlspath. Macle.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M \parallel M = 91^{\circ}$
 $56'$ und $88^{\circ} 10'$.

Fig. 88.



Nur in eingewachsenen Krystallen der Kernform, sehr in die Länge gezogen; in der Mitte des Krystalls in der Richtung der Hauptaxe eine rhombische Höhlung, deren Seiten parallel den Krystall-Seiten laufen, und die mit der Masse des umgebenden Gesteins ausgefüllt ist; von dieser Ausfüllung laufen oft vier dünne Lamellen derselben Substanz nach den Ecken der Säule hin; hier bilden sich dann zuweilen wieder rhombische Ausfüllungen, wie Fig. 88. zeigt.

Spaltbar parallel den Kernflächen, nach den beiden Diagonalen der P-Flächen und in der Richtung der Entstumpfung. Bruch: unvollkommen muschelig ins Splitterige. Härte = 5 — 5,5. Spec. Gew. = 2,94. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Außen schwacher Fettglanz, auf Bruchflächen Glasglanz. Graulich-, gelblich-, röthlichweiß, gelb, grau.

B. d. L. für sich unschmelzbar, aber weiß werdend; mit Borax, selbst als Pulver, sehr schwer zu einem klaren Glase. Von Soda wird er zerlegt und schwillt an, aber schmilzt und verschläckt sich nicht. Chemischer Gehalt nach der Analyse von Landgrebe:

Kieselerde...	68,497
Thonerde...	30,109
Bittererde...	1,125
Wasser und Kohlenstoff	0,269
	<u>100,000</u>

In Thonschiefer: St. Jago die Compostella in Spanien; Bretagne; Gestein im Fichtelgebirge; Friedensfels in der Oberpfalz; Greifenhagen am Harz; Gegend von Badenbaden; Luchow- und Gistain-Thal in den Pyreniden; Irland; Portugall; Nordamerika; im Dolomit am Simplon; in grauem, dichtem Kalk-Steinbau in den Pyreniden u.


73. Disthen.

Syn. Rhanit. Rhätizit. Prismatischer Disthenspath. Cyanite.

Kernform: schiefe rhomboidische Säule. $P||T = 106^{\circ} 55'$ und $73^{\circ} 5'$; $P||M = 93^{\circ}$ und 78° . $M||P = 106^{\circ} 6'$ und

Fig. 89.

75° 54'. Vorkommende Gestalten: 1) entschärftseitig (Fig. 89. ohne die Fläche 1); 2) entseitigt Fig. 89.; 3) Zwillinge aus den ebenangeführten Varietäten, und zwar sehr häufig. Die Vereinigung beider Individuen mit der T-Fläche.



Krystalle, stets in der Richtung der Hauptaxe in die Länge gezogen, gekrümmt, oft mit horizontal oder vertikal gestreiften Seitenflächen, eingewachsen; krystallinische Massen mit blätteriger, strahliger oder faseriger Textur, oft sternförmig auseinanderlaufend.

Sehr vollkommen spaltbar parallel T., minder vollkommen nach M, unvollkommen nach P. Bruch: uneben. Härte = 5 — 7 verschieden auf verschiedenen Flächen. Spröde. Die Krystalle lassen sich biegen, ohne zu zerbrechen. Spec. Gew. = 3,5 — 3,7. Glas: auch Perlmutterglanz. Berliner-, himmelblau und seladongrün, milch-, blaulich, graulich oder gelblichweiß; ocker gelb, ziegelroth, blaulichgrau und graulichschwarz. Strich: weiß. Erwärmte Bruchstücke phosphoresziren mit blaulichem Lichte.

B. d. L. für sich unschmelzbar; bei strengem Feuer weiß werdend; mit Borax schwer aber vollkommen zu klarem, farblosen Glase auflösbar. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusamm.

nach L. Gmelin: Analyse von Arfvedson.

Kieselerde	32	36
Thonerde	68	64
	<hr/> 100	<hr/> 100

Zuweilen mit etwas Kalk und Eisenoryd verunreinigt.

Eingewachsen in Glimmer, Thon, Talkschiefer, auch in Granat, begleitet von Staurolith (oft mit diesem verwachsen), Turmalin, Quarz, Granat u. s. w. Gotthard, Campo-longo, Simplon u. a. D. der Schweiz; Grainer und Pfitsch in Tyrol; Kältenhof in Steyermark; Saualpe in Kärnten; Gängerhof bei Karlsbad; Penig in Sachsen; Cardoso in Spanien; Miasz; Pensylvanien u. s. w.

In Frankreich und Spanien hat man ihn zu Ring- und Nabelsteinen verarbeitet.

Der Fibrolit, Buchholzit und Faserkiesel gehören hierher; sie sind nach Fuchs Gemenge von feinfaserigem

Dithen und Quarz, daher auch das geringere specifische Gewicht von 3,1 — 3,25. — Als Geschiebe zu Belmaru und Schüttenhofen in Böhmen, Ostindien; sehr zu Rhens in Tyrol, Freiberg, Bodenmais in Baiern, Weissenburg in Mähren.

74. Sillimanit.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M||M=93$ und 87 . $P||M=113$. Es kommen zweifache Entneben- und Entmittelseitungen vor.

Krystalle, sehr in die Länge gezogen, gestreift, eingewachsen, gebogen oder gewunden, zerbrochen und durch Quarz wieder zusammengesittet; krystallinische Massen, büschelweise zusammengehäuft. Textur: blätterig, zuweilen auch faserig.

Spaltbar sehr vollkommen nach den P- und den Entneben-seitungs-Flächen. Bruch: splitterig. Härte = 6,5 — 7. Spröde. Spec. Gew. = 3,41. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Fettglanz; auf Bruchflächen Glasglanz. Wasserhell; gewöhnlich aber gefärbt; nelfenbraun, grau, gelblichweiß. Strich: weiß.

B. d. L. für sich unschmelzbar. Durch Soda wird er nur theilweise angegriffen, und schmilzt damit zu undurchsichtigem Glase. Säuren ohne Wirkung. Chem. Gehalt nach Brown's Analyse:

Kiesel..... 42,666

Thon..... 54,111

Eisenoxyd.. 1,999

Wasser.... 0,510

99,286

Auf Quarz-Gängen im Gneise bei Saybrook in Connecticut.

75. Wörthit.

Krystallinische Massen mit blätteriger Textur.

Härte = 7,5. Spec. Gew. = 3, durchscheinend. Perlmutterglanz. Weiß.

B. d. L. mit Borax auflöslich. Im Kolben undurchsichtig werdend und Wasser gebend. Soda greift ihn unter Aufbrausen an, aber die Perle schmilzt selbst im stärksten Feuer nicht. Mit

Als Gerölle, wahrscheinlich aus Finland oder Schweden abstammend.

76. Tripel.

Syn. Argile tripoléenne.

Derbe Massen.

Bruch: muschelig bis erdig. Härte = 2,5. Spec. Gew. = 2,02. Undurchsichtig. Matt. Gelblichgrau, weiß, gelb. Strich: weiß. Fühlt sich mager an.

B. d. L. für sich unschmelzbar, brennt sich weiß; von Borax wird er langsam aufgelöst. Chem. Gehalt

nach Bucholz: nach Deudant:

Kieselerde....	81,00	90
Thonerde.....	1,50	7
Eisenoryd.....	8,00	3
Wasser.....	4,55	
Schwefelsäure..	3,45	
	<u>98,50</u>	<u>100</u>

Bildet Lagen im Flöz-Gebirge und im Diluvium: Amberg in Baiern; Weissenberg bei Prag; Sonneburg in Sachsen; Ungarn; Frankreich; Derbyshire; Korsu u. s. w.

Er wird vorzüglich zum Poliren der Metalle und Steine verwendet; ferner zum Putzen von messingenen und vergoldeten Sachen; zu Formen beim Gießen kleiner Metallgegenstände.

77. Cimolite.

Syn. Argile cimolite.

Derb.

Bruch: erdig. Sehr weich. Spec. Gew. = 2,18. Undurchsichtig. Matt. Graulichweiß, röthlich. Strich: weiß; etwas Glanz hervorbringend. Stark an der feuchten Lippe hängend.

B. d. L. unschmelzbar. Löst sich in Wasser auf; Del leicht einsaugend. Chem. Gehalt nach Klaproth:

Kiesel.....	63,00
Thon.....	23,00
Wasser.....	12,00
Eisenoryd..	<u>1,25</u>
	<u>99,25</u>

Findet sich auf der Insel Argentiera (Simosis der Alten) im griechischen Archipelagus.

Wird zum Reinigen der Zeug- und Kleidungsstücke, so wie zum Ausmachen der Fettflecken verwendet.

78. Bol.

Syn. Lemnische Erde. Bole.

Derb, eingesprengt, als Ueberzug.

Bruch: muschelig. Härte = 2,5. Spec. Gew. = 1,90 — 2,05.

An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Matt bis fettglänzend. Gelblichbraun, röthlichbraun, isabellgelb. Strich: lichte gelblichbraun. An der feuchten Lippe hängend. Fett anzufühlen.

B. d. L. sich hart brennend ohne zu fließen; auf Kohle unter Aufblähen zur dunkelgelben emailartigen Masse; mit Borax und Phosphorsalz zu klarem, durchsichtigem, farblosem Glase. In Wasser zerpringend und nach und nach zu Pulver zerfallend. In kochender Salzsäure theilweise lösbar. Chem. Gehalt des Bole von Ettingshausen (a) und vom Cap de Prudelles (b) nach Löwig:

	a	b
Kieselerde	42,00	41,05
Thonerde	24,04	25,03
Wasser ..	24,03	24,02
Eisenoxyd	10,03	8,09
Bittererde	0,43	0,50
Kalk	0,52	0,45
	101,05	99,14

Findet sich in Bacte und Basalttuff, Klüfte ausfüllend. Hahnbüschelwald und Gegend von Marburg in Hessen; Säsebühl bei Göttingen in Hannover, Striegau in Schlessen, Scheibenberg in Sachsen u. s. w. Manche Bole sind entschieden nichts anders als Kontak-Produkte basaltischer Gesteine mit Granit (Cap de Prudelles unfern Clermont), mit buntem Sandstein (Wildenstein bei Böttingen) u. s. w. (v. Leonhard: Basalt-Gebilde II. Abth. pg. 278. 354. 423 ff.)

Breithaupt's Pinguit ist ein Bol.

Früher wurde der Bol als Arzeneimittel angewendet; der

von Siena wird zur Farbe für braune Kupferstich-Abdrücke gebraucht. Auch zur Glasur für irdenes Geschirre benutzt man ihn.

79. Steinmark.

Syn. Terra miraculosa Saxoniae. Argile lithomarge.

Derb, kugelig, eingesprengt, als Ueberzug. Pseudomorphische Krystalle nach Feldspath-Formen.

Bruch: eben ins Groß- und Flachmuschelige. Härte = 2,5. Spec. Gew. = 2,2. Undurchsichtig. Matt. Gelblich, graulich, röthlichweiß, grau, blaulich, fleischroth, ockergelb. Strich: lichte gelblichweiß. Stark an der feuchten Lippe hängend. Fett anzufühlen.

B. d. L. unschmelzbar, sich weiß brennend. Im Wasser keine Aenderung erleidend. Chem. Gehalt des Steinmarks von Rochlitz (a) und von Flachsenfeifen (b) nach Klaproth:

a	b
Kieselerde 45,25	58
Thonerde 36,50	32
Wasser.. 14,00	7
Eisenoxyd 2,75	2
98,50	99

Mit einer Spur von Kali.

Schmale Gänge, Adern, Kluftflächen oder Blasenräume in verschiedenen Gebirgsgesteinen erfüllend. Eckartsberg bei Breisach in Baden; Rochlitz in Sachsen; Embs in Nassau; Harz; Baiern; England &c.

Wird als Polirmittel für weiche Steinarten benutzt.

80. Halloisit.

Knollige und nierenförmige Massen.

Bruch: muschelrig. Sehr weich, läßt sich mit dem Fingernagel ritzen. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Matt. Weiß, blaulich oder gelblichgrau. Strich: weiß. Stark an der feuchten Lippe hängend. Fühlt sich fett an.

B. d. L. brennt er sich weiß und hart, ohne zu schmelzen. Kleine Stücke in Wasser gebracht werden durchsichtig. Schwefelsäure greift ihn an, und scheidet eine Gallerte ab. Chem. Gehalt nach P. Berthier:

Kieselerde 47,0

Thonerde. 39,3

Wasser .. 13,7

100,0

Findet sich bei Anglure unfern Lüttich in einem Stocke im Uebergangskalk, der Eisen-, Zink- und Bleierze führt.

81. Bergseife.

Syn. Bodseife. Savon de montagne. Mountain-Soap.

Verb.

Bruch: uneben bis erdig. Weich. Undurchsichtig. Matt. Bräunlichschwarz. Strich bringt Fettglanz hervor. Schreibt. An der feuchten Lippe hängend. Fett anzufühlen.

Fährt im Wasser mit Knistern auseinander und wird zähe. Chem. Gehalt nach.

Bucholz:

nach Ficinus:

Kieselerde 44,0

23,3

Thonerde 26,5

16,0

Wasser .. 20,5

43,0

Eisenoxyd 8,0

10,3

Kalkerde. 0,5

1,1

Kalkerde 3,1

Manganoxyd 3,1

99,5

99,9

Findet sich in Lagen mit Thon und Lehm wechselnd: Thüringerwald; Habichtswald; Bilitz in Böhmen; Miedziana-Gora in Polen; Schottland u. s. w.

Wird zum Waschen grober Zeuge gebraucht.

82. Pholerit.

Kleine, konvexe schuppige Theile, als Ueberzug.

Zerreiblich. Durchscheinend an den Ranten. Schwach perlmutterglänzend. Weiß, blaulich, gelblichweiß. An der feuchten Lippe hängend. Weich anzufühlen.

B. d. L. unschmelzbar. Im Kolben Wasser gebend, ohne sich zu verändern. Unlösbar in verdünnter Salzsäure. Chem. Gehalt nach J. Guillemin:

Kieselerde 40,750

Thonerde 43,887

Wasser .. 15,364

100,000

Im Kohlen-Gebiete von Fins im Allier-Departement; Gegend von Mons; auf Kohlensandstein: Bal' du Benoit in der Provinz Lüttich.

83. Kaolin.

Syn. Porzellanerde. Feldspath decomposé. Argile kaolin. Porcelain-Earth.

Derbe Massen, aus erdigen, staubartigen Theilchen, mehr oder minder fest verbunden, bestehend.

Zerreiblich. Spec. Gew. = 2,24. Undurchsichtig. Matt. Weiß ins Gelbliche, Blauliche und Röthliche. Hängt wenig an der feuchtesten Lippe an.

B. d. L. unschmelzbar, mit Borax zu weißem durchscheinenden Glase. Chem. Gehalt des Kaolins von Limoges (a) nach Bauquelin, von Passau (b) nach Fuchs und von Aue (c) nach Kühn:

	a	b	c
Kieselerde	55,00	43,65	47,645
Thonerde	27,00	35,93	35,972
Wasser ..	14,00	18,50	13,181
Eisenoxyd	0,50	1,00	
Kalk	2,00	0,88	1,570
Kali, Magnesia, Schwefelsäure			
u. Verlust.			1,632
	98,50	99,91	100,000

Berthier fand in dem Kaolin von St. Vrieux bei zwei verschiedenen Analysen 2,5 und 8,2 p.c. Kali.

Auf lagerähnlichen Räumen im Granit: Aue bei Schneeberg in Sachsen; Passau in Baiern; St. Vrieux bei Limoges in Frankreich; Ungarn; Bornholm, Irland; England; Rußland; China; Japan u. s. w.

Es bestehen verschiedene Ansichten über die Bildungsweise des Kaolins; am herrschendsten ist die seiner Entstehung aus Feldspath, welche durch die Thatsache unterstützt wird, daß man an mehreren Orten Feldspath vom frischesten Zustande bis zu Kao-

lin, alle Grade der Verwitterung zeigend, beobachtete; selbst Feldspath-Krystalle zu Kaolin umgewandelt wurden gefunden.

Er wird zur Fabrikation des Porzellans verwendet, dessen Haupt-Bestandtheil er ausmacht.

84. Allophan.

Syn. Allophane.

Nierenförmig, traubig, stalaktitisch, derb, als Ueberzug, eingeprengt.

Nach Ha u y Spuren von Spaltbarkeit parallel den Flächen einer geraden rhombischen Säule. Bruch: muschel. Härte = 2,5. Spec. Gew. = 1,88. Halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Ranten, zuweilen ausgezeichneter Perlmutterglanz. Himmelblau ins Spangrüne, braun, roth, gelb, weiß in verschiedenen Nuancen, auch gefleckt oder geadert.

B. d. L. unschmelzbar, oder nur oberflächlich sich mit einer dünnen Email-Decke überkleidend, aber Farbe und Durchsichtigkeit einbüßend. Die Flamme schön grün färbend. Im Kolben viel Wasser gebend. Mit Borax schwierig zu einem wasserhellen Glase. Mit Säuern, unter schwachem Aufbrausen, gelatinirend und beinahe vollkommen darin auflösbar. Chem. Gehalt nach

Walchner:	Guillemin:
Kieselerde . 24,109	23,76
Thonerde. . 38,763	39,68
Wasser ... 35,754	35,74
Kupferoxyd 2,328	0,65
100,954	99,83

Als Ausfüllungs- und Ueberkleidungs-Masse unregelmäßiger Räume auf Eisen- und Kupfererz-Lagern. Gräfenenthal bei Saalfeld; Schneeberg; Bettler in Ungarn; Stippanau in Mähren; Freyenstein in Steyermark; Miedziana-Gora in Polen; Gersbach im Schwarzwalde; Fermi in Frankreich.

Der Allophan scheint ein secundäres Erzeugniß, dessen Bildung immer noch fortbauert.

85. Kollirit.

Syn. Alumine hydratée silicifère. Collirite.

Derb, nierenförmig, als Ueberzug.

Bruch: feinerdig ins Ebene und Flachmuschelige Härte = 1,0 — 2,0. Unburchsichtig. Matt. Schnee- und gelblichweiß, röthlich, grünlich. Strich: weiß und wenig glänzend. Sehr stark an der feuchten Lippe hängend. Fett anzufühlen.

B. h. L. unschmelzbar. Im Kolben Wasser gebend. Saugt Wasser ein, wird durchscheinend und zerspringt. Lösbar in Schwefelsäure; die Solution beim Abdampfen gelatinirend und Kiesel-erde absetzend. Chem. Gehalt des Kalkhytts von Schemnitz nach Klaproth und des von Ezquerro nach Berthier:

Kieselerde 14	15,0
Thonerde 45	44,5
Wasser... 42	40,5
101	100,0

Auf einem Gang im Sandstein bei Weissenfels in Sachsen; auf Gängen im Trachyt zu Schemnitz in Ungarn; auf Trümmern und Blasenräumen in Wacke zu Laubach in der Wetterau; als Ueberzug auf eisenhaltigem Quarz-Gestein am Berg Ezquerro in den Pyrenäen.

86. Topas.



Syn. Topase. Alumine fluatée siliceuse. Topaz.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M \parallel M = 124^\circ 19'$ und $55^\circ 41'$. Unter die am häufigsten vorkommenden Gestalten gehören: 1) zweifach entschärft (l) und entrandet zur Spitze (o), Fig. 90.; 2) zweifach entschärft, entrandet und entspißet (n) (eine Gestalt wie Fig. 91.; nur daß noch ein Ueberrest von P vorhanden ist); 3) zweifach entschärft, entrandet und entspißet zur Schärung über P., Fig. 91.; 4) zweifach entschärft (l), zweifach entrandet (o und s) und entspißet (n), Fig. 92.; 5) zweifach entschärft, zweifach entrandet

Fig. 90.

Fig. 91.

Fig. 92.



det und zweifach entspizt; 6) vierfach entspizt, entrandet und entspizt n. s. w.

Nr. 1. vorzüglich aus Brasilien, 2 und 3 aus Sibirien, 4 5 und 6 aus Sachsen.

Krysalte, auf den Flächen n und P meist sehr glatt, die andern rauh oder gestreift, krySTALLINISCHE Massen. mit blättriger Textur, stängelich. Verb.

Spalbar parallel den Kern- und den n-Flächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 8. Spröde. Spec. Gew. = 2,49 — 2,56. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz. Wasserhell, weiß, gelb, blau, grün. Strich: weiß. In Bruchstücken oder als Pulver erwärmt, mit blaulichem, gelblichem oder grünlichem Scheine phosphoreszirend. Durch Reiben oder Druck elektrisch, durch Erwärmen nach Haup selbst polarisch-elektrisch werdend.

B. d. L. für sich und auf Kohle unschmelzbar; der gelbe sich rosenroth brennend; mit Borax langsam zu klarem Glase; mit Phosphorsalz unter Hinterlassung eines Kieselsceletts zur klaren Glasperle, die beim Erkalten opalisirt. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde.. 34,2

Thonerde.. 54,5

Flußsäure.. 11,5

100,0

Arten:

1) Topas.

Krysalte, einzeln ein- oder aufgewachsen, auch zu Drusen verbunden; krySTALLINISCHE Massen, eingesprengt, stumpfeckige Stücke und Geschiebe. Durchsichtig bis durchscheinend. Starker Glasglanz. Wasserhell, grünlich-, gelblich-, graulichweiß; schwefel-, stroh-, wein-, pomeranzengelb, hyazinthroth; berg- und seladongrün.

Als wesentlicher Gemengtheil des Topasfels: Schneckenstein bei Auerbach im Voigtlande Sachsens; neßerweise oder auf Gängen in verschiedenen Gebirgsarten, Geyer, Ehrenfriedersdorf, Altenberg, Schlaggenwalde im Erzgebirge; Hirschberg in Schlesien; Rhadisto in Mähren; St. Agnes in Cornwall; Mursinsk, Miasok, Oden-Tschelon in Sibirien; Villa-ricca in Brasilien; in losen

Krystallen und Geschieben im Alluvium: Aberdeenshire, Elbenstock in Sachsen; Kamtschatka; Brasilien; in Auswürflingen des Vesuvius (hier rosenroth, ganz ähnlich den Topasen, welche diese Farbe künstlich durch Einwirkung des Feuers erhalten).

Der Topas wird vorzüglich, da er ein beliebter Edelstein ist, zu Ring- und Nadelsteinen, zu Ohrgehängen, Petschaften, Solliers und dergleichen Gegenständen des Schmucks mehr verwendet; die unbrauchbaren Topasstücke werden gepulvert zum Schleifen weicherer Steinarten benutzt.

2) Pyrophysalith.

Syn. Physalith. Topase prismatoide.

Krystalle, groß und undeutlich, mit rauhen Oberflächen, verb. An den Kanten durchscheinend. Schwacher Glasglanz. Weiß, gelblich, grünlichweiß.

In Granit eingewachsen: Finbo und Broddbo bei Fahlun in Schweden.

3) Pyknit.

Syn. Topase cylindroide.

Langstängeliche Säulen, sehr selten einzeln, fast immer zu bündelförmigen Aggregaten gruppiert; gestreift; durchscheinend. Strohgelb, gelblich- oder röthlichweiß, perlgrau, graulichweiß.

Eingewachsen in einem, aus Quarz und Glimmer bestehenden Gestein der Zinnerz-Lagerstätten von Altenberg und Schlaggenwalde im Erzgebirge.

87. Feldspath.

Syn. Prismatischer Feldspath. Orthoklas. Orthose. Felspar.

Fig. 93.

Kernform: schiefe rhomboidische Säule $M \parallel P = 90^\circ$; $M \parallel T = 120^\circ$; $P \parallel T = 68^\circ 20'$ (ähnlich Fig. 19. pg. 22). Von den vielen, meist sehr verwickelten Combinationen, erscheinen folgende mitunter ziemlich häufig: 1) entschärft; 2) dergleichen zum Verschwinden der M-Flächen, Fig. 93; 3) entschärft (1) und zweireihig entspißet (x)




Fig. 94.; 4) beßgl. zum Verschw. der *M*-Flächen, **Fig. 95.**; 5) Einreihig entspißect (*y*) z. Verschw. der *T*-Flächen, **Fig. 96.**; 6) einreihig entspißect und entschärfseitig; 7) einreihig entspißect (*y*), zweifach entschärfseitig (*l* und *z*) und entstumpfsseitig (*t*), **Fig. 97.**; 8) verschiedene Arten von Zwillingen, z. B. der Varietät einreihig entspißect und entschärfseitig, **Fig. 98.**

Fig. 94.

Fig. 95.

Fig. 96.







Fig. 97.

Fig. 98.



Krystalle, deren Seitenflächen theils vertikal gestreift, theils glatt oder rauh sind, die anderen Flächen horizontal gestreift; krystallinische Massen. Dicht.

Sehr vollkommen spaltbar parallel den *P*-Flächen, minder deutlich nach den *M*-Flächen, unvollkommen nach *T*. Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 6. Spröde. Spec. Gew. = 2,55 bis 2,59. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz, zuweilen perlmutterartig. Wasserhell. Weiß, roth, grün in verschiedenen Nüancen.

B. d. L. auf Kohle wird er in gutem Feuer glasig, halbdurchsichtig, weiß und schmilzt schwer an den Ranten zu einem halbklaaren bläulichen Glase; mit Borax langsam und ohne Brausen zu einem klaren Glase, mit Soda langsam und unter Brausen zu einem sehr schwer schmelzbaren klaren Glase auflösbar. Säuern ohne merkbare Wirkung. Chem. Zusammens. nach L. Gmelin:

Rieselerde	66,0
Thonerde	17,5
Kali	16,5
	<hr/>
	100,0

Zuweilen mit etwas Kalkerde und Eisenoryd verunreinigt; auch Wasser enthalten manche, wohl aber nur in Verwitterung begriffene Feldspath.

Arten:

1) Adular.

Syn. Opalifirender Feldspath. Feldspath nacré. Adularo.

Krystalle, häufig in den Formen Fig. 93. und Fig. 95.; meist aufgewachsen und mannigfach gruppirt; krystallinische Massen und stumpfedicke Stücke. Starker perlmutterartiger Glasglanz. Durchsichtig bis durchscheinend. Wasserhell, graulich-, blaulich-, grünlich-, gelblichweiß; zuweilen mit innerem Perlmutterschein (Mondstein).

Auf Gängen und Drusenräumen in Granit und Gneiß begleitet von Bergkrystall, Chlorit (dieser die Krystalle häufig überziehend und durchdringend), Epidot, Kalkspath zc. in den Alpen der Schweiz (namentlich am St. Gotthard), Tyrols, Salzburgs; zu Disans in der Daphinée; Arendal; Ekatharinenburg in Sibirien; Elba; Grönland u. s. w.

Die Varietät des Adulars, welche man Mondstein nennt, wird zu Ring- und Nadelsteinen und anderen kleinen Bijouteriewaaren verarbeitet.

2) Gemeiner Feldspath.

Krystalle, namentlich in den Formen Fig. 95. und Fig. 97. häufig Zwillingsskrystalle, meist eingewachsen und dann mit rauher Oberfläche; krystallinische Massen, verb. eingesprengt in Gesteinen. Durchscheinend. Schnee- bis graulichweiß, fleischroth; span-, seladon-, berg-, apfel-, grasgrün (Amazonenstein); blaulich-, rauch-, gelblich- und aschgrau; zuweilen mit buntem Farbenspiel, oder mit innerem Perlmutterschein.

Sehr verbreitet und wichtig als wesentlicher Gemengtheil vieler Felsarten, wie des Granits, Gneißes, Syenits zc., auf Gängen und in Drusenräumen, eingewachsen in Porphyr und

Porphyr und Granit. Als Fundorte ausgezeichnete Varietäten sind bekannt: Karlsbad in Böhmen, Bischofsheim im Fichtelgebirge; Elba; Baveno in Italien; St. Gotthard; Friedrikswärn, Utön und Bisperg in Schweden; Arendal; Helsingfors in Finland; Sibirien u. s. w.

Die grüne Feldspathe, sowie die mit buntem Farbenspiele, werden zu Ringsteinen, Dosen u. dergl. verarbeitet. Die verben Massen gebraucht man als Zusatz beim Porzellan, zur Glasurmasse für Töpfergeschirre u. s. w.

3) Glasiger Feldspath.

Syn. Riakolith. Eispath. Feldspath vitreux. Glassy Felspar.

Krytalle, häufig in der Form Fig. 96., einzeln ein- oder durcheinander gewachsen, und krystallinische Massen, durch vulkanische Einwirkung glasig und rissig geworden. Bruch: muschelig. Durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Glasglanz. Wasserhell, graulich, gelblichweiß; durch Eisenoryd roth.

Eingewachsen in Laven, Trachyt, Bimsstein. Vesuv; Ischia; Aetna; Montbore in Auvergne; Drachensfels im Siebengebirge; Laacher-See; Kaiserstuhl im Breisgau; Gleichenberg in Steyermark; Ungarn u. s. w.

4) Feldstein.

Syn. Dichter Feldspath. Felsit. Feldspath compact. Compact Felspar.

Verb. Bruch: splitterig. Durchscheinend an den Kanten schimmernd oder matt. Weiß, grau, grün, roth; meist unrein.

Die Grundmasse mancher Felsarten, wie von Porphyr, Phonolith, oder einen wesentlichen Gemengtheil einiger andern ausmachend.

88. Leuzit.

Syn. Trapezoidaler Kuphonspath. Amphygene. Leucite.

Kernform: Würfel. Die einzige bis jetzt beobachtete Gestalt ist das Trapezeder, das durch dreifache Entdeckung zum Verschw. der Kernflächen aus dem Würfel abgeleitet wird.

Krytalle, mit rauher Oberfläche, innen häufig wie geborsten,

einzelu eingewachsen, manchmal zu Gruppen verbunden; Körner; selten kleine berbe Massen mit körniger Textur.

Höchst unvollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschel. Härte = 5,5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 2,48 — 2,5. Durchsichtig, bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz, zuweilen fettartig. Wasserhell; asch-, rauch-, gelblich-, röthlich-, blaulichgrau; grau. Graulichweiß. Strich: weiß.

B. d. L. für sich unschmelzbar; mit Borax schwierig zu klarem Glase. Das Pulver in Salzsäure bei anhaltendem Digeriren lösbar mit Hinterlassung eines kieseligen Rückstandes. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin: Analyse von Klaproth:—

Kieselerde 56,4	53,750
Thonerde 22,5	24,625
Kali..... 21,1	21,350
100,0	99,725

Eingewachsen in älteren Laven: Vesuv (Mauro, Pompeji, Somma); Frascati, Tivoli, Albano, Borghetto u. a. O. in der Umgegend von Rom; in Trümmer-Gesteinen und Tuffen: Albano-Gebirge, Rieten unfern des Laacher-Sees; in Dolerit: am Kaiserstuhl im Breisgau.

89. Zweiaxiger Glimmer.

Syn. Glimmer z. Th. Rhomboedrischer Talk-Glimmer zum Theil. Mica zum Theil.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 120^\circ$ und 60° ; $P \parallel M = 98^\circ 40'$ und $71^\circ 20'$. Die vorkommenden Gestalten sind noch nicht hinlänglich bestimmt; es erscheinen meist rhombische oder sechsseitige Säulen, und diese gewöhnlich tafelförmig.

Krystalle, die P-Flächen glatt, selten federartig gestreift, was nach Breithaupt auf eine Zwillingbildung hindeutet, die übrigen gewöhnlich horizontal gestreift, selten einzeln eingewachsen, meist viele tafelförmige Individuen zu einem einzelnen Krystall, oder zu Reihen und fächerartigen Aggregaten verbunden und in Drusen versammelt; krystallinische Massen mit blätteriger Textur, eingewachsen und eingesprengt.

Höchst vollkommen spaltbar parallel den P-Flächen. Bruch: muschel, selten wahrnehmbar. Härte = 2,5. Milde, in dünnen

Blättchen elastisch biegsam. Spec. Gew. = 2,8 — 3,1. Durchsichtig in dünnen Lamellen, durchscheinend, oft nur an den Ranten. Im polarisirten Lichte zeigt er concentrische farbige Ringe, welche von einem dunkeln Striche durchschnitten sind (v. Kobell). Starker metallähnlicher Perlmutterglanz auf den Spaltungs-, Glasglanz auf den andern Flächen. Röthlich-, gelblich-, silber-, grünlich-, graulichweiß; grünlich-, asch-, rauchgrau; braun bis pechschwarz. Strich: weiß, graulich.

B. d. L. verliert er seine Durchsichtigkeit, wird weiß oder grau, spröde und schmilzt an sehr dünnen Ranten zu emailartigem Glase. Im Kolben gibt er etwas Wasser, das deutlich Reaktion von Flußsäure zeigt. Von Borax leicht, unter Brausen, zu einem eisengrünen Glase auflösbar. Weder Salz- noch Schwefelsäure greifen dünne Blättchen merklich an. Chemischer Gehalt des Glimmers von Utön (a), von Broddbo (b) und von Kimito (c) nach den Analysen von H. Rose:

	a	b	c
Kieselerde..	47,50	46,10	46,358
Thonerde...	37,20	31,60	36,800
Eisenoxydul	3,20	8,65	Eisenoxyd 4,533
Kali.....	9,60	8,39	9,220
Manganoxyd	0,90	1,40	0,002
Flußsäure..	0,56	1,12	0,765
Wasser	2,63	1,00	1,840
	<u>101,59</u>	<u>98,26</u>	<u>99,518</u>

Er ist von den Glimmerarten die allgemein verbreitetste, indem er in vielen abnormen Gebirgsarten am häufigsten als wesentlicher Gemengtheil auftritt; Granit, Gneiß, Glimmerschiefer, Thonschiefer u. hilft er bilden. Fundorte ausgezeichnete großblättriger Massen. Zwiesel und Richtplatz bei Aschaffenburg in Bayern, Sibirien, Finland, Grönland u.

Der Glimmer wird da, wo er in großen Tafeln vorkommt, wie namentlich in Sibirien, unter den Namen Fensterglimmer, Marienglas, zu Fensterscheiben verwendet; zermalmt dient er als Streufand u. s. w.

90. Pinit.

Syn. Giesekit. Pyrargyllit.

Kernform: sechsseitige Säule (vielleicht rhombische Säule). Außer der Kernform kommen folgende Gestalten vor: 1) entseitert (s. Fig. 53. pg. 113.); 2) beßgl. und entrandet; 3) entseitert, enteckt und zweifach entrandet.

Krystalle, häufig mit zugerundeten Kanten, mit glatter oder rauher Oberfläche, einzeln ein- oder zu mehreren zusammenge- wachsen, krystallinische Massen.

Spaltbar parallel den Kernflächen, vollkommen mit P. Bruch: uneben ins Splitterige. Härte = 3. Spec. Gew. = 2,54 — 2,78. Undurchsichtig. Schwacher Fettglanz. Grünlich- oder gelblichgrau, röthlich- und schwärzlichbraun; oliven- und schwärzlich-grün, roth durch Eisenocker.

B. d. L. an den Kanten zu weißem blasigem Schmelz; mit Borax schwierig zu durchscheinendem, schwach grün gefärbtem Glase; mit Natron zur schlackenartigen Kugel. Chem. Gehalt:

E. G. Smelin und Stromeyer:

	(Pinit)	(Giesekit)
Kieselerde	55,964	46,07
Thonerde	25,480	33,82
Kali	7,894	6,20
Natron	0,386	
Talk und Manganorydul	3,760	2,35
Eisenoryd	5,512	3,35
	<u>98,996</u>	<u>91,79</u>

Eingewachsen in Granit: St. Parbour, Menat u. a. D. in Auvergne; Heidelberg; Schneeberg in Sachsen; Lancaster in Massachusetts; Helsingfors in Finland u.

91. Bildstein.

Syn. Agalmatholit. Pagodit. Talc glaphique. Steatite-Pagodite. Figure-stone.

Derbe Massen.

Bruch: splitterig. Härte = 2,5. Spec. Gew. = 2,81. Durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Matt oder fettartig-

schimmernd. Grünlich-, gelblich-, perlgrau; Berg-, blgrün; fleisch-
roth; gelb. Strich: weiß. Fett anzufühlen.

B. d. L. brennt er sich weiß, und schmilzt, jedoch sehr schwie-
rig, nur an den dünnsten Ranten zu einem weißen Email. Im
Kolben gibt er Wasser und wird dunkler; mit Borax zu klarem
Glase. Lösbar in erhitzter Schwefelsäure mit kieseligem Rückstand.
Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde 58,1

Thonerde 28,1

Kali 7,8

Wasser .. 6,0

100,0

Weist mit etwas Kalkerde und Eisenoxyd verunreinigt.

Findet sich in China, zu Nagy-Ag und Ehemnitz in Ungarn;
Wales; auf einem Talklager in Glimmerschiefer bei Schwarzen-
berg in Sachsen.

Die Chinesen fertigen die bekannten Pagoden daraus.

92. Obsidian.

Syn. Empirodorer Quarz. Marekanit. Bouteillenstein. Obsidienne.

Derbe Massen, runde und stumpfeckige Stücke, Kugeln und
Körner mit glatter oder zackiger Oberfläche.

Bruch: vollkommen muschelig. Härte = 6 — 7. Spröde.
Spec. Gew. = 2,2 — 2,4. Durchsichtig bis an den Ranten durch-
scheinend. Glasglanz, zuweilen fettartig. Wasserhell, meist aber
schwarz, braunlich-, grünlich- und graulichschwarz, selten grün,
gelb, blau, roth, weiß, oder die Farben in Flecken oder Streifen
wechselnd. Strich: weiß. Manchmal mit eigenthümlichem grünlich-
gelbem Schiller (schillernder Obsidian).

B. d. L. theils schwierig und nur in feinen Splintern, theils
sehr leicht unter starkem Aufschäumen, oder auch leicht und ruhig
zu Glas, schaumiger Masse oder Schmelz fließend. Chem. Zusamm.

nach L. Gmelin: Analyse von Klaproth:

Kieselerde..... 80,8 81,00

Thonerde..... 10,8 9,50

Kali und Natron 8,4 7,20

Kalkerde 0,33

Eisenoxyd 0,60

Wasser 0,50

100,0

99,13

Findet sich als eigenthümliche Gelsmasse, ganze Berge zusammensetzend, auf lagerähnlichen Räumen, in Körnern eingewachsen in Perlstein, oder als Geschiebe. Island; Teneriffa; Ponza-Inseln; Lipari; Volcano; Vesuv (1822); Santorin; Milo; Capo de Gata in Spanien; Carpinien; Val Gana in der Gegend des Euganer Sees; Eperies, Tokay u. v. a. D. in Ungarn; Cerro de las Nevajas in Mexiko; Quito, marekanisches Gebirge im asiatischen Russland u. s. w.

Man verarbeitet den Obsidian zu verschiedenen Gegenständen des Luxus, zu Ohr- und Halsschmuck, zu Vorstecknadeln, Dosen, Rock- und Stockknöpfen u. s. w. Die Römer fertigten schon Spiegel und Gemmen aus ihm. Die Mexikaner und Peruaner machten Messer, Degenklingen, Rasiermesser und andere schneidende Instrumente daraus.

93. Bimsstein.

Syn. Emphyrodoxer Quarz. Ponce. Pumice.

Blasige, durchlöcherter, schwammartige Massen, stumpfecckige oder abgerundete Stücke, oft mit faseriger Textur.

Bruch: kleinschuppig ins Splitterige. Härte = 4,5. Spec. Gew. = 2,19 — 2,2. Durchscheinend an den Kanten. Perlmutterglanz, auf Bruchflächen Glasglanz. Weiß, gelblich, graulich, braunlich-schwarz.

B. d. L. schmelzen manche Bimssteine nur höchst schwierig, andere leicht und unter Aufwallen zu einem weißen Email. Chem. Zusamf. nach L. Gmelin:

Kiesel..... 83,6

Ehon..... 13,7

Kali und Natron 2,7

100,0

In der Umgegend von Vulkanen ganze Ströme bildend; als Auswürfling, ein eigenes Trümmer-Gestein zusammensetzend, eingebacken in Trass, vulkanischen Tuff u. s. w.; Lipari; Volcano; Ponza-Inseln; Ischia; Vesuv; Milo; Bendorf, Brohl u. a. D. in Rhein-Preußen; Schemnitz, Tokay u. a. D. in Ungarn; Auvergne; Island; Teneriffa; Mexiko; Java u. s. w.

Der Bimsstein wird als Schleif- und Polirmittel bei Mar-

mor und Maaßtafer-Arbeiten angewendet, auch bei manchen Edelsteinen, bei verschiedenen Glas-, Holz-, Leder- und Metall-Gegenständen gebraucht man ihn in gleicher Absicht.

94. Perlstein.

Syn. Empyrodorer Quarz z. Theil. Pierre perlée. Pearlstone.

Derbe Massen, zusammengesetzt aus größeren oder kleineren Körnern, die zuweilen konzentrisch-schalig abgesondert erscheinen.

Bruch: kleinmuschelartig. Härte = 6. Spröde. Spec. Gew. = 2,25 — 2,38. An den Kanten durchscheinend. Perlmutter- oder Wachsglanz. Grau, gelb, roth, braun in verschiedenen Nüancen, auch gestreift oder gefleckt.

B. d. L. lebhaft zur weißen, schwammähnlichen Masse sich aufblähend. Chem. Zusamm.

nach L. Gmelin; Analyse von Klaproth.

Kieselerde	76,1	75,25
Thonerde.	13,1	12,00
Kalk.....	6,2	4,50
Wasser...	4,6	4,50
	Kalkerde..	0,50
	Eisenoxyd.	1,60
	100,0	98,35

Findet sich als eigenthümliche Felsmasse: Schemnitz, Tokay, Tellebanya u. a. D. in Ungarn; Euganeen; Ripart; Irland; Mexiko u. s. w.

Der Sphärolith, die rundlichen Körner, welche an mehreren Orten im Pechstein und Perlstein vorkommen, scheint zu letzterem zu gehören.

95. Pechstein.

Syn. Empyrodorer Quarz z. Theil. Petrosilex résinite. Rétinite. Pitchstone.

Derbe Massen, von körniger oder dichter, selten von stänglicher Zusammensetzung.

Bruch: muschelartig ins Splitterige. Härte = 5,5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 2,2. Schwach durchscheinend, meist undurchsichtig. Fettglanz, manchmal zum Glasglanz geneigt. Grau, grün, roth, braun, schwarz, gelb in verschiedenen Nüancen, aber meist unrein.

B. d. L. zu schaumigem Glase oder zu grauem Schmelz. Chem. Zusamm.

nach L. Gmelin:	Analyse von Klaproth:
Kieselerde 75,1	73,00
Thonerde. 14,5	14,50
Natron.. 2,7	1,75
Wasser .. 7,7	8,50
	Kalk..... 1,00
	Eisen u. Manganoryd 1,10
<hr/> 100,0	<hr/> 99,85

Findet sich als eigenthümliche Gebirgsmasse, auch auf gang- oder lagerartigen Räumen in verschiedenen Gesteinen. Meissen, Planitz u. a. O. in Sachsen; Schemnitz, Tokay u. in Ungarn; Auvergne; Ardèche; Euganeen; Arran, Skye, Mull u. a. schottische Inseln; Spanien; Mexiko u. s. w.

Wird zur Trocken-Maurung bei Gärten und Feldern und zum Chausseebau verwendet.

96. Nephelin.

Syn. Sommit. Pseudo-Nephelin. Glaeolith. Fettstein. Rhomboedrischer Feldspath. Néphéline.

Kernform: regelmäßige sechsseitige Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform, am häufigsten; 2) entrandet (s. Fig. 54. pg. 113.); 3) entseitet (s. Fig. 53. pg. 113.).

Krystalle, Oberfläche glatt, oder bekleidet mit einer matten, rauhen, weißlichen oder röthlichen Rinde; einzeln ein- oder aufgewachsen, durcheinander gewachsen und drüsig verbunden; krystallinische Massen mit förniger oder blätteriger Textur.

Spaltbar parallel den Kernflächen, am leichtesten nach den Seitenflächen. Bruch: muschelig. Härte = 5,5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 2,56 — 2,76. Durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Glas- bis Fettglanz. Wasserhell, weiß, graulich-weiß ins Gelb- und Olivengrüne. Strich: weiß.

B. d. L. langsam zu farblosem, durchsichtigem Glase schmelzend; mit Borax zur wasserhellen Perle, mit Natron zu einer beinahe undurchsichtigen Masse. Das Pulver gelatinirt mit erwärmter Salzsäure behandelt. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde 42,4

Thonerde. 33,8

Kali..... 15,9

Natron.. 7,9

100,0

In Drusenhöhlen vulkanischer Auswürflinge und in Laven älterer Eruptionen: Monte-Somma u. a. D. am Vesuv; Gieschi, Plaggie u. a. D. in der Gegend von Rom; Laacher-See. In Klüften eines doleritartigen Gesteins bei Capo di Bove unfern Rom; eingewachsen in Dolerit: Ragenbuckel im Obenwald; eingewachsen in Eyenit (der Elaeolith): Laurusig, Stavern und Friedrichswärn in Schweden.

97. Sodolith.

Syn. Dodekaedrischer Kuphonspath. Sodalite.

Kernform: Rauten-Dodekaeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entoktaederscheitelt; 3) beßgleichen und entkantet.

Krystalle, häufig mit unebenen, gekrümmten Flächen und zugrundeten Kanten, auf- und ineinander; auch einzeln eingewachsen; rundliche Körner; sehr mit körniger Textur.

Vollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 5,5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 2,35 — 2,49. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Schnee-, gräulich-, grünlich-, gelblichweiß; berg- und seladongrün; himmelblau. Strich: weiß.

B. d. L. zu einem blasigen Glase schmelzend, mit Borax zu einem klaren Glase. In Säuren ist er auflöslich und gibt eine Gallerte. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde..... 36,2

Thonerde..... 28,8

Natron..... 27,1

Trockene Salzsäure 7,9

100,0


In Drusenräumen von Auswürflingen alter Eruptionen: Fossa grande am Vesuv; in vulkanischen Gesteinen am Laacher-See; auf einem Lager in Glimmerschiefer am Ragerbluarfuf-Fjord in Grönland.

98. Analzim.

Syn. Hexaedrischer Kuphonspath. Analcime.

Fig. 99.

Kernform: Würfel. Außer diesem kommen noch folgende beide Gestalten vor: 1) dreifach entest in der Richtung der Flächen, Fig. 99.; 2) desgleichen 3. Verschw. der Kernflächen (Trapezeder).



Krytalle, glatt, einzeln eingewachsen, gruppirt; kugelig.

Unvollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: uneben bis unvollkommen muschelig. Härte = 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,0 — 2,2. Durchsichtig bis durchscheinend. Glas- bis Perlmutterglanz. Wasserhell, blaulich-, graulich-, gelblichweiß; fleisch-, korallen- bis blutroth. Strich: weiß.

B. d. L. zu klarem, etwas blasigem Glase schmelzend; mit Borax, selbst als Pulver, schwierig zu klarem Glase, unter Hinterlassung einer undurchsichtigen flockigen Masse, lösbar. Im Kolben Wasser gebend. Das Pulver wird von Salzsäure vollkommen zerlegt und hinterläßt die Kieselerde als schleimigen Rückstand. Chem. Zusamm.

nach L. Gmelin:

Analyse von H. Rose:

Kieselerde	55,9	55,12
Thonerde.	22,3	22,99
Natron ..	14,0	13,53
Wasser ..	7,8	8,27
	<u>100,0</u>	<u>99,91</u>

Findet sich in den Drusenräumen verschiedener Mandelsteine und vulkanischen Gebilde, begleitet von Apophyllit, Mesotyp, Kalkspath, Chabasie etc. Cyklopen-Inseln bei Catania; Aetna; Montechio-maggiore in Vicenza; Seiser-Alpe in Tyrol; Skye u. a. schottische Inseln; Färder; Kaiserstuhl im Breisgau u. s. w.

99. Albit.

Syn. Natron-Feldspath. Tetartin. Kieselspath. Cleavelandite. Siliceous Felspar.

Kernform: schiefe rhomboidische Säule. $P||M=93^{\circ} 36'$ und $86^{\circ} 24'$; $P||T=115^{\circ} 5'$ und $64^{\circ} 55'$; $M||T=62^{\circ} 7'$ und $117^{\circ} 53'$ (G. Rose). Die vorkommenden Gestalten sind meist sehr verwickelt, zu den gewöhnlichsten gehören: 1) entschärfseitig (l), entspitzt (x) und entlängenscharfrandig (o), Fig. 100.; 2) zweifach entschärfseitig, entstumpfsseitig, entspitzt und entlängenscharfrandig. Doch sind einfache Combinationen selten, es kommen meistens Zwillinge vor, wie unter andern Fig. 101.

Fig. 100.





Fig. 101.



Krysalte einzeln auf- oder zu mehreren durcheinander gewachsen, zu Gruppen und Drusen verbunden; krystallinische Massen mit blätteriger oder gebogen strahliger (blumig-blätteriger) Zusammensetzung. Oberfläche theils glatt, theils gestreift.

Spaltbar parallel den Kernflächen, am vollkommensten mit P, minder deutlich nach M und T. Bruch: uneben. Härte = 6, — 6,5. Spec. Gew. = 2,53 — 2,63. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glas-, auf den vollkommenen Spaltungsflächen Perlmutterglanz. Wasserhell; weiß; graulich, gelblich, blaulich, grünlich, röthlichweiß; fleischroth. Strich: weiß.

B. d. L. zu einem blässigen, durchscheinenden Glase fließend; im Uebrigen verhält er sich wie Feldspath. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde 69,8

Thonerde. 18,6

Natron. . 11,6

100,0

Meist etwas Kalkerde beigemengt.

Findet sich als Gemengtheil mancher Granite, auf Gängen oder aufgewachsen auf Feldspath: Arenal; Zell im Zillerthal; Gastein in Salzburg; Disans in der Dauphinée; Barèges in den


Pyrenden; Prudelberg bei Hirschberg in Schlessen; Kerubinsky'sche Grube im Gouvernement Orenburg; Mursinsk im Gouvernement Perm; Baveno; Elba; Siebenlehn und Vorstendorf bei Freiberg; Rimito in Finnland; Finbo und Broddbo in Schweden; Goshen und Chesterfield in Massachusetts u. s. w.

Wird wie der Feldspath angewendet.

100. Periklin.

Fig. 102.

Kernform: schiefe rhomboidische Säule: $P||M=86^{\circ}41'$ und $93^{\circ}49'$; $P||T=114^{\circ}45'$ $65^{\circ}15'$; $M||T=59^{\circ}42'$ und $120^{\circ}18'$ (Breithaupt). Vorkommende Gestalten: 1)



entscharfettet (l) und entspizet (x), Fig. 102.; 2) beßgleichen und entbreitenscharfrandet; 3) Zwillinge aus beiden Varietäten.

Krystalle, meist niedrig, die Flächen P und x vorherrschend, auf- oder zu mehreren zusammengewachsen; krystallinische Massen. Die Seitenflächen oft vertikal gestreift, auch rauh, oder mit Chlorit überzogen.

Spaltbar nach den Flächen der Kernform, am vollkommensten parallel P, etwas weniger nach T, minder vollkommen nach M. Bruch: uneben. Härte = 6. Spec. Gew. = 2,53 — 2,57. Durchscheinend, oft nur an den Kanten. Glas-, auf den Spaltungsflächen von P und T Perlmutterglanz. Weiß; graulich, gelblich, röthlichweiß. Strich: weiß.

B. d. L. schwierig zu blasigem Email schmelzbar; im Uebrigen wie Feldspath sich verhaltend. Chem. Gehalt einer Varietät von Böblitz nach L. Gmelin:

Kieselerde . 67,94

Thonerde.. 18,93

Natron... 9,99

Kali..... 2,41

Kalkerde.. 0,15

Eisenoxydul 0,48

99,90

Auf Gängen und Drüsenräumen in älterem Gebirge: St. Gotthard; Tyrol; Saualpe in Kärnthen; Böhln in Sachsen; als Gemengtheil mancher Feldarten.

101. Petalit.

Syn. Prismatischer Petalinspath. Pétalite.

Krystallinische Massen; verb.

Spaltbar in der Richtung zweier Flächen, die sich unter Winkeln von 142° schneiden, nach einer vollkommener als nach der andern; außerdem noch undeutlicher nach einer dritten. Bruch: uneben ins Splitterige. Härte = 6. Spec. Gew. = 2,44. Durchscheinend. Glasglanz, perlmutterartig auf den Spaltungs-, fettartig auf den Bruchflächen. Milch-, graulich-, grünlich-, röthlichweiß bis rosenroth. Strich: weiß. Durch Erwärmen mit bläulichem, lebhaftem Lichte phosphoreszirend.

B. d. L. zu einem weißen blasigen Email schmelzend, die Flamme schwach purpurroth färbend; im Uebrigen wie Feldspath sich verhaltend. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde 74,1

Thonerde 19,7

Lithion .. 6,2

100,0

Findet sich auf einem Lager im Urgebirge auf der Insel Utö; auch in Gesechieben am Ontariosse in Nordamerika.

102. Triphan.

Syn. Spodumen. Prismatischer Triphanspath.

Kernform: schiefe rhomboidische Säule. $P||M = 108^\circ 50'$ und $71^\circ 10'$; $P||T = 96^\circ$ und 84° ; $M||T = 136^\circ 35'$ und $43^\circ 25'$. Durch Spaltung erhalten beim Triphan von Goshen.

Krystallinische Massen mit blätteriger Textur.

Spaltbar parallel den Flächen der Kernform, am deutlichsten mit T und M; auch parallel der Entschärfung. Bruch: uneben. Härte = 6,5 — 7. Spröde. Spec. Gew. = 3,1 — 3,2. Durchscheinend, meist nur an den Ranten. Glas-, auf den Spaltungsflächen Perlmutterglanz. Weiß, graulich-, grünlich-

weiß bis bl. und apfelgrün; grünlichgrau bis berggrün. Strich: weiß.

B. d. L. bläht er sich etwas auf und splittert in feine Zweige, die dann schnell zu weißem oder klarem Glase fließen. Die Flamme purpurroth färbend. Im Kolben etwas Wasser gegend. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Kieselerde 65,6

Thonerde. 27,9

Lithion .: 6,5

100,0

Etwas Wasser, Eisenorydul und Manganoryd finden sich zuweilen beigemengt.

Kommt eingewachsen in granitischen Gesteinen, und auf Lagern mit Feldspath, Turmalin, Quarz u. s. w. vor. Utön, Sterzing und Eisens in Tyrol; Killiney in Irland (hier der Killinit, der doch wahrscheinlich mit dem Triphan zu vereinigen ist); Peterhead in Schottland; Sterling, Goshen (hier sehr ausgezeichnet) und Dursfield in Massachusetts.

103. Lithion-Glimmer.

Syn. Glimmer z. Th. Lepidolith. Mica violet.

Kernform: schiefe rhombische Säule (?) $M||M = 120^\circ$ und 60° .

Krystalle, meist tafelförmige sechsseitige Säulen, durcheinander gewachsen und zu Drusen verbunden; krystallinische blätterige und kleinschuppige Massen.

Sehr vollkommen spaltbar parallel den Endflächen. Bruch: muschelig, selten wahrzunehmen. Härte = 2,5. Elastisch-biegsam in dünnen Blättchen. Spec. Gew. = 2,89 — 3,0. Durchsichtig, in dünnen Lamellen, bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz, auf den Spaltungsflächen metallähnlicher Perlmutterglanz. Weiß, grau, grünlich-, gelblich-, rauchgrau, grün, rosen-, pfirsichblüthroth. Strich: weiß.

B. d. L. leicht und unter Aufwallen zu einem blasigen, weißen oder graulichen Glase. Die Flamme purpurroth färbend. In einer Glasröhre geschmolzen gibt er Reaction von Flußsäure.

Von Salz- und Schwefelsäure wird er angegriffen, aber nicht vollkommen zerlegt, was jedoch geschieht, wenn er vorher geschmolzen und gepulvert wird. Chem. Gehalt des Lithonglimmers von Chursdorf (a) und von Zinnwald (b) nach E. S. Gmelin, des von Altenberg (c) und von Cornwall (d) nach Turner:

	a	b	c	d
Kiesel Erde.....	52,25	46,23	40,19	40,06
Thonerde.....	28,34	14,14	22,79	22,90
Lithion.....	4,80	4,20	3,06	2,00
Kalk.....	6,90	4,90	7,49	4,30
Flußsäure.....	5,07	8,53	3,99	2,71
Eisenoxyd.....		17,97	19,78	27,06
Manganoxydul	3,66	4,57	2,02	1,79
	101,02	100,54	99,32	100,82

Die Analyse b gab noch 0,83 Wasser.

Findet sich vorzüglich auf Zinnerz-Lagerstätten mit Topas, Apatit, Turmalin z. Zinnwald, Altenberg u. a. D. im Erzgebirge; Cornwall; eingewachsen in Granit: Pradisko in Mähren, Chanteloube in Frankreich; Elba; Utön; Massachusetts u. s. w.

104. Harmotom.

Syn. Kreuzstein. Paratomer Kuphonspath. Gismondin. Abazit. Beagonit.

Kernform: gerade rektanguläre Säule. Vorkommende Gestalten: 1) entsetzt zur Spizung über P. (Fig. 103., ohne die Flächen s); 2) entbreitenrandet (s) zur Schärfung über P und entsetzt (r), Fig. 103.; 3) Zwillinge der letzten Gestalt, Fig. 104.; 4) entrandet zum Verschw. der Kernflächen (Rektangulär-Oktäeder). Diese Form findet man ebenfalls sehr häufig in Zwillingen, und zwar rechtwinklich durchwachsen oder auch zu Kugeln gruppiert.

Fig. 103.





Fig. 104.



Nur Krystalle, die einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden sind; die s-Flächen parallel den r-Flächen gestreift, ebenso die T-Flächen; weshalb letztere federartige Streifung zeigen.

Spaltbar parallel den Seiten- und den Entdeckungs-Flächen. Bruch: uneben bis unvollkommen muschelig. Härte = 4,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,15 — 2,4. Halbdurchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz. Weiß, graulich, gelblich, röthlichweiß, auch fleisch- bis ziegelroth; selten braun. Strich: weiß.

B. d. L. ruhig zu einem weißen, klaren Glase fließend; im Kolben Wasser gebend. Man unterscheidet zwei Arten von Harmotom, in dem einen ist Baryt, im anderen Kali und Kalk als Bisilikat enthalten. Der Kaliharmotom mit Salzsäure eine Gallerte gebend, der Barytharmotom wird nicht aufgelöst. Chem. Zusams. des Baryt (a) und des Kaliharmotoms (b) nach L. Gmelin:

	a	b
Rieselerde..	49,5	50,7
Baryterde..	19,4	
Kalkerde...		5,7
Kali.....		5,0
Thonerde ..	17,4	21,5
Wasser	13,9	17,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Findet sich auf Gängen in älterem Gebirge: Andreasberg am Harz; Kongsberg in Schweden, Strontian in Schottland; in den Blasenräumen der Mandelsteine, Basalte und Dolerite: Oberstein in der Pfalz; Kaiserstuhl; Fulda; Laubach in Hessen; Munerode bei Gießen; Stempel bei Marburg; Capo di Bove bei Rom (hier der Gismondin).


Der Phillipsit, welcher am Vesuv und auf Sicilien vorkommt, scheint ein Kaliharmotom zu seyn.

105, Brewsterit.

Syn. Brewsterischer Kuphonspath.

Kernform: schiefe rektanguläre Säule $P||M = 93^{\circ} 40'$. Die bis jetzt beobachtete Gestalt ist: entnebenrandet zum

Fig. 105.



Berschw. von P und vierfach entseitigt zum
Berschw. von M. Fig. 105.

Krystalle, die Entseitigungs-Flächen vertikal gestreift, aufgewachsen und zu Drüsen verbunden; krystallinische Massen.

Vollkommen spaltbar nach T; nur undeutlich nach M. Bruch: uneben. Härte = 5. Spec. Gew. = 2,12 — 2,20. Durchsichtig bis durchscheinend. Glas-, auf den T-Flächen Perlmutterglanz. Weiß, gelblich-, grünlich-, braunlichweiß. Strich: weiß.

B. d. L. wird er undurchsichtig, schäumt auf und schmilzt, wiewohl schwer zu einem blasigen Glase; mit Borax zu einem farblosen Glase; in Phosphorsalz auflösbar mit Hinterlassung eines Kieselsteletts. Im Kolben Wasser gebend. Chem. Gehalt nach A. Connel:

Kieselerde.	53,666
Thonerde.	17,492
Strontian	8,325
Baryt. ...	6,749
Kalk.	1,346
Eisenoxyd	0,292
Wasser. ...	12,584

100,454

Findet sich auf Gängen begleitet von Kalkepath, zu Strontian in Argyleshire.

106. Laumontit.

Syn. Diatomer Kuphonspath. Laumonite.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M' 93^\circ 45'$ und $86^\circ 15'$; $P \parallel M = 113^\circ 30'$ und $66^\circ 30'$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform, Fig. 106.; 2) entspizet (n) und entseitigt (l und r), Fig. 107.; 3) entseitigt z. Berschw. der Seitenflächen (schiefe rektanguläre Säule).

Fig. 106.




Fig. 107.



Krystalle, säulenförmig, mit vertikal gestreiften Seitenflächen, aufgewachsen und zu Drusen verbunden; krystallinisch-stängeliche und körnige Massen.

Vollkommen spaltbar parallel den Seitenflächen, minder deutlich mit P. Bruch: uneben. Härte = 3,5 (frische, nicht verwitterte Bruchstücke). Sehr zerbrechlich. Spec. Gew. = 2,3. Durchscheinend. Glas-, auf den Spaltungsflächen Perlmutterglanz. Weiß, gelblich-, graulich-, röthlichweiß. Strich: weiß.

B. d. L. zu milchweißem Glase schmelzend, das bei Anwendung stärkerer Hitze durchscheinend wird; mit Borax zu wasserhellem Glase. Im Kolben viel Wasser gebend. Verwittert sehr leicht. Mit Salzsäure übergossen gelatinirend. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde 52,6

Thonerde. 24,0

Kalkerde. 11,6

Wasser... 14,8

100,0

Findet sich im Thonschiefer zu Huelgoet in Bretagne; im Porphyr: St. Gotthard; Monzoni in Tyrol; Montechiomaggiore; Antrim in Irland; Kilpatril in Schottland; Farber; Fahlun in Schweden; Rongsberg in Norwegen; Schemnitz in Ungarn; Newhaven in Connecticut; Hepland in New-York.

107. Stilbit.

Syn. Strahl-Beolith. Desmin. Prismatoidischer Kuphonspath.

Kernform: gerade rektanguläre Säule. Die gewöhnlich vorkommenden Gestalten sind: 1) enteckt zum Verschw. des Rands, Fig. 108.; 2) dergleichen zur Schärfung über P, Fig. 109.; 3) kreuzförmige Zwillingsskrystalle, jedoch selten.

Fig. 108.




Fig. 109.



Kryrstalle, glatt auch vertikal gestreift, zuweilen mit gekrümmten Flächen, einzeln aufgewachsen, meist aber garben- oder büschelförmig gruppiert, oder zu Drüsen verbunden; kryrstallinische Massen mit strahliger Textur.

Vollkommen spaltbar parallel den T-Flächen, minder deutlich nach M. Bruch: uneben. Härte = 3,5 — 4. Spröde. Spec. Gew. = 2,15 — 2,20. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Glas, auf den T-Flächen Perlmutterglanz. Weiß, graulich-, gelblich-, rötlich-weiß; fleischroth; rauchgrau; ockergelb; braun. Strich: weiß.

B. d. L. sich aufblähend und zu einem weißen Schmelz fließend; mit Borax zu klarem farblosem Glase. Im Kolben Wasser gebend. In Säuren auflösbar, mit Hinterlassung eines kieselartigen Rückstandes. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde 59,1

Thonerde. 15,7

Kalkerde. 8,6

Wasser... 16,6

100,0

Findet sich in den Blasenräumen von Mandelsteinen und Basalten: Island; Naasbe, Oesterbe u. a. Harber; Fassathal in Tyrol; Auvergne; Grönlund u. auf Gängen: Andreasberg am Harz; Kongsberg in Norwegen; Disans in der Dauphinée; Disfentis und Alrolo in der Schweiz; Strontian in Schottland u. s. w.



108. Heulandit.

Syn. Blätter-Beolith. Stilbit z. Thl. Hemiprismatischer Amphonspath. Heulandite.

Kernform: schiefe rektanguläre Säule. $P||M = 151^{\circ} 30'$ und $78^{\circ} 30'$. Vorkommende Gestalten: 1) entschärfandet, Fig. 110.; 2) beßgl. und entstumpft (Fig. 111. ohne die Flächen u.); 3) entschärfandet und enteckt, Fig. 111.

Fig. 110.

Fig. 111.



Krystalle, meist mit unebener Oberfläche, einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden; krystallinisch-blätterige Massen, eingesprengt.

Vollkommen spaltbar parallel T. Bruch: uneben. Härte = 3,5 — 4. Spröde. Spec. Gew. = 2,2 — 2,3. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glas-, auf den T-Flächen Perlmutterglanz. Farblos, weiß, gelblich-, grünlich-, röthlichweiß, fleisch- und ziegelroth; grau: braun. Strich: weiß.

B. d. L. unter Aufblähen und Schäumen zu einem weißen Email schmelzend. Gibt im Kolben Wasser. Die Salzsäure zersetzt das Pulver leicht. Chem. Zusam. nach v. Kobell:

Kieselerde 60,47

Thonerde 17,94

Kalkerde. 7,46

Wasser.. 14,13

100,00


Findet sich mit Stilbit in den Blasenräumen der Mandelsteine und Klüften der Basalte: Farber, Island; Irland; Kilpatrick in Schottland; Hebriden (Skye, Mull u. a.); Fassathal; seltener auf Gängen oder Lagern: Andreasberg; Rongsberg; Arendal u. s. w.

109. Epistilbit.

Syn. Dipyramidischer Kuphonspath.

Fig. 112.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M = 135^{\circ} 10'$ und $44^{\circ} 50'$. Vorkommende Gestalten: 1) entspißect zur Schärfung über P (s), und entstumpfect (t), Fig. 112.; 2) entstumpfect zur Schärfung über P und dreifach entspißect; 3) Zwillinge, und zwar häufiger als die einfachen Gestalten.



Krystalle, aufgewachsen; krystallinische Massen.

Vollkommen spaltbar parallel der kleinen Diagonale der P-Flächen. Bruch: uneben. Härte = 4,5. Spec. Gew. = 2,249. Durchsichtig, an den Ranten durchscheinend. Glasglanz, auf den vollkommenen Spaltungsflächen Perlmutterglanz. Farblos, weiß. Strich: weiß.

B. d. L. unter Aufschwellen zu einem blasigen Email. Im Kolben Wasser gebend. Von concentrirter Salzsäure wird er vollkommen zersetzt und hinterläßt die Kieselserde als feines Pulver; nach dem Glühen wird er nicht mehr angegriffen. Chem. Gehalt nach G. Rose:

Kieselserde 58,59

Thonerde. 17,52

Kalkerde. 7,56

Natron.. 1,78

Wasser .. 14,48


99,93

Findet sich in den Blasenräumen von Mandelsteinen, begleitet von Heulandit: Island, Faröer.

410. Chabasie.

Syn. Chabasit. Rhomboedrischer Kuphonspath.

Fig. 113.



Kernform: Rhomboeder $P \parallel P = 94^\circ 46'$ über den Scheitellanten; $= 85^\circ 14'$ über den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entschitellantet; 3) entrandet; 4) entschitellantet (n) und entrandet (r), Fig. 113.; 5) beßgleichen und entrandet; 6) Zwillinge der Formen 1, 3, 4 und 5.

linge der Formen 1, 3, 4 und 5.

Nur Krystalle mit federartig gestreifter Oberfläche, einzeln aufgewachsen, meist aber gruppirt.

Unvollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: uneben ins Muschelige. Härte = 4,5. Spec. Gew. = 2,0 — 21. Durchsichtig bis durchscheinend. Starker Glasglanz. Wasserhell; weiß; graulich-, gelblich-, röthlichweiß. Strich: weiß.

B. d. L. leicht zu einem blasigen, wenig durchscheinenden Email schmelzend. Im Kolben Wasser gebend. Das feine Pulver wird von der Salzsäure ziemlich leicht zersetzt, wobei sich die Kieselserde als schleimiges Pulver abscheidet. Chem. Gehalt der Chabasie von Gustavsberg nach Berzelius (a), von Fassa nach Arfvedson (b und c) und der von Riebedörfel nach E. Hoffmann (d).

Kieselerde	50,65	48,38	49,07	48,18
Thonerde	17,90	19,28	18,90	19,27
Kalkerde.	9,37	8,70		9,65
Kali....	1,70	2,50	12,19	0,21
Natron..				1,54
Wasser ..	19,90	21,40	19,75	21,10
	<u>99,52</u>	<u>100,26</u>	<u>99,89</u>	<u>99,95</u>

In Blasenräumen von Mandelstein, Basalt und Phonolith in Klüften von Diorit, begleitet von Kalispath, Daarz, Sarmotom etc. Oberstein in der Pfalz; Puserloch und Monzoni in Tyrol; Kaiserstuhl im Breisgau; Laubach und Gelnhaar im Bögelsgebirge; Westerwald; Riebedörfel bei Auffig u. a. O. in Böhmen; Schottland; Irland; Island; Dalsnypen auf Sandöe, Riberig auf Oesteröe, Nalsöe u. auf a. Färbern, in Grönland u. s. w.



111. Mesotyp.

Syn. Prismatischer Kalkspath. Nabelstein. Faset-Scolith. Mesotype.

Kernform: gerade rhombische Säule $M||M = 90^\circ 58'$ (dieser Winkel wird bis zu $91^\circ 40'$ angegeben). Vorkommende Formen: 1) entrandet (o) zur Spitzung, Fig. 114.; 2) beögl. und entschärfseitig (r), Fig. 115.; 3) entrandet zur Spitzung und entstumpfsseitig; 4) beögl. und entschärfseitig.

Fig. 114.

Fig. 115.



Kristalle, oft nadel- oder haarförmig, die M -Flächen vertikal, die Entseitungs-Flächen horizontal gestreift, auf- und durcheinander verwachsen, zu Büscheln oder Drusen verbunden; krystallinisch-stängeliche Massen mit concentrisch-strahliger bis faseriger Textur (Strahl-Mesotyp), kugelig, traubig, nierenförmig, verb.

Vollkommen spaltbar nach den Seitenflächen. Bruch: un-
Blum, Dryktognose.

eben. Härte = 5 — 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,16 — 2,25. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz. Wasserhell, weiß, graulich, gelblich, grünlich, röthlichweiß, gelblichgrau: isabell- und ockergelb; fleisch- und ziegelroth; gelblichbraun. Strich: weiß.

B. d. L. wird er unklar und schmilzt leicht zu einem entweder klaren, dichten oder blasigen Glase. Im Kolben Wasser gebend. Mit Salzsäure gelatinirend. Die chemische Zusammensetzung der bis jetzt zum Mesotop gezählten Mineralien läßt einige Verschiedenheit wahrnehmen, da aber die genaueren krystallographischen und physikalischen Untersuchungen mangeln, so kann eine Trennung derselben noch nicht statt finden, zumal da einige für Gemenge gehalten werden. — Chem. Zusammens. des Skolezit's (a) der Mesoline (b), des Mesolith's (c), der Mesole (d) und des Natrolith's (e) nach L. Gmelin:

	a	b	c	d	e
Kieselerde.	47,5	45,2	48,0	43,4	48,7
Thonerde.	25,2	24,0	25,4	27,7	25,9
Kalkerde..	13,9	8,8	9,3	10,1	
Natron...		5,0	5,3	5,8	16,3
Wasser ...	13,4	17,0	12,0	13,0	9,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

In Blasenräumen von Basalt, Mandelstein, Dolerit, Phonolith u., auch auf Adern und Gängen, besonders im Phonolith. Puy de Marman in Auvergne; Vicenza, Fassathal; Kaiserstuhl im Breisgau; Hohentwiel im Högau; Fulda und Contra in Hessen; Marienberg, Hauenstein und Auffig in Böhmen; Hebriden; Island; Faröer; Grönland u. s. w.

112. Thomsonit.

Kernform: gerade quadratische Säule. Vorkommende Gestalten; 1) entseitet; 2) dreifach entseitet, enteckt und entrandet.

Krystalle, mit vertikaler Streifung, aufgewachsen; krystallinisch-stängeliche Massen mit strahliger Textur.

Spaltbar parallel den Seitenflächen. Bruch: uneben. Härte = 5,0. Spröde. Spec. Gew. = 2,37. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Wasserhell, weiß, röthlichweiß. Strich: weiß.

B. d. L. bläht er sich sehr stark auf, wird weiß, undurchsichtig und schmilzt dann leicht zu einem weißen Email. Im Kolben Wasser gebend. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde	38,5
Thonerde.	30,6
Kalkerde.	12,6
Natron..	4,8
Wasser...	13,5
	<u>100,0</u>


Die Analysen ergaben etwas Kalkerde und Eisenoxyd.

Findet sich im Mandelstein der Rispatrit-Hügel in Dünnarton, in doleritartigem Gestein (Analzimit) der Cyclophen-Inseln; in Laven am Vesuv.

113. Gmelinit.

Kernform: Bipyramidal-Dodekaeder. $P||P = 83^{\circ} 36'$ über den Rand $= 129^{\circ} 48'$ über den Scheitellanten. — Entseittelt (o) und entrandet (n) Fig. 116.

Fig. 116.



Krytalle, vertikal gestreift auf den P, und horizontal auf den n-Flächen; eingewachsen und zu mehreren verbunden.

Bruch, uneben. Härte = 4,5. Spec. Gew. = 2,05. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Wasserhell, weiß, röthlich-weiß ins Fleischrothe. Strich: weiß.

In der Flamme des Kerzenlichts in eine Menge Schuppen zerspringend. Im Kolben Wasser gebend. Chem. Gehalt nach Ba u q u e l i n:

Kieselerde	50,0
Thonerde.	20,0
Kalkerde.	4,5
Natron..	4,5
Wasser...	21,0
	<u>100,0</u>

In Blasenräumen von Mandelsteinen: Vicenza; Glenarm in Irland.

114. Preenit.

Syn. Arötoher Triphanspath. Preenite.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M=99^{\circ}56'$ und $80^{\circ}4'$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform (ähnlich Fig. 18. pg. 22.); 2) entschärfseitig (Fig. 117. ohne k.); 3) entseitig, Fig. 117.; 4) entspißect (o) zur Schärfung über den scharfen Seiten (Fig. 118. ohne h); 5) entspißect und entschärfseitig, Fig. 118.; 6) beßgleichen und entstumpfect.

Fig. 117.





Fig. 118.



Krysalte, theils tafellartig (besonders die Varietäten 1, 2 und 3), theils kurz säulenartig, glatt, gestreift, oder drüsig, häufig mit gebogenen Flächen, eingewachsen, mannichfach gruppiert und zu Drüsen verbunden, zuweilen fächer- oder garbenförmig zusammengehäuft; verb mit blätteriger Textur (blätteriger Preenit, Preenitspath); kugelige, nierenförmige, stalaktitische Massen mit concentrisch-strahliger bis faseriger Textur und meist drüsiger Oberfläche (faseriger Preenit, Strahl-Preenit).

Siemlich vollkommen spaltbar parallel P, undeutlich nach den Seitenflächen. Bruch: uneben. Härte = 6—6,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,8—2,93. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz, zuweilen perlmutterartig. Graulich, grünlichweiß; berg-, apfel-, gras-, lauch-, olivengrün; grünlichgrau. Strich: weiß. Durch Erwärmen polarisch-elektrisch werdend.

B. d. L. bläht er sich stark auf und schmilzt zu einem weißen oder gelblichen blässigen Glase, mit Borax zur klaren Kugel. Gibt im Kolben Wasser. Das Pulver wird von Salzsäure angegriffen aber nicht vollkommen zerlegt, was jedoch der Fall ist, wenn man es vorher stark glüht, wo es sich leicht zur Gallerte auflöst. Chem. Zusamm. nach v. Kobell:

Kieselerde 44,05

Thonerde 24,50

Kalkerde. 27,16

Wasser. . . 4,29

100,00

Zuweilen bis 6 p. o. Eisenoryd, auch Spuren von Kali und Natron enthaltend.

Findet sich auf Gängen und Drusenräumen im älteren Gebirge: Ratschinges in Tyrol; Fuschthal in Salzburg; Saualpe in Kärnthen; Disans in der Dauphinée; Lemmi in Piemont; Barèges u. a. D. in den Pyrenäen; Land der Namaquas im südlichen Afrika u. s. w.; ferner in Blasenräumen der Mandelsteine und Trapp-Porphyre: Reichenbach bei Oberstein in der Pfalz; Geisseralp; Fassathal; Kilpatrick und Loch-Dumphrey in Dumbartonshire; Skye; Mull u. s. w.

115. Karpholit.

Syn. Strohstein. Carpholite.

Krystallinische und derbe Massen mit dünnstängelicher bis zartfaseriger Textur, sternförmig auseinanderlaufend.

Härte = 5. Spec. Gew. = 2,93. Undurchsichtig. Perlmutterglanz. Strohgelb, zuweilen wachsgelb. Strich: weiß.

B. d. L. schwillt er an, wird weiß und schmilzt schwer zu einem unklaren, braunlichen Glase; mit Borax zu klarem Glase, das in der äußeren Flamme Mangan-Farbe annimmt. Im Kolben gibt er Wasser. Chem. Gehalt nach Stromeyer:

Kieselerde. . . 36,154

Thonerde. . . 28,669

Kalkerde. . . 0,271

Manganoryd 19,160

Eisenoryd. . . 2,290

Flußsäure. . . 1,470

Wasser. . . . 10,780

98,794

Findet sich mit Quarz und Flußspath in Granit zu Schlaggenwalde in Böhmen.

116. Haupn.

Syn. Rosin. Rosen. Spinell.

Kernform: Ranten-Dodekaeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entkantet; 3) entkantenberstet; 4) entkantenberstet; 5) beßgleichen und entkantet.

Kryſtalle, neben oder glatt, zuweilen mit zugerundeten Ranten, eingewachsen, auch zu Drüſen gruppirt; eingewachsene Körner, und kryſtalliniſch-körnige Maſſen.

Spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig ins Unebene. Härte = 5,5 — 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,28 — 2,47. Durchſichtig bis an den Ranten durchſcheinend. Glasglanz. Waſſerheit, weiß; himmel-, ſmalte-, berliner-, ſchwärzlichblau; kaſtanien- und ſchwärzlichbraun; grün, bläulichgrün; ſchwarz. Strich: weiß.

B. d. L. zu einem weißen Glaſe ſchmelzend, mit Borax unter Brauſen zu klarem Glaſe, das bei der Abkühlung gelb wird. Von der Salzfäure wird er leicht, unter Entwicklung von etwas Schwefelwaſſerſtoffgas, aufgelöst und bildet eine Gallerte. Chem. Gehalt des Haupns von Marino nach L. Gmelin, des Roſins vom Laacher-See nach Laproth:

Kieſelerde ...	35,48	45,0
Thonerde	18,87	29,5
Kalkerde	12,00	1,5
Kgſi	15,45	Naſtron 19,0
Schwefelſäure	12,39	1,0
Eiſenoryd ...	1,16	2,0
Waſſer	1,20	2,5
	<u>96,55</u>	<u>98,5</u>

Findet ſich in vulkaſiſchen Geſteinen: in glaſigem Feldſpathgeſtein am Laacher-See; in Bimsſtein ebendaſelbſt, ſo wie bei Tönniſtein und Andernach, hier auch im Traß; im Peperin zu Albano und Marino; in den Auswürflingen älterer Eruptionen des Veſuv; in verſchlacktem Baſalt zu Niedermendich; im Dolerit zu Mont-Dore in Auvergne.

Der Zinnerit, welcher in derben Maſſen in Dolerit eingewachsen am Kaiſerſtuhl im Breisgau vorkommt, gehört wohl hierher.

117. Lasurstein.

Syn. Dodekaedrischer Lasurspath. Azurestone.

Kernform: Rauten-Dodekaeder. Nur dieses ist bis jetzt beobachtet.

Kristalle, sehr selten, mit rauher Oberfläche, derb mit klein- und feinkörniger Textur, stumpfeckige Stücke, eingesprengt.

Unvollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform, Bruch: uneben ins Muschelige. Härte = 5,6. Spec. Gew. = 2,5 — 2,9. An den Kanten durchscheinend. Schwacher Glasglanz. Lasur-, berliner-, himmels-, schwärzlichblau. Strich: lichtebau.

B. d. L. schwer zu einem weißen Glase; mit Borax unter beständigem Brausen zu klarem farblosem Glase. Gibt etwas Wasser im Kolben. Das Pulver wird von Salzsäure, unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff, schnell entfärbt, und gibt eine Gallerte. Chem. Gehalt nach L. Smelin:

Kieselerde.... 49

Thonerde.... 11

Kalkerde..... 16

Natron..... 8

Schwefelsäure 2

Eisenoxydul.. 4

Falkerde..... 2

92

Findet sich auf Gängen in älterem Gebirge, häufig mit eingesprenktem Eisenkies: Ufer des Sjudanka in Sibirien; kleine Bucharei; Tibet; an mehreren Orten in China; Chili.

Wird zu Ring- und Nadelsteinen, zu Kreuzen, Ohrgehängen u. verwendet; auch zu Dosen, Vasen, kleinen Bildsäulen, Uhrgehäusen u. s. w.; selbst zu architektonischen Verzierungen und zur Stein-Mosaik gebraucht man ihn. Die wichtigste Anwendung desselben ist jedoch die zur Bereitung des ächten Ultramarins, eines sehr schönen blauen und dauerhaften Farbpigments für die Delmalerei.

118. Warnerit.

Syn. Skapolith. Spreustein. Mejonit. Schmelzstein. Pyramidaler Feldspath. Paranthine. Dipyre.

Kernform: gerade quadratische Säule. Gewöhnlich vorkommende Gestalten: 1) entseitet; 2) beiseitigen und entseitet zur Epigung, Fig. 119.; 3) entseit zur Epigung und entseitet, Fig. 120.; 4) dreifach entseit, die mittlere Entseitung zur Epigung, und dreifach entseitet.

Fig. 119.





Fig. 120.



Kristalle, meist in die Länge gezogen, säulenförmig, häufig mit vertikaler Streifung auf den Seitenflächen, oder mit Glimmer überzogen, nadelnformig, auf- oder eingewachsen, zu Drusen verbunden, auch durcheinander gewachsen. Derbe Massen mit körniger oder strahliger Textur.

Spaltbar parallel den Seitenflächen. Bruch: muschelig in die Unebene und Splittterige. Härte = 5 — 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,8 — 2,8. Durchsichtig (Mejonit) bis undurchsichtig. Glasglanz, auf Spaltungsflächen perlmutterartig, auf Bruchflächen fettartig. Wasserhell, weiß; bläulich-, grünlich-, gelblich-, graulichweiß; gelblich-, grünlichgrau; oliven-, ol-, pistaziengrün; schwarz; braun; ziegel-, blut-, rosenroth. Die Farben meist unrein. Strich: graulichweiß.

M. d. L. schmilzt er unter Schäumen und mit Leuchten zu einem farblosen, blasigen Glase; mit Borax unter fortwährendem Brausen zu klarem Glase. Das Pulver wird von der Salzsäure zerlegt. Chem. Gehalt des Wernerits von Ershy nach Hartwall und des Mejonits vom Vesuv nach L. Gmelin:

Kieselexide..	43,87		40,8
Thonerde...	27,93		30,6
Kalkerde...	20,00		22,1
Natron....	2,92	u. Kali	2,4
Eisenoxydul.			1,0
Kohlensäure.	4,39		
Wasser.....	0,55		
	<hr/> 99,66		<hr/> 96,9

Auf Lagern von Magneteisen und Kupferkies; Brendol;

Långbanshytta, Malsjö und Sjösa in Schweden; Pargas und Kurikarari in Finnland; Pyrenden; Mähren; Sterzing in Tyrol; Borborough in Massachusetts; Franklin in New-Yersey; auch in den Drusenträumen der Auswürflinge alter Eruptionen am Vesuv findet sich der Mejonit. — Der Dipyrr oder Schmelzstein kommt bei Mauléon in den Pyrenden vor.

119. Arinit.

Syn. Thumerstein. Prismatischer Arinit. Arinite. Thumerstone.

Kernform: schiefe rhomboidische Säule. $P||M = 135^{\circ} 24'$ und $44^{\circ} 36'$; $P||T = 134^{\circ} 48'$ und $45^{\circ} 12'$; $M||T = 115^{\circ} 39'$ und $64^{\circ} 21'$. Einige der gewöhnlichsten Formen sind: 1) Kernform (Fig. 121. ohne s und x); 2) entstumpfteitet (Fig. 121. ohne x); 3) entstumpfteitet und entspizect, Fig. 121.; 4) entstumpfteitet und entlängstumpfrandet (l), Fig. 122.

Fig. 121.





Fig. 122.



Krystalle, die Kernflächen parallel dem Rande gestreift, die andern glatt und glänzend, einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden; verb., eingesprengt.

Unvollkommen spaltbar nach P und T. Bruch: kleinsmuschelig bis uneben. Härte = 6,5 — 7. Spröde. Spec. Gew. = 3,2 — 3,3. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz. Nelfenbraun bis rauch-, perl- und grünlichgrau, violettblau; gelblich; weißlich. Strich: weiß.

B. d. L. schmilzt er leicht unter Aufwallen zu einem dunkelgrünen Glase; mit Borax leicht zu einem von Eisen gefärbten Glase. Säuren ohne Wirkung, aber das Pulver des geschmolzenen Arinit wird durch Salzsäure vollkommen zersezt und bildet eine Gallerte. Chem. Gehalt nach den Analysen von Klaproth (a), Wauquelin (b) und Wiegmann (c):

	a	b	c
Kieselerde...	50,50	44	45,00
Thonerde...	16,00	18	19,00
Kalkerde...	17,00	19	12,50
Eisenoxyd...	9,50	14	12,25
Manganoxyd	5,25	4	9,00
Kali	0,25		Talkerde 0,25
Boraxsäure..			2,00
	<hr/> 98,50	<hr/> 99	<hr/> 100,00

Findet sich auf Lagern und Gängen im älteren Gebirge: Gegend von Disans in der Dauphinée; Barèges in den Pyrenäen; Chamouny; St. Gotthard; Monzoni in Tyrol; Thum, Schneeberg und Schwarzenberg im Erzgebirge; Treseburg am Harz; Rongsberg in Norwegen; Poloma in Ungarn; Cornwall.

120. Turmalin.

Syn. Schörl. Rhomboedrischer Turmalin. Tourmaline.

Kernform: Rhomboeder $P||P=133^{\circ} 13'$ über den Scheitellanten; $=46^{\circ} 47'$ über den Rand (Kupffer). Die Ableitung der secundären Gestalten von der Kernform geschieht nach dem Polaritäts-Gesetze, indem sich der obere Scheitel anders verhält als der untere, eine Eigenthümlichkeit, die wohl mit der elektrischen Kraft, welche diesem Minerale vorzüglich eigen ist, in genauem Zusammenhange steht. Doch trifft man selten beide Gipfel ausgebildet. Zu den Gestalten, welche häufig vorkommen gehören: 1) entrandet (s) und am oberen Gipfel entrandeckt (l) zur neunseitigen Säule, unten sind entweder die Kernflächen vorhanden, oder es tritt Entschärfung z. Verschwinden derselben ein, Fig. 123.; 2) beßgleichen und oben entschärfelt z. Verschw. der Scheitellanten; 3) entrandet zur sechsseitigen Säule, oben entrandet in der Richtung der Scheitellanten (o), unten entschärfelt, Fig. 124.; 4) entrandet und oben entrandeckt zur neunseitigen

Fig. 123.




Fig. 124.





Fig. 125.



Säule, entseitelkantet (n) und entseitelt (K), unten unverändert Fig. 125. u. f. w. *).

Krystalle, meist säulenartig, langgestreckt bis nadelförmig, seltener kurz und dick tafelartig, die Seitenflächen vertikal gestreift, zuweilen rauh, die anderen Flächen glatt, ein- und aufgewachsen, auch zu Drusen und Büscheln verbunden; derb, mit körniger stängelicher bis faseriger Textur, zuweilen büschel- und sternförmig auseinander laufend. Geschiebe.

Unvollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 7 — 7,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,0 — 3,3. Durchsichtig bis undurchsichtig. Glasglanz. Wasserhell, weiß, roth, blau, grün, gelb, braun, schwarz. Zuweilen läßt ein und derselbe Krystall verschiedene Farben wahrnehmen, oder verschieden gefärbte Krystalle umschließen sich gegenseitig. Strich: weiß. Dichroismus in der Richtung der Hauptaxe. Durch Erwärmen polarisch-elektrisch werdend.

B. d. L. verhalten sich die Turmaline verschieden; einige blähen sich auf und schmelzen zu einer graulichgelben Kugel, andere sind strengflüssig und geben nur eine schwarze oder gelbliche schlackige oder blässige Masse, ein anderer Theil ist unschmelzbar, schwillt etwas auf und wird weiß; mit Borax werden die verschiedenen Arten mehr oder minder leicht zu klarem Glase gelöst. Das Pulver wird von Schwefelsäure zersetzt; Salzsäure greift es nicht an. Die chemische Zusammensetzung ist noch nicht genau bekannt. Gehalt des rothen Turmalin aus Nöhren (a) und des schwarzen von Käringsbrika (b) nach C. G. Smelin, des Grünen (c) aus Brasilien nach Bauquelin und des blauen (d) von Utön nach Arfvedson.

*) No. 1 und 2 sind schwarze Varietäten, die eine von Grönland, die andere vom Fäbriberge; 3) grüne B. vom St. Gottthard; 4) rothe von Ceylan.

	a	b	c	d
Kieselerde ...	42,127	38,92	40,00	40,50
Thonerde ...	36,430	33,24	39,00	40,50
Kalkerde	1,200		3,84	
Borarsäure ..	5,744	0,60		1,10
Kali	2,450	2,53		
Lithion	2,045			4,50
Talkerde		9,80		
Eisenoxyd ...		7,20	12,50	4,85
Manganoxyd ..	6,320		2,00	1,50
Glühverlust ..	1,313	0,03		3,60
	<u>97,627</u>	<u>92,52</u>	<u>97,34</u>	<u>96,15</u>

Man unterscheidet bis jetzt gewöhnlich nach den Farben folgende Arten:

1) wasserheller Turmalin; durchsichtig; wasserhell ins Weiße. — Im Dolomit von Campolongo, im Granit auf Elba;

2) rother Turmalin (Siberit, Apyrit); pfirsichblüth-, rosen-, karmin-, rubinroth bis violettblau. — In Lepidolith und Quarz zu Rozena in Mähren; in Granit zu Miasa und Murfink in Siberien; Elba; Chesterfield in Massachusetts; Paris in Maine; Penig in Sachsen; als Geschiebe in Ceylan und Peru.

3) blauer Turmalin (Indikolith); indig-, lasur-, berliner- bis schwärzlichblau. — Utön; Goschen in Massachusetts.

4) grüner Turmalin: gras-, lauch-, pistazien-, oliven- bis schwärzlichgrün. — Rozena. Campolongo am St. Gotthard; Piemont; Katharinenburg; Chesterfield, Goschen, Hampshire in Massachusetts; Madagaskar. Villa Rica in Brasilien (hier als Geschiebe);

5) gelber Turmalin; honiggelb, gelblichgrün, gelblichbraun. — Smrczek in Mähren; Elba; Goschen;

6) brauner Turmalin (elektrischer Schörl); leber-, gelblich-, röthlich-, schwärzlichbraun. — St. Gotthard; Elba; Ceylan;

7) schwarzer Turmalin (gemeiner Schörl); sammet- und pechschwarz. Undurchsichtig. Die Varietät, welche am häufigsten vorkommt; und zwar als wesentlicher Gemengtheil des Turmalinschiefers am Auerberg in Sachsen; eingewachsen in Granit, Gneiß, Glimmer-, Talk- und Chloritschiefer, auch in Drusenräumen und auf Gängen. Heidelberg; Andreasberg am Harz;

Freiberg, Eibenstock u. a. D. in Sachsen, Hörsberg und Zwiesel in Baiern; Pfitsch, Faltigels, Ratschinges in Tyrol; Pyrenäen; Cornwall; Käringsbrika in Schweden; Arendal und Langbø in Norwegen; Grönland; Elba; Madagaskar u. s. w.

Die Turmalin-Varietäten mit schönen, reinen Farben, namentlich die rothen, grünen und blauen, werden zuweilen zu Ring-, Nabel- und anderen Schmucksteinen verarbeitet.

121. Staurolith.

Syn. Prismatoidischer Granat. Staurolite.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M=129^{\circ}$ $20'$ und $50^{\circ} 40'$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform (Fig. 126. ohne die Flächen o und r); entschärft (Fig. 126. ohne die Flächen r); 3) beßgleichen und entstumpft (Fig. 126.); 4) Zwillinge der Abänderung No. 2. unter Winkeln von 90° und 60° , Fig. 127.; 5) Zwillinge von No. 3.

Fig. 126.





Fig. 127.



Nur Krystalle, verlängert in der Richtung der Hauptaxe, eingewachsen. Oberfläche: glatt oder rauh, die P-Flächen fast stets rauh, zuweilen auch ausgehöhlt; oft mit Glimmer oder Talk überzogen.

Spaltbar parallel den kleinen Diagonalen der P-Flächen, nach M sehr unvollkommen. Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 7 — 7,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,4 — 3,8. Durchscheinend an den Ranten bis undurchsichtig. Glasglanz, fettartig. Bräunlichroth, röthlich- und schwärzlichbraun. Strich: weißlich.

B. d. L. für sich unschmelzbar, jedoch dunkler werdend. Mit Borax langsam zu einem klaren, durch Eisenoryd dunkelgrün ge-

färbten Glase. Das Pulver wird durch Schwefelsäure größtentheils zerlegt. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin; Analysen zweier Varietäten vom St. Gotthard von Klaproth.

Kieselerde. 29,9	27,00	37,50
Thonerde.. 50,7	52,25	41,00
Eisenoxyd. 19,4	18,50	18,25
	Manganoxyd 0,25	0,50
	Talk.....	0,50
<u>100,0</u>	<u>98,00</u>	<u>97,75</u>


Vauquelin fand in dem Staurolith der Bretagne 3,84 p. c. Talk.

Kommt eingewachsen in Glimmer-, Talk- und Thonschiefer vor, auch in Gneiß und Granit, begleitet von Disthen, Turmalin, Granat u. s. w. Cheronico im Kanton Uri; St. Gotthard; Quimper und Laminée in der Bretagne (hier in großer Menge, nach der Zerstörung des Gesteins lose umherliegend); Cavalière bei Hières im Depart. du Var.; Zillerthal; Winkelsdorf in Mähren; Bieber in Hessen; Pic du Midi in den Pyrenäen; St. Jago di Compostella in Spanien; Irland; Schottland; Sibirien; Nordamerika u. s. w.

122. Granat.

Syn. Dodekaedrischer Granat. Grenat. Garnet.

Fig. 128.



Kernform: Rauten-Dodekaeder: Die Gestalten, am häufigsten vorkommend, sind: 1) Kernform, oft in der Richtung einer der Axen, welche die Rhomboeder-Scheitel verbinden, in die Länge gezogen; 2) entkantet (n), Fig. 128.; 3) beßgl. zum Verschwinden der Kernflächen.

Trapezoeder (s. Fig. 37. pg. 94.); 4) zweifach entkantet; 5) dreifach entkantet.

Kryrstalle, meist gestreift oder rauh, einzeln eingewachsen; kryrstallinische Massen mit schaliger und körniger Textur, verb. secundär in losen Kryrstallen, Geschieben und Körnern.

Unvollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform: Bruch: muschelg bis uneben. Härte = 6,5 — 7,5. Spröde. Spec.

Gew. = 3,6 — 4,3. Durchsichtig bis undurchsichtig. Glas bis Fettglanz. Grün, gelb, roth, braun, schwarz. Strich: grau, gelb, roth, braun. Zuweilen etwas magnetisch.

B. d. L. leicht und ruhig, oder mit einigem Aufwallen, zur braunen, grünlichen oder schwarzen Kugel, die zuweilen magnetisch ist und Metallglanz zeigt; mit Borax mehr oder minder schwer, oder leicht, zu einem von Eisen gefärbten Glase; manche Pyrope ertheilen dem Borax-Glase eine schöne chromgrüne Farbe. Säuern ohne Wirkung. Die chemische Zusammensetzung der Granate ist sehr verschieden; es gibt welche, die neben der Kieselerde, Thonerde und Eisenorydul, andere, die Eisenoryd und Kalkerde ohne Thonerde, und noch andere, die Kalkerde und Thonerde fast ohne Eisenoryd enthalten, daß sich also die isomorphen Basen Thonerde und Eisenoryd einander ersetzen können, und die isomorphen Basen Kalkerde, Talkerde, Eisenorydul und Manganorydul sich vertreten (Berzelius). Chem. Gehalt des Pyrops (a), des Granats von Engsb (b), des grünen von Hesselkulla (c) und des schwarzen von Arendal (d) nach Graf Trolle Wachtmeister:

Kieselerde.....	43,70	40,60	38,13	42,45
Thonerde.....	22,40	19,95	7,52	22,47
Kalkerde.....	6,72		31,65	6,53
Talkerde.....	5,60			13,41
Eisenorydul...	11,48	53,93	Eisenoryd 19,42	Oxydul 9,29
Manganorydul	3,68	6,69	3,30	6,27
Chromoryd....	6,52			
	<u>100,10</u>	<u>101,57</u>	<u>99,72</u>	<u>100,44</u>

Ohne weiter auf den Gehalt Rücksicht zu nehmen, unterscheidet man gewöhnlich nach den Farben folgende Arten:

1) rother Granat (edler oder orientalischer Granat, Almandin, Pyrop. Grenat noble. Precious or oriental Garnet); blut-, kolumbin-, kirsch-, braunlichroth. — Zufälliger Gemengtheil verschiedener Gebirgsmassen: von Granit, Gneiß, Glimmer-, Talk-, Chlorit-, Hornblendeschiefer, Serpentin u.; Deththal und Grainer in Tyrol; Lanzothal und Mussaalp in Piemont; St. Gotthard; Lobingerberg in Kärnthen; Zöblitz in Sachsen; Fahlun und Engsb in Schweden; Arendal, Kongsberg und Egg in Norwegen; Grönland u. s. w. lose im Schuttlande: Meronitz, Pod-

116. Haunz.

Syn. Nossin. Nossan. Spinellan.

Kernform: Rauten-Dodekaeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entkantet; 3) entoktaederscheitelt; 4) entrhombrederscheitelt; 5) beßgleichen und entkantet.

Krystalle, uneben oder glatt, zuweilen mit zugerundeten Kanten, eingewachsen, auch zu Drusen gruppiert; eingewachsene Körner, und krystallinisch-förmige Massen.

Spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig ins Unebene. Härte = 5,5 — 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,28 — 2,47. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz. Wasserhell, weiß; himmel-, smalte-, berliner-, schwärzlichblau; kastanien- und schwärzlichbraun; grün, blaulichgrün; schwarz. Strich: weiß.

B. d. L. zu einem weißen Glase schmelzend, mit Borax unter Brausen zu klarem Glase, das bei der Abkühlung gelb wird. Von der Salzsäure wird er leicht, unter Entwicklung von etwas Schwefelwasserstoffgas, aufgelöst und bildet eine Gallerte. Chem. Gehalt des Haunz von Marino nach L. Gmelin, des Nossins vom Laacher-See nach Klaproth:

Kieselerde ...	35,48	43,0
Thonerde	18,87	29,5
Kalkerde	12,00	1,5
Kgll	15,45	Naatron 19,0
Schwefelsäure	12,39	1,0
Eisenoxyd ...	1,16	2,0
Wasser	1,20	2,5
	<u>96,55</u>	<u>98,5</u>

Findet sich in vulkanischen Gesteinen: in glasigem Feldspathgestein am Laacher-See; in Bimsstein ebendasselbst, so wie bei Lönnestein und Andernach, hier auch im Trass; im Peperin zu Albano und Marino; in den Auswürflingen älterer Eruptionen des Vesuv; in verschlacktem Basalt zu Niedermendich; im Dolerit zu Mont-Dore in Auvergne.

Der Ittnerit, welcher in derben Massen in Dolerit eingewachsen am Kaiserstuhl im Breisgau vorkommt, gehört wohl hierher.

117. Lasurstein.

Syn. Dodekaedrischer Lasurspath. Azurestone.

Kernform: Rauten-Dodekaeder. Nur dieses ist bis jetzt beobachtet.

Krystalle, sehr selten, mit rauher Oberfläche, verb mit klein- und feinkörniger Textur, stumpffellige Stücke, eingesprengt.

Unvollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform, Bruch: uneben ins Muschelige. Härte = 5,6. Spec. Gew. = 2,5 — 2,9. An den Kanten durchscheinend. Schwacher Glasglanz. Lasur-, berliner-, himmel-, schwärzlichblau. Strich: lichtebau.

B. d. L. schwer zu einem weißen Glase; mit Borax unter beständigem Brausen zu klarem farblosem Glase. Gibt etwas Wasser im Kolben. Das Pulver wird von Salzsäure, unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff, schnell entsärbt, und gibt eine Gallerte. Chem. Gehalt nach L. Gmelin:

Kieselerde.... 49

Thonerde..... 11

Kalkerde..... 16

Natron..... 8

Schwefelsäure 2

Eisenorydul.. 4

Falkerde..... 2

92

Findet sich auf Gängen in älterem Gebirge, häufig mit eingesprengetem Eisenkies: Ufer des Eljudanka in Siberien; kleine Bucharei; Tibet; an mehreren Orten in China; Chili.

Wird zu Ring- und Nadelsteinen, zu Kreuzen, Ohrgehängen u. verwendet; auch zu Dosen, Vasen, kleinen Bildsäulen, Uhrgehäusen u. s. w.; selbst zu architektonischen Verzierungen und zur Stein-Mosaik gebraucht man ihn. Die wichtigste Anwendung desselben ist jedoch die zur Bereitung des ächten Ultramarins, eines sehr schönen blauen und dauerhaften Farbpigments für die Delmalerei.

118. Warnerit.

Syn. Skapolith. Spreußein. Mejonit. Schmelzstein. Pyramida-
ler Feldspath. Paranthine. Dipyre.

Kernform: gerade quadratische Säule. Gewöhnlich vorkommende Gestalten: 1) entseitet; 2) desgleichen und entran-
det zur Spizung, Fig. 119.; 3) entet zur Spizung und entse-
tet, Fig. 120.; 4) dreifach entet, die mittlere Entetung zur
Spizung, und dreifach entseitet.

Fig. 119.





Fig. 120.



Krytalle, meist in die Länge gezogen, säulenförmig, häufig mit vertikaler Streifung auf den Seitenflächen, oder mit Glimmer überzogen, nadelförmig, auf- oder eingewachsen, zu Drusen verbunden, auch durcheinander gewachsen. Derbe Massen mit körniger oder strahliger Textur.

Spaltbar parallel den Seitenflächen. Bruch: muschelig ins Anebene und Splitterige. Härte = 5 — 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 2,8 — 2,8. Durchsichtig (Mejonit) bis undurchsichtig. Glasglanz, auf Spaltungsflächen perlmutterartig, auf Bruchflächen fettartig. Wasserhell, weiß; blausich-, grünlich-, gelblich-, grau-lichweiß; gelblich-, grünlichgrau; oliven-, bl-, pistaziengrün; schwarz; braun; ziegel-, blut-, rosenroth. Die Farben meist unrein. Strich: graulichweiß.

B. d. L. schmilzt er unter Schäumen und mit Leuchten zu einem farblosen, blasigen Glase; mit Borax unter fortwährendem Brausen zu klarem Glase. Das Pulver wird von der Salzsäure zersetzt. Chem. Gehalt des Wernerits von Ershy nach Hart-
wall und des Mejonits vom Vesuv nach L. Smelin:

Kieselerde.,	43,87		40,8
Thonerde...	27,93		30,6
Kalkerde ...	20,00		22,1
Natron	2,92	u. Kali	2,4
Eisenoxydul.			1,0
Kohlensäure.	4,39		
Wasser	0,55		
	<hr/>		<hr/>
	99,66		96,9

Auf Lagern von Magneteisen und Kupferkies; Arendal;

Långbanshyttta, Malsjö und Ejösa in Schweden; Pargas und Kurilarari in Finnland; Pyrenäen; Mähren; Sterzing in Tyrol; Woborough in Massachusetts; Franklin in New-Jersey; auch in den Drusenräumen der Auswürflinge alter Eruptionen am Vesuv findet sich der Mejonit. — Der Dipyrr oder Schmelzstein kommt bei Mauléon in den Pyrenäen vor.

119. Arinit.

Syn. Thumerstein. Prismatischer Arinit. Axinit. Thumerstone.

Kernform: schiefe rhomboidische Säule. $P||M = 135^{\circ} 24'$ und $44^{\circ} 36'$; $P||T = 134^{\circ} 48'$ und $45^{\circ} 12'$; $M||T = 115^{\circ} 39'$ und $64^{\circ} 21'$. Einige der gewöhnlichsten Formen sind: 1) Kernform (Fig. 121. ohne s und x); 2) entstumpffseitig (Fig. 121. ohne x); 3) entstumpffseitig und entspizect, Fig. 121.; 4) entstumpffseitig und entlangentstumpffrandet (l), Fig. 122.

Fig. 121.





Fig. 122.



Krystalle, die Kernflächen parallel dem Rande gestreift, die andern glatt und glänzend, einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden; verb. eingesprengt.

Unvollkommen spaltbar nach P und T. Bruch: kleinschuppig bis uneben. Härte = 6,5 — 7. Spröde. Spec. Gew. = 3,2 — 3,3. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz. Nelfenbraun bis rauch-, perl- und grünlichgrau, violettblau; gelblich; weißlich. Strich: weiß.

B. d. L. schmilzt er leicht unter Aufwallen zu einem dunkelgrünen Glase; mit Borax leicht zu einem von Eisen gefärbten Glase. Säuren ohne Wirkung, aber das Pulver des geschmolzenen Arinit wird durch Salzsäure vollkommen zerlegt und bildet eine Gallerte. Chem. Gehalt nach den Analysen von Klaproth (a), Bauquelin (b) und Wiegmann (c):

	a	b	c
Kieselerde...	50,50	44	45,00
Thonerde...	16,00	18	19,00
Kalkerde...	17,00	19	12,50
Eisenoxyd...	9,50	14	12,25
Manganoxyd	5,25	4	9,00
Kali	0,25		Talkerde 0,25
Borarsäure..			2,00
	<hr/> 98,50	<hr/> 99	<hr/> 100,00

Findet sich auf Lagern und Gängen im älteren Gebirge: Gegend von Disans in der Dauphinée; Barèges in den Pyrenäen; Chamouny; St. Gotthard; Monzoni in Tyrol; Thum, Schneeberg und Schwarzenberg im Erzgebirge; Treseburg am Harz; Rongsberg in Norwegen; Poloma in Ungarn; Cornwall.

120. Turmalin.

Syn. Eöhr. Rhomboedrischer Turmalin. Tourmaline.

Kernform: Rhomboeder $P||P=133^{\circ} 13'$ über den Scheitellanten; $=46^{\circ} 47'$ über den Rand (Kupffer). Die Ableitung der secundären Gestalten von der Kernform geschieht nach dem Polaritäts-Gesetze, indem sich der obere Scheitel anders verhält als der untere, eine Eigenthümlichkeit, die wohl mit der elektrischen Kraft, welche diesem Minerale vorzüglich eigen ist, in genauem Zusammenhange steht. Doch trifft man selten beide Gipfel ausgebildet. Zu den Gestalten, welche häufig vorkommen gehören: 1) entrandet (s) und am oberen Gipfel entrandet (l) zur neunseitigen Säule, unten sind entweder die Kernflächen vorhanden, oder es tritt Entseitelung z. Verschwinden derselben ein, Fig. 123.; 2) desgleichen und oben entseitelt z. Verschw. der Scheitellanten; 3) entrandet zur sechsseitigen Säule, oben entrandet in der Richtung der Scheitellanten (o), unten entseitelt, Fig. 124.; 4) entrandet und oben entrandet zur neunseitigen

Fig. 123.




Fig. 124.





Fig. 125.



Säule, entseitelantet (n) und entseitelt (k), unten unverändert Fig. 125. u. f. w. *).

Krystalle, meist säulenartig, langgestreckt bis nadelförmig, seltener kurz und dick tafelartig, die Seitenflächen vertikal gestreift, zuweilen rauh, die anderen Flächen glatt, ein- und aufgewachsen, auch zu Drusen und Büscheln verbunden; derb, mit körniger stängelicher bis faseriger Textur, zuweilen büschel- und sternförmig auseinander laufend. Geschiebe.

Unvollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 7 — 7,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,0 — 3,3. Durchsichtig bis undurchsichtig. Glasglanz. Wasserhell, weiß, roth, blau, grün, gelb, braun, schwarz. Zuweilen läßt ein und derselbe Krystall verschiedene Farben wahrnehmen; oder verschieden gefärbte Krystalle umschließen sich gegenseitig. Strich: weiß. Dichroismus in der Richtung der Hauptaxe. Durch Erwärmen polarisch-elektrisch werdend.

B. d. L. verhalten sich die Turmaline verschieden; einige blähen sich auf und schmelzen zu einer graulichgelben Kugel, andere sind strengflüssig und geben nur eine schwarze oder gelbliche schlackige oder blässige Masse, ein anderer Theil ist unschmelzbar, schwillt etwas auf und wird weiß; mit Borax werden die verschiedenen Arten mehr oder minder leicht zu klarem Glase gelöst. Das Pulver wird von Schwefelsäure zersetzt; Salzsäure greift es nicht an. Die chemische Zusammensetzung ist noch nicht genau bekannt. Gehalt des rothen Turmalin aus Nöhren (a) und des schwarzen von Käringsbräa (b) nach C. G. Smelin, des Grünen (c) aus Brasilien nach Bauquelin und des blauen (d) von Utön nach Arfvedson.

*) No. 1 und 2 sind schwarze Varietäten, die eine von Grönland, die andere vom Spriberge; a) grüne B. vom St. Gottbard; d) rothe von Ceylan.

	a	b	c	d
Kieselerde...	42,127	38,92	40,00	40,30
Thonerde...	36,430	33,24	39,00	40,50
Kalkerde....	1,200		3,84	
Borarsäure..	5,744	0,60		1,10
Kali.....	2,450	2,53		
Lithion.....	2,045			4,30
Talkerde....		9,80		
Eisenoxyd...		7,20	12,50	4,85
Manganoxyd.	6,320		2,00	1,50
Glühverlust..	1,313	0,03		3,60
	<u>97,627</u>	<u>92,32</u>	<u>97,34</u>	<u>96,15</u>

Man unterscheidet bis jetzt gewöhnlich nach den Farben folgende Arten:

1) wasserheller Turmalin; durchsichtig; wasserhell ins Weiße. — Im Dolomit von Campolongo, im Granit auf Elba;

2) rother Turmalin (Elberit, Apyrit); pfirsichblüth-, rosen-, karmin-, rubinroth bis violettblau. — In Lepidolith und Quarz zu Rozena in Mähren; in Granit zu Miasa und Mursknitz in Siberien; Elba; Chesterfield in Massachusetts; Paris in Maine; Penig in Sachsen; als Geschiebe in Ceylan und Peru.

3) blauer Turmalin (Indikolith); indig-, lasur-, berliner- bis schwärzlichblau. — Utön; Goschen in Massachusetts.

4) grüner Turmalin: gras-, lauch-, pistazien-, oliven- bis schwärzlichgrün. — Rozena. Campolongo am St. Gotthard; Piemont; Katharinenburg; Chesterfield, Goschen, Hampshire in Massachusetts; Madagaskar. Villa Rica in Brasilien (hier als Geschiebe);

5) gelber Turmalin; honiggelb, gelblichgrün, gelblichbraun. — Smrček in Mähren; Elba; Goschen;

6) brauner Turmalin (elektrischer Schörl); leber-, gelblich-, röthlich-, schwärzlichbraun. — St. Gotthard; Elba; Ceylan;

7) schwarzer Turmalin (gemeiner Schörl); sammet- und pechschwarz. Undurchsichtig. Die Varietät, welche am häufigsten vorkommt; und zwar als wesentlicher Gemengtheil des Turmalinschiefers am Auerberg in Sachsen; eingewachsen in Granit, Gneiß, Glimmer-, Talk- und Chloritschiefer, auch in Drusenräumen und auf Gängen. Heibelberg; Andreasberg am Harz;

Freiberg, Eibenstock u. a. D. in Sachsen, Hörlberg und Zwiesel in Baiern; Pfitsch, Faltigels, Ratschinges in Tyrol; Pyrenäen; Cornwall; Käringsbrika in Schweden; Arendal und Langbän in Norwegen; Grönland; Elba; Madagaskar u. s. w.

Die Turmalin-Varietäten mit schönen, reinen Farben, namentlich die rothen, grünen und blauen, werden zuweilen zu Ring-, Nadel- und anderen Schmucksteinen verarbeitet.

121. Staurolith.

Syn. Prismatoïdischer Granat. Staurolide.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M=129^{\circ} 20'$ und $50^{\circ} 40'$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform (Fig. 126. ohne die Flächen o und r); entschärfseitig (Fig. 126. ohne die Flächen r); 3) beßgleichen und entstumpft (Fig. 126.); 4) Zwillinge der Abänderung No. 2. unter Winkeln von 90° und 60° , Fig. 127.; 5) Zwillinge von No. 3.

Fig. 126.





Fig. 127.



Nur Krystalle, verlängert in der Richtung der Hauptaxe, eingewachsen. Oberfläche: glatt oder rauh, die P-Flächen fast stets rauh, zuweilen auch ausgehöhlt; oft mit Glimmer oder Talk überzogen.

Spaltbar parallel den kleinen Diagonalen der P-Flächen, nach M sehr unvollkommen. Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 7 — 7,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,4 — 3,8. Durchscheinend an den Ranten bis undurchsichtig. Glasglanz, fettartig. Bräunlichroth, röthlich- und schwärzlichbraun. Strich: weißlich.

B. d. L. für sich unschmelzbar, jedoch dunkler werdend. Mit Borax langsam zu einem klaren, durch Eisenoryd dunkelgrün ge-

färbten Glase. Das Pulver wird durch Schwefelsäure größtentheils zerlegt. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin; Analysen zweier Varietäten vom St. Gotthard von Klaproth.

Kieselerde. 29,9	27,00	37,50
Thonerde. 50,7	52,25	41,00
Eisenoxyd. 19,4	18,50	18,25
	Manganoxyd 0,25	0,50
	Talkf.	0,50
<u>100,0</u>	<u>98,00</u>	<u>97,75</u>


Vauquelin fand in dem Staurolith der Bretagne 3,84 p. c. Talkf.

Kommt eingewachsen in Glimmer-, Talk- und Thonschiefer vor, auch in Gneiß und Granit, begleitet von Disthen, Turmalin, Granat u. s. w. Cheronico im Kanton Uri; St. Gotthard; Guimpcr und Laminée in der Bretagne (hier in großer Menge, nach der Zerstörung des Gesteins lose umherliegend); Cavalière bei Hières im Depart. du Var.; Zillerthal; Winkelsdorf in Mähren; Bieber in Hessen; Pic du Midi in den Pyrenäen; St. Jago di Compostella in Spanien; Irland; Schottland; Siberien; Nordamerika u. s. w.

122. Granat.

Syn. Dodekaëdrischer Granat. Grenat. Garnet.

Fig. 128.



Kernform: Rauten-Dodekaeder: Die Gestalten, am häufigsten vorkommend, sind: 1) Kernform, oft in der Richtung einer der Axen, welche die Rhomboeder-Scheitel verbinden, in die Länge gezogen; 2) entkantet (n), Fig. 128.; 3) beßgl. zum Verschwinden der Kernflächen.

Trapezoeder (s. Fig. 37. pg. 94.); 4) zweifach entkantet; 5) dreifach entkantet.

Krystalle, meist gestreift oder rauh, einzeln eingewachsen; krystallinische Massen mit schaliger und körniger Textur, derb, secundär in losen Krystallen, Geschieben und Körnern.

Unvollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform: Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 6,5 — 7,5. Spröde. Spec.

Gew. = 3,6 — 4,3. Durchsichtig bis undurchsichtig. Glas bis Fettglanz. Grün, gelb, roth, braun, schwarz. Strich: grau, gelb, roth, braun. Zuweilen etwas magnetisch.

B. d. L. leicht und ruhig, oder mit einigem Aufwallen, zur braunen, grünlichen oder schwarzen Kugel, die zuweilen magnetisch ist und Metallglanz zeigt; mit Borax mehr oder minder schwer, oder leicht, zu einem von Eisen gefärbten Glase; manche Pyrope ertheilen dem Borax-Glase eine schöne chromgrüne Farbe. Säuern ohne Wirkung. Die chemische Zusammensetzung der Granate ist sehr verschieden; es gibt welche, die neben der Kieselerde, Thonerde und Eisenorydul, andere, die Eisenoryd und Kalkerde ohne Thonerde, und noch andere, die Kalkerde und Thonerde fast ohne Eisenoryd enthalten, daß sich also die isomorphen Basen Thonerde und Eisenoryd einander ersetzen können, und die isomorphen Basen Kalkerde, Talkerde, Eisenorydul und Manganoorydul sich vertreten (Berzelius). Chem. Gehalt des Pyrops (a), des Granats von Engsd (b), des grünen von Hesselkulla (c) und des schwarzen von Arendal (d) nach Graf Trolle Wachtmeister:

Kieselerde	43,70	40,60	38,13	42,45
Thonerde	22,40	19,98	7,32	22,47
Kalkerde	6,72		31,65	6,53
Talkerde	5,60			13,41
Eisenorydul . . .	11,48	33,93	Eisenoryd 19,42	Oxydul 9,29
Manganoorydul	3,68	6,69	3,30	6,27
Chromoryd . . .	6,52			
	<u>100,10</u>	<u>101,37</u>	<u>99,72</u>	<u>100,44</u>

Ohne weiter auf den Gehalt Rücksicht zu nehmen, unterscheidet man gewöhnlich nach den Farben folgende Arten:

1) rother Granat (edler oder orientalischer Granat, Almandin, Pyrop. Grenat noble. Precious or oriental Garnet); blut-, kolumbin-, firsch-, braunlichroth. — Zufälliger Gemengtheil verschiedener Gebirgsmassen: von Granit, Gneiß, Glimmer-, Talk-, Chlorit-, Hornblendeschiefer, Serpentin u.; Dethal und Grainer in Tyrol; Langthol und Mussaalp in Piemont; St. Gotthard; Lobingerberg in Kärnthen; Zöblitz in Sachsen; Fahlun und Engsd in Schweden; Arendal, Kongsberg und Egg in Norwegen; Grönland u. s. w. lose im Schuttlande: Meronitz, Pod-

selbig, Scheppenthal u. a. D. in Böhmen; Granatillo bei Capo de Gata in Spanien; Ceylan Hindostan.

2) Gelber Granat (Succinit. Topazolith. Hessonit. Kannelstein. Essonite); wein-, honig-, pomeranzengelb bis hyazinth-roth. — Auf Gängen im Serpentin: Muffaalse in Piemont; in Gneiß: Rossire in Schottland; mit körnigem Kalk: Malsjöfalkbruch in Wärmeland, Kulla-Kalkbruch in Finnland; als Geschiebe im aufgeschwemmten Lande auf Ceylan.

3) Grüner Granat (gemeiner Granat z. Thl. Aylom. Grossular. Wiluit z. Thl. Alschroitt); spargel-, berg-, gras-, oliven-, lauch-, pistaziengrün; grünlichgrau ins Leberbraune. — In serpentinarartigem Gestein: Muffaalse; Monzoni in Tyrol; Dobschau, Drowicza und Eziklowa in Ungarn; auf Erzlagerstätten, oft selbst ganze Lager bildend mit Magnet Eisen, Feldspath u. Ehrenfriedersdorf, Berggießhübel, Schwarzenberg, Breitenbrunn und Seyet im Erzgebirge; Hof im Baireuthischen; Långbanshytta in Schweden; Dramen in Norwegen.

4) Brauner Granat (gemeiner Granat z. Thl. Kolophonit, Rothoffit.); die Krystalle zuweilen mit zugerundeten Kanten, wie geflossen; in Körner übergehend; krystallinisch-körnige Massen. Röthlich-, gelblich-, leber-, schwärzlichbraun. — Schriesheim und Auerbach in der Bergstraße; Sterzing in Tyrol; Speffart; Långbanshytta, Sala, in Schweden; Arendal und Dramen in Norwegen; Sibirien; Nord-Amerika; Besuw u. f. w.

5) Schwarzer Granat (Melanit. Pyrenait). Gewöhnlich krystallifirt, selten derb; sammetschwarz. — In dyleritischen Gesteinen: Frascati und Albano unsern Rom; Kaiserstuhl im Breisgau; in vulkanischen Auswürflingen: Monte-Somma; Laacher-See; auf Lagern: Arendal; Bardges in den Pyrenäen; New-Yersey.

Die schöneren Varietäten, namentlich die rothen, werden zu den verschiedensten Gegenständen des Schmucks verwendet, besonders zu Ring- und Nadelsteinen, zu Ohrgehängen, Halsketten u. f. w., schlechte Stücke werden zu Pulver gestoßen und als Schleismittel für weichere Steinarten benutzt. Manche Granaten gebraucht man als Zuschlag beim Eisenschmelzen.

123. Gheslenit.

Syn. Stylobat.

Kernform: gerade rektanguläre Säule.

Krystalle: weiß mit rauher, oder drüsigter Oberfläche, einzeln ein- oder auf- und ineinander gewachsen; verb.

Spaltbar parallel den Kernflächen, am deutlichsten nach P. Bruch: muschelrig ins Unebene. Härte = 6. Spröbde. Spec. Gew. = 2,89 — 3,02. An den Ranten durchscheinend. Schimmernd. Fettglanz. Oliven-, lauch-, braunlichgrün; grau; graulichweiß. Strich: weiß.

B. d. L. für sich unschmelzbar; mit Borax schwer zu einem von Eisen gefärbten Glase auflösbar. Das Pulver wird von Salzsäure leicht aufgelöst und bildet eine vollkommene Gelserte. Chem. Gehalt nach v. Kobell:

Rieselerde	31,0
Thonerde	21,4
Kalkerde	37,4
Eisenoxydul	4,4
Wasser	2,8
	99,6


In Kalkspath am Monzoniberg in Tyrol.

124. Idocras.

Syn. Vesuvian. Wiluit z. Tb. Egeran. Epprin. Pyramidaler Granat. Idocrase.


Kernform: gerade quadratische Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseitet; 3) beßgl. und enteckt (ähnlich Fig. 120. pg. 214., nur ist noch ein Theil der P-Flächen vorhanden); 4) dreifach entseitet (d h h') und enteckt (c) (Fig. 129. ohne s s'); 5) dreifach entseitet und dreifach enteckt (c s' s), Fig. 129.; 6) entseitet, enteckt und entrandet (o) (Fig. 129.

Fig. 129.



Dinn, Dryptognoße.

Fig. 130.



ohne h h); 7) dreifach entsetzt; entsetzt u. entrandet; Fig. 130. u. f. w. (aus dem mit einem ...)

Kristalle, meist kurz säulenförmig, zuweilen uneben über gekrümmt, mit starker vertikaler Streifung auf den Seitenflächen, Kanten eingewachsen und rundum ausgebildet, oder aufgewachsen und zu Drüsen verbunden; zerbröckelnde Massen mit kugelförmiger Textur und büschelweise gruppiert (Sphäran).

Spaltbar nach den Seiten- und den Diagonalen der Flächen. Bruch: unvollkommen muscheliger bis uneben. Härte = 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,1 — 3,4. Durchsichtigkeit bis an den Ranten durchscheinend. Glas- oder Fettglanz; Trübe, rötlich, gelblich, schwärzlichbraun; oliven-, pistazien-, schwärzlichgrün; smaragdblau bis spangrün (Cyprin). Strich: weiß.

B. d. L. sehr leicht und unter Aufschäumen zu einem bräunlichen oder grünlischen Glase, oder zu einer blasigen Perle, die im Drydationsfeuer schwarz, im Reduktionsfeuer rötlich weiß (Cyprin); mit Borax leicht zu klarem Glase. Nach starkem Glühen oder Schmelzen ist er leicht in verdünnter Salzsäure löslich und bildet eine Gallerte. Chem. Gehalt nach v. Kobell:

Kieselerde. 37,644

Thonerde. 15,418

Kalkerde. 38,240

Eisenoxyd. 7,151

98,453

Eisenerde, Mangan- und Kupferoxyd sind zuweilen dem Spodumene beigemengt.

Er findet sich an der Myssaspe in Piemont; zu Egg und Sausland in Norwegen; Wilui in Sibirien; Monzoni in Tyrol; Drawicza im Banat; Frugard in Finland; Haslau bei Eger in Böhmen; in den Auswürflingen älterer Eruptionen am Monte Somma u. f. w.

Er wird zumellen zu Nadeln und Nadelsteinen verarbeitet; im Handel verkauft man ihn unter dem Namen ägyptische Gummie und Spynschich.

125. Epidot.


Syn. Pistazie. Chalk. Urandalit. Zoisit. Piemontescher Brandstein. Prismatidolith. Augitspath. Epidote.

Kernform: gerade rhomboidische Säule: $M \parallel T = 118^\circ 24'$ und $64^\circ 36'$. Vorkommende Gestalten: 1) entschärfteitet (r) und entspizect (n), 3. Schärfling über P., Fig. 131.; 2) desgl. und entbreitenrandet; 3) entschärfteitet (r), entspizect (n) und entrandet (o und s), Fig. 132.; 4) zwelfsch entschärfteitet, zwelfsch entspizect, zwelfsch entlängenrandet und entbreitenrandet; 5) entschärfteitet, entspizect und entlängenrandet u. s. w.; auch Zwillinge kommen vor.

Fig. 131.



Fig. 132.



Kristalle, säulenartig, glatt, meist aber mit starker vertikaler Streifung auf den Seitenflächen, zuweilen haar- oder nadelartig, eingewachsen, schiffartig auf, auch durcheinander gewachsen und zu Drüsen verbunden; krystallinische und dichte Massen mit fänglicher, faseriger und körniger Textur; dicht; eingesprengt.

Spaltbar parallel den Seitenflächen, am deutlichsten mit T. Bruch: uneben bis splittigerig. Härte = 5,5 — 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,26 — 3,42. Halbdurchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz, auf den Spaltungsflächen lebhaft und perlmutterartig. Pistaziengrün bis schwärzlichgrün; bl., zeisig-, berggrün; rauch-, blaulich- und gelblichgrau ins Graulichweiße (Zoisit); röthlich- und gelblichbraun, röthlichschwarz (Mangan-Epidot). Strich: graulichweiß.

B. d. L. theils sehr schwierig in dünnen Splitten zu klarem Glase (Trist), oder zur schwarzen Masse (Wistazit); theils leicht zu schwarzem Glase (Mangan-Epidot) schmelzbar; mit Borax werden die beiden ersten Arten, unter Aufschwellen, der eine zu einem klaren, der andere zu einem von Eisen gefärbten Glase aufgelöst, die dritte Art unter Brausen zu einem klaren Glase, das in der äußeren Flamme Amethystfarbe annimmt. Phosphorsalz zerlegt den Epidot mit Hinterlassung eines Kiesel-Sesquits. In chemischer Hinsicht unterscheidet man Kalk (a), Eisen (b) und Mangan-Epidot (c), je nachdem die isomorphen Elemente der Kalkerde, Eisen- und Manganorydul, oder jene der Alaunerde Eisenoryd vorherrschen. Chem. Zusamm. derselben nach L. Gmelin:

	a	b	c
Kieselerde	43,7	41,9	39,4
Thonerde	30,9	26,8	14,0
Kalkerde	25,4	14,6	45,3
Eisenoryd		12,2	
Eisenoryd		4,5	21,4
Manganorydul			9,9
	100,0	100,0	100,0

Findet sich theils zufällig verschiedenen krystallinischen Gesteinsarten beigemengt, theils auf Lagern oder auf Gängen, seltener in den Blasenräumen mancher Mandelsteine: Arendal in Norwegen; Allemont in der Dauphinée; Gustafsberg und Norberg in Schweden; Mussa alpe und St. Marcel in Piemont; St. Gotthard; Schriesheim in Baden; Fichtelgebirge; Breitenbrunn, Schwarzenberg und Bergschädel in Sachsen; Ebnatal und Radelgraben in Kärnten; Bacher Gebirge in Steyermark; Pinzgau in Salzburg; Wonzont und Sterzing in Tyrol; Ungarn; England; Schottland u. s. w. — Der sandige Epidot (Eforza) findet sich in den Goldseifen von Muska in Siebenbürgen.

Wird da, wo er mit Eisenerzen vorkommt, als Zuschlag beim Schmelzen derselben verwendet.

126. Sausfurit.

Syn. Magerer Nephrit. Jade.

Kernform: rhombische Säule. $M \parallel M = 124^\circ$; unfähig, durch Spaltung erhalten.

Krystallinische Massen, mit blätteriger oder körniger Textur. *Derb.*

Spaltbar parallel den Seitenflächen. Bruch: uneben ins Splittetige. Härte = 5 — 6. Spec. Gew. = 2,25 — 3,34. An den Kanten durchscheinend; Glasglanz, auf den Spaltungsflächen perlmuttartig. Weiß ins Verggrüne; grünlich-, asch- und blaugraue Strich weiß.

B. d. L. schwierig zu weißem Schmelz, oder zu klarem bläulichen Glase schmelzend; mit Borax zu wasserhellem Glase. Chem. Gehalt nach L. de Saussure:

Kieselerde . 44,00

Thonerde . 30,00

Kalkerde . 4,00

Natron ... 6,00

Eisenoxyd . 12,50

96,50

Klaproth fand noch 3,75 p.c. Kalkerde;

Als wesentlicher Gemengtheil des Gabbros; Bacher-Gebirge in Steyermark; Ufer des Genfer-Sees; Saasser-Thal im Wallis; Mont-Rosa; Turin; Korsika; Eppenreuth im Fichtelgebirge; Smithfield, Easton u. a. D. in Nord-Amerika.

127. Labrador.


Syn. Labrador. Feldspath. Feldspath opalin. Labrador-Felspar.

Fig. 133.

Kernform: schiefe rhomboidische Säule. $P||M = 115^\circ$ und 65° ; $P||T = 85^\circ 30'$ und $94^\circ 30'$; $M||T = 119^\circ$ und 61° . H. Rose beobachtete eine Form ähnlich Fig. 94. pg. 184.; die Gestalten, welche ich an dem Labrador von Monte-Pisleri fand, sind 1) entschärft (l), entspißet (y) und entseitenet zur Schärfung über P. (n und s),

Fig. 133.; 2) Zwillinge dieser Varietät; und zwar sind diese häufiger als die einfache Form.

Krystalle äußerst selten, krystallinische Massen, bei welchen sich große Neigung zur Zwillingbildung verräth, indem si: fast



stets aus zwollingsartig verwachsenen Individuen bestehend; Textur blätterig.

Spaltbar parallel den Kernflächen; vollkommen mit H. Bruch: muscheligen. Härte = D. Spröde. Spr. Gew. 2,68 — 2,75. Durchscheinend. Glasglanz, zuweilen perlmuttartig. Aschgrau-, gelblich-, rüthlichgrau; weiß. In der Richtung der Flächen lebhaftere Farbenwandlung in blau, grün, gelb, roth und braune Farben. Geruch: weiß.

B. u. L. verhält er sich wie Feldspath. Das Gips in erhöhter concentrirter Salzsäure unlöslich. Chem. Zusamm. nach Gmelin:

Kieselerde 54,6

Thonerde 29,0


Kalkerde. 11,8

Natron.. 4,6

100,0

Findet sich in stumpfeckigen Stücken und Geschlehen an der Küste von Labrador; und auf der St. Pauls-Insel; er scheint hier einen wesentlichen Gemengtheil des Hypersthen-Syenits auszumachen; wie dies auf der Insel Ekhe, zu Porkoy in Schottland, im Veltlin und in Schlessen der Fall ist; ferner kommt er vor in Ingermanland, zu Peterhof in Finnland, zu Miold bei Sweaborg, am Ufer der Poulskovka. Der feldspathige Gemengtheil der meisten Syenite, Dolerite, so wie vieler Diorit- und Gabbro-Arten möchte Labrador seyn; wie dies wohl auch bei manchen Laven der Fall ist. Ausgezeichnet kommt er ausgewittert aus Laven am Monte Pilieri bei Nicosia in der Nähe des Aetnas vor.

Fig. 134.



428. Northit.

Kernform: schiefe rhomboidische Säule. $P||M=110^{\circ} 57'$ und $69^{\circ} 3'$; $P||T=85^{\circ} 48'$ und $94^{\circ} 12'$; $M||T=117^{\circ} 28'$ und $62^{\circ} 32'$. Vorkommende Gestalten: 1) entschärft (l), entstumpft (t) und entbreitenrandet (n und e), Fig. 134.; 2) entschärft z. Versch. von T., entspitzt, entstumpft, entbreitenrandet und entlängenschärfrand-

bet; 3) Zwillinge und verschiedene andere Gestalten.

Kristalle aufgewachsen und zu Drusen verbunden; krystallinische Massen mit körniger Textur.

Vollkommen spaltbar parallel P₁ und T₁. Bruch muschelartig. Härte = 6. Spröde. Spec. Gew. = 2,65 — 2,76. Durchsichtig. Glasglanz, auf den Spaltungsflächen Perlmutterglanz. Wasserhell, weiß. Strich: weiß.

B. d. L. verhält er sich wie Felspath, mit Soda gibt er jedoch kein Klares, sondern ein emailweißes Glas. In konzentrierter Salzsäure ist er völlig auflösbar. Chem. Gehalt nach G. Rose:

Kieselerde. 44,49

Thonerde. 34,46

Kalkerde. 15,68

Ealkerde. 5,26

Eisenoxyd. 0,74

100,63

Findet sich in den Drusenräumen von Dolomitblöcken am Monte Somma.

129. Meer Schaum.

Syn. Magnesie carbonatée silicifère spongieuse. Ecume de mer. Sea-foam.

Aster-Krystalle nach Kalkspath-Formen, derbe und knollige Massen.

Bruch: eben ins Muschelartige. Härte = 2,5. Spec. Gew. = 1,27 — 1,6. Undurchsichtig. Matt. Weiß; gelblich, rötlich, graulichweiß. Strich: weiß und etwas glänzend. Mager anzufühlen. Stark an der feuchten Lippe hängend.

B. d. L. schrumpft er zusammen und schmilzt an dünnen Kanten zu weißem Email; mit Borax zu klarem Glase auflösbar. Im kochenden Wasser gegend. Mit Säuren Gallerte bildend. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde 55,8

Ealkerde. 23,3

Wasser. 20,9

100,0

Findet sich auf Lagern: Libadien; Megroponte; Natolien;

Spanien (Cábas in Toledo, Baléas bei Madrid); Portugal, Krimm.

Wird, besonders in der Türkei, zur Fabrication von Weisenköpfen verwendet.

130. Speckstein.

Syn. Seifenstein. Tale stéatite. Stéatite. Soapstone.

Pseudomorphosische Krystalle nach Quarz, Kalkspath, zuweilen auch nach Feldspath, Idokras oder Staurolith-Formen; berbe Massen, nierenförmig, traubig, stalaktitisch, eingesprengt; dicht.

Bruch: splitterig ins Unebene. Härte = 1,5. Milde. Spec. Gew. = 2,6 — 2,8. Durchscheinend an den Kanten. Matt, zuweilen fettartiger Glanz. Weiß; gelblich, graulich, grünlich, röthlichweiß; seladon-, oliven-, pistazien-, schwärzlichgrün. Strich: weiß und etwas glänzend. Nicht an der feuchten Lippe hängend. Fett anzufühlen.

B. d. L. verhält er sich wie Meerschäum; gibt aber im Kolben mehr Wasser als dieser. Chem. Zusammens. nach L. Gmelin:

Rieselerde 52,4

Kalkerde. 32,8

Wasser.. 14,8

100,0

Enthält zuweilen noch etwas Thonerde, Kalkerde und Eisenoryd beigemischt.

Auf Gängen in Felsarten verschiedener Perioden, seltener auf Lagern. Wunsiedel im Baireuthischen; Oberpfalz; Ehrenfriedersdorf und Altenberg in Sachsen; Schminz; Mostathal in Piemont; Monte Frassineto in Parma; Cornwall; Schottland; Salberg und Taberg in Schweden; Färder; Siberien u. s. w.

Der Pimelit von Rosemüh in Schlesien ist ein durch Nickeloryd berg- oder apfelgrün gefärbter Speckstein. — Der Cerolith von Frankenstein in Schlesien gehört ebenfalls hierher.

Er wird zum Ausmachen der Flecken in wollenen und seidenen Zeugen verwendet; zum Putzen der Tressen; zum Poliren

des Chyfes, Serpentin und Marmors; mit Oel angerieben zur Politur der Spiegelgläser und Metallspiegel; zum Zeichnen auf Tuch und seidenen Zeugen (spanisch, venetianische, belaconer Kreide); auch läßt er sich zu Pfeifenköpfen, Schreibzeugen und dergl. verarbeiten u. s. w.

131. Ophit.

Syn. Edler Serpentin. Pitrolith, Weisktein z. Th. Precious Serpentine. Axestone.

Pseudomorphosische Krystalle nach Olivin-, Augit- und Hornblende-Formen; derbe Massen mit körniger oder faseriger, oft zart und büschelweise auseinander laufender Textur: dicht; eingesprenkt.

Bruch: flachmuschelig ins Unebene und Splitterige. Härte = 5. Milde. Spec. Gew. = 2,5 — 2,6. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Schwacher Fettglanz, matt. Schwärzlich-, lauch-, pistazien-, oliven-, bl-, zeisigrün; schwefel-, strohgelb; gelblich-, leberbraun; braunlich- bis blutroth; zuweilen gefleckt, geädert, gestammt. Strich: weiß und etwas glänzend. Wenig fett anzufühlen.

B. d. L. schmilzt er an dünnen Ranten zu einem Email; mit Borax langsam zu einem klaren, grünlichen Glase auflösbar. Mit Kobaltsolution gibt er ein schwaches Roth. Im Kolben wird er schwarz und gibt Wasser. Chem. Gehalt des sogenannten edlen Serpentin (a) nach Hartwall, des Pitroliths (b) nach Stromeyer und eines Serpentin von Sala (c) nach Lychneff:

	a	b	c
Kieselerte	42,97	41,66	42,16
Tallerde .	41,66	37,16	42,26
Wasser ..	12,02	14,72	12,33
Eisenoxyd	2,48	4,05	1,98
Thonerde	0,87	Chromoxydul 2,25	Bitumen-, Koh-
			lensäure und
			Verlust.
	100,00	99,84	100,00

Findet sich in gemeinem Serpentin (Serpentinfels), in kör-

nigern: Balf., auf schmalen Gengsträmmern u. s. Reichenstein, in Schloffen; Böhlich und Penig in Sachsen; Lettowitz und Trebitz in Mähren; Rudolphstein unfern Hof im Böhmergebirge; Fahlun, Taberg, Soderfjä und Gole in Schweden; Glenthill in Schottland; Piemont; Corsika; Cornwall; Massachusetts.

132. Taff.

Syn. Prismatischer Talkglimmer z. Th. Natrit. Tale.

Fig. 135.



Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M=120^\circ$ (ungefähr). Bis jetzt nur in dünnen tafelartigen Krystallen beobachtet und zwar am häufigsten die Entschärfseitung. (r), Fig. 135., so daß die

Tafeln sechsseitig erscheinen.

Krystalle, meist klein und selten deutlich, mit glatten P-Flächen und horizontal gestreiften Seitenflächen, tafelartig, keilförmig verschmälert und um eine gemeinschaftliche Axe fächerartig gruppiert, wodurch nierenförmige und traubige Zusammensetzungen entstehen; groß- oder krummbliättrige Massen; schuppige, faserige oder schieferige Aggregate; derb, eingesprengt als Ueberzug.

Sehr vollkommen spaltbar nach P. Bruch: uneben, selten wahrnehmbar. Härte = 1 — 1,5. Milde, aber zähe. In dünnen Blättchen biegsam. Spec. Gew. = 2,74. Durchsichtig bis durchscheinend, mit zweiariger doppelter Strahlenbrechung. Perlmuttersglanz. Wasserhell (selten und nur bei kleinen Krystallen), weiß, graulich-, gelblich-, blaulich-, grünlichweiß; spargel-, apfel-, lauchgrün, zuweilen ins Blaue; die Farben meist lichte. Strich: weiß oder bläßgrün. Fett anzufühlen.

B. d. L. entblättert er sich, wird weiß, schmilzt aber nicht; mit Borax unter starkem Brausen, leicht zu einem klaren Glase auflösbar, mit Phosphorsalz gibt er unter Brausen ein durchscheinendes Kiesel skelett und ein opalisirendes Glas, mit Kobalt-solution ein sehr blaßes Roth. Im Kolben kein Wasser gebend, Säuren ohne Wirkung. Chem. Gehalt einer Varietät vom Gottshard (a) nach Klapproth, und einer vom Grainer (b) nach v. Kobell:

Rieselerde....	62,00	62,8
Talkerde	30,50	32,4
Eisenoxydul .	2,50	1,6
Kali	2,75	1,0
Verlust.....		2,3
	97,75	100,1

Bildet, als sogenannter Talkschiefer, ganze Gebirgsmassen; findet sich ferner auf Gängen und Drusenräumen im älteren Gebirge: St. Gotthard, Grainer u. a. D. in Tyrol; Mautern und Herberstein in Steyermark; Salzburg; Böhmen; Sachsen; Bodenmais in Baiern; Münstalpe in Piemont; Schottland. Grönland u. s. w.

Der Topfstein scheint ein Gemenge von Talk, Chlorkalium und Asbest zu seyn; er bildet mächtige Lager im älteren Gebirge: Schweiz, Finsland, Grönland u. s. w.

Der Talk wird zu Schminke, der Topfstein zur Fertigung von Kochgeschirren, Krügen, Oefen u. dergl. mehr verwendet.

133. Picrosmine.

Kernform: gerade rektanguläre Säule, durch Spaltung erhalten.

Krystallinische, auch körnige Massen.

Spaltbar parall. den Seitenflächen, am deutlichsten mit T. Bruch; uneben. Härte = 3,5. Milde. Spec. Gew. = 2,59 — 2,66. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Perlmutterglanz auf den vollkommenen Spaltungsflächen, auf den übrigen glasartig glänzend. Grünlichweiß; graulich, berg-, eis-, sand- oder schwärzlichgrün. Strich: weiß.

B. d. L. wird er weiß gebrannt, ohne zu schmelzen; mit Borax zu einem klaren Glase lösbar. Im Kolben gibt er Wasser, schwärzt sich und riecht angebrannt. Chem. Gehalt nach Magnus.

Rieselerde	54,886
Talkerde	33,348
Wasser	7,301
Eisenperoxyd.	1,399
Mangan-Protoxyd	0,420
Thonerde	0,792

98,146

4. Augit.

Syn. Gemeiner Augit. Pyroxène résinite.

Krystalle in den Varietäten No. 4 — 7, oft abgerundet an den Ranten, wie geflossen, einzeln oder zu mehreren eingewachsen, selten aufgewachsen oder zu Drüsen verbunden; krystallische Massen, verb. eingesprengt, auch in losen Krystallen und Körnern. Undurchsichtig. Raben- und pechschwarz; schwärzlich-, dunkellauchgrün.

Findet sich als eigenthümliche Felsart, Augitfels, Eherzolith, am Eherz-See und im Thale Viechessos in den Pyrenäen; als wesentlicher Gemengtheil des Dolerits, Basalts, Augit-Porphyr und der Lava, häufig die Krystalle porphyrartig in denselben eingewachsen. Fundorte ausgezeichnetet Krystalle sind: Kaisersstuhl im Breisgau; Maar im Bogelsgebirge; Rhöngebirge; Habichtswald; Bilin in Böhmen; Sachsen; Fassathal; v. O. in der Auvergne; Frascati bei Rom; Ebinburg; die Laven des Vesuv, Aetna, jene von Teneriffa, Bourbon u. s. w. Auch auf Lagern im älteren Gebirge wird er getroffen: Arendal in Norwegen; Wermeland; Bolton in Nordamerika. — Der in Basalt, Dolerit oder Augit-Porphyr eingewachsene Augit ist nicht selten eigenthümlichen Veränderungen, mit Beibehaltung seiner Form, unterworfen; er wird zu Grünschiefer (Fassathal) oder zu einer thonigen Substanz umgewandelt (Bilin; Eibenstock, Borsdorf und Osbornhan im Erzgebirge).

5. Kalkolith.

Syn. Körniger Augit. Caecolite.

Krystalle in der Form No. 8., selten, rauh mit abgerundeten Ranten und Ecken, wie geflossen, in Körner übergehend, einzeln eingewachsen oder zu Drüsen verbunden; berbe Massen mit ausgezeichnetet körniger Zusammensetzung, wobei sich die einzelnen Individuen leicht absondern lassen. Durchscheinend bis undurchsichtig. Berg-, lauch-, oliven-, pistazien-, schwärzlichgrün; grünlich-schwarz; gelblichgrün; braunlich.

Findet sich mit Magnetkies, Kupferkies auf Lagern, auch eingewachsen in körnigem Kalk; Arendal in Norwegen; Svärdsjö, Lindbo-Kalkbruch und Hällesjö in Schweden; Gröby in Finkönd; Rundo-Ö bei Grönland; Nordamerika.

6. Diallag.

Syn. Metallisirender Diallag. Diaklas. Diallage métalloide z. Th.

Kry stallen, äußerst selten in der Form No. 6. meist kry stallinische Massen mit ausgezeichnet geradblättriger Struktur, selten gebogen oder krummschalig. An den Kanten barscheinend. Auf den vollkommenen Spaltungsflächen lebhafter Perlmutterglanz, häufig metallartig, auf den anderen oft nur schimmernd; berg-, oliven-, lauchgrün; grünlich-, tombakbraun; grau; grünlichgrau.

Findet sich als wesentlicher Gemengtheil des Gabbros, häufig mit Hornblende verwachsen: Baste am Harz; Prabo in Toscana; Matrey in Tyrol; Wurlitz im Fichtelgebirge; Zobtenberg und Borspersdorf bei Neurode in Schlesien; Marmels in Graubünden; Corsika; Elba; Cap Lizard in England; Gegend von Portsoy in Schottland.

Der sogenannte Smaragd it (Omphazit z. Th. Diallage verte.) ist ein bloßes Gemenge von gewissen Augit- und Hornblende-Arten.

7. Bronzit.

Syn. Blättriger Anthophyllit. Hemiprismatischer Schiller-spath. Diallage métalloide.

Kry stallinische Massen. Textur blättrig, häufig gebogen und krummschalig, auch ins Faserige übergehend. Durchscheinend, meist nur an den Kanten. Auf den vollkommenen Spaltungsflächen Perlmutterglanz, selten metallartig. Tombak-, nelfen-, leber-, haar-, gelblichbraun; asch-, gelblich-, grünlichgrau; bronzgelb.

Mit Olivin in Basalt eingewachsen: Stempel bei Marburg in Hessen; in Serpentin: Kraubat und Bacher-Gebirge in Steyermark; Kupferberg im Baireuthischen; Schottland; in Kollstücken eines olivinähnlichen Gesteins: Seefeldalp im Utenenthal in Tyrol.

8. Hypersthen.

Syn. Labradorische Hornblende. Paulit. Prismatoidischer Schiller-spath. Hypersthene. Labrador. Schiller-Spar.

Kry stallinische Massen mit blättriger Textur. Undurchsichtig,

höchstens in dünnen Splittern durchscheinend. Metallartiger Perlmutterglanz auf den vollkommenen Spaltungsflächen, sonst glasartig. Graulich-, grünlich-, braunlichschwarz, mit kupferrother und tombackbranner Farbenwandlung auf den vollkommenen Spaltungsflächen.

Als wesentlicher Gemengtheil des Hypersthen-Eyenits: Küste Labrador und St. Paulsinsel (hier auch häufig als Geschiebe); Insel Ekye und Portsoy in Schottland; Bergens-Halbinsel in Norwegen; Västlin; Cornwall; Grönland; Schlessen.

Der Hypersthen wird zu Ring- und Halsnadelsteinen und anderen Bijouterie-Gegenständen verarbeitet.

136. Hornblende.

Syn. Hemiprismatischer Augitspath. Amphibole.

Kernform: schiefe rhombische Säule (Fig. 16. pg. 21.).
 $M \parallel M = 124^\circ 30'$ und $55^\circ 30'$; $P \parallel M = 103^\circ 1'$ und $76^\circ 59'$. Vorkommende Gestalten: 1) entseitenect (l) z. Schärfung über P., Fig. 143.; 2) entseitenect (l) und entmittelseitet (s), Fig. 144.; 3) entseitenect z. Schärfung über P. und entnebenseitig (x), Fig. 145.; 4) d.ßgl. und entmittelseitet; 5) entseitet und entseitenect; 6) entschärfandect (r) und entnebenseitig, Fig. 146.; 7) entnebenseitig, entrandet und zweifach entseitenect; 8)

Fig. 143.




Fig. 145.




Fig. 144.




Fig. 146





Fig. 147.



noch mehrere andere Combinationen, auch Zwillinge verschiedener Formen, wie unter andern häufig von No. 6. Fig. 147.

Krystalle, theils kurz und dick, theils lang und dünn-säulenartig, auch nadel- und haarförmig, häufig mit vertikaler Streckung auf den Seitenflächen, rauh mit zugerundeten Kanten und Ecken, wie geschmolzen, ein- und auf-, auch durcheinander gewachsen; krystallinische Massen, verb, eingesprengt. Textur: blätterig ins Strahlige und Faserige.

Sehr vollkommen spaltbar parallel den Seitenflächen; un-
deutlich nach den Diagonalen der Endflächen. Bruch: uneben.
Härte = 5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 2,9 — 3,2. Durchsich-
tig bis undurchsichtig. Glas-, auch Perlmutterglanz. Weiß, grau,
grün, braun, schwarz. Strich: graulichweiß bis braun.

B. d. L. mit oder ohne Anschwellen, theils leicht, theils
schwer zu einem weißlichen, grauichen oder schwarzen Glase
fließend; mit Borax zu einem klaren, farblosen oder von Eisen
gefärbten Glase auflösbar. Säuren ohne Wirkung. Die reinen
Hornblende-Arten sind Verbindungen von kiesel-saurer Kalkerde
mit kiesel-saurer Talkerde; allein häufig ist ein Theil der Kalk-
und Talkerde durch Eisen- und Manganoryd, und der Kiesel-
erde durch Thonerde ersetzt. Chem. Gehalt der Hornblende von Nord-
mark (a) und des Grammatits von Gulsjö (b) nach von Bons-
dorff, des Strahlsteins vom Taberg (c) nach Arfvedson
und des Anthophyllits (d) nach L. Gmelin:

	a	b	c	d
Kieselerde.....	48,83	59,75	59,75	56
Talkerde.....	13,64	25,00	24,10	23
Kalkerde.....	10,16	14,11	14,25	2
Eisenorydul...	18,75	0,50	3,95	13
Manganorydul	1,15		0,31	4
Thonerde.....	7,48	Spur		3
Flußsäure....	0,41	0,94	0,76	
Wasser.....	0,50	0,10		
	<u>100,89</u>	<u>100,40</u>	<u>100,12</u>	<u>101</u>

Arten:

1. Grammatit.

Syn. Tremolit. Amphibole fibreux.

Krystalle, selten ausgebildet, meist stängelich und nadel-
förmig, zuweilen gebogen, eingewachsen; häufiger krystallinische Mas-
sen mit auseinanderlaufend strahliger und faseriger Zusammen-
setzung. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz, häufig
perlmutter- oder seidenartig. Graulich-, gelblich-, grünlich-, röth-
lichweiß, rauchgrau; spargel-, lauchgrün; blaß violblau.

Findet sich meistens eingewachsen in körnigem Kalk und Do-
lomit: Campo-longo am St. Gotthard; Pfätsch, Schneeberg und
Klausen in Tyrol; Upsala, Philippsstadt u. a. O. in Schweden;
Norwegen; Schottland; Dognaczka und Drawizza im Bannat;
Siberien; Konestikut.

2. Strahlstein.

Syn. Kalamit. Byssolith. Actinote. Amphibole actinote. Actynolite.

Krystalle, langstängelich, nadel- und haarförmig, zuweilen ge-
bogen oder gebrochen, eingewachsen; krystallinische Massen mit
büschelförmiger oder verworrenen, auch mit strahliger und faseri-
ger Zusammensetzung. Durchscheinend. Glasglanz, zuweilen sei-
denartig. Berg-, oliven-, bl-, lauch-, gras-, schwärzlichgrün;
grünlichgrau; braun.

Findet sich auf Erzlagerstätten im älteren Gebirge: Breiten-
brunn, Ehrenfriedersdorf und Raschau in Sachsen; Arendal in
Norwegen; Baldenz in Tyrol; Westmoreland; Wärmeland;
Oisans in der Dauphinée; in Talkschiefer eingewachsen: Zillerthal in
Tyrol; Brücke Tremola, Zumborf, Eginenthal, Begezzathal u. a.
O. in der Schweiz; Fahlun in Schweden; Orijerfoi in Finland;
Schottland u. s. w.

3. Hornblende.

Syn. Gemeine und basaltische Hornblende. Pargasit. Karinthia.

Krystalle, meist kurz und dick, seltner nadelförmig, zuweilen
mit abgerundeten Ecken und Kanten, wie geschmolzen, einzeln
ein-, selten durcheinander gewachsen und zu Drusen verbunden;
lose; krystallinische Massen; derb; eingesprengt. Glasglanz, häu-
fig perlmutterartig. Undurchsichtig bis an den Kanten durch-

scheinend. Raben-, pechschwarz; schwärzlich-, dunkel-, lauch-, pistazien-, blaulichgrün; grünlichweiß; braunlichschwarz. Manche Abänderungen entwickeln nach dem Anhauchen oder Befeuchten einen bitterlichen Geruch.

Allgemein verbreitet; bildet eigene Felsmassen als Hornblende-Gestein und Hornblende-Schiefer, hilft als wesentlicher Gemengtheil manche Gebirgsarten zusammensetzen, wie den Eyenit, Diorit, Aphanit u. s. w. oder findet sich als zufälliger Gemengtheil in Granit, Glimmerschiefer u., häufig in Krystallen eingewachsen in Basalt und Dolerit: Kaiserstuhl; Rhöngebirge; Vogelsgebirge; Habichtswald; Kostenblatt und Czernuzin in Böhmen; Carboneira am Cabo de Gata in Spanien; im körnigen Kalk zu Pargas in Finland; ferner trifft man die Hornblende, jedoch seltner, auf Lagern oder Gängen: Marienberg und Freiberg in Sachsen; Steyermark; Canalpe in Kärnthen; Ziller- und Pusterthal in Tyrol; Arendal und Kongsberg in Norwegen; Fahlun u. v. a. D. in Schweden; Pyrenäen; Schottland u. s. w.

Die Hornblende wird da, wo sie in größeren Massen vorkommt, als Zuschlag beim Eisenschmelzen verwendet, auch auf Glashütten wird sie zur Fertigung des grünen Bouteillen-Glases gebraucht.

4. Anthophyllit.

Syn. Prismatischer Schillerspath.

Krystallinische Massen mit blätteriger und strahliger Zusammensetzung, zuweilen schilfartig. Durchscheinend, meist nur an den Ranten. Glasglanz, häufig perlmutterartig. Gelblichgrau; nelfenbraun; lauch-, pistazien-, schwärzlichgrün; selten in schöner blauer Farbe spielend.

Auf Lagern in älterem Gebirge: Kongsberg in Norwegen; Helsingfors in Finland; Regen in Baiern; Grönland; Sibirien.

Anhang.

Asbest.

Früher wurde der Asbest als eigene Gattung aufgeführt, allein er dürfte wohl zum großen Theil als höchst feinfaserige Abänderung der Hornblende zu betrachten seyn; gewisse gemeine Asbestarten gehören wahrscheinlich zum Pykrosmin.

a) *Amiant*h.

Syn. Biegsamer Asbest. *Asbeste flexible. Amianthus.*

Haarförmige Krystalle, auf- und durcheinander gewachsen; berbe Massen mit höchst feinfaseriger Zusammensetzung; die Fasern lose und leicht trennbar, weich und elastisch-biegsam. Halbdurchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Seidenglanz. Graulich-, gelblich-, röthlichweiß; grünlichgrau; berg-, olivengrün; braunlich; selten roth.

Auf schmalen Gängen in Serpentin und in verschiedenen abnormen Gebirgsarten: Tyrol; Piemont; Wallis; St. Gotthard; Vallée de Serre und de St. Foix in Savoyen; Disans in der Dauphinée; Corsika; England; Schottland; Sachsen; Schlesien u. s. w.

b) *Asbest*.

Syn. Gemeiner Asbest. *Asbeste dur. Common Asbestos.*

Selten in haarförmigen Krystallen, häufiger in berben Massen mit gerade- oder krummfaseriger Zusammensetzung, die Fasern fester verbunden und spröde. Durchscheinend bis undurchsichtig. Perlmutter- und Seidenglanz. Rauch-, berggrün; grünlich; gelblichgrau.

Findet sich vorzüglich auf kleinen Gängen und Schnüren in Serpentin, auch auf mächtigen Eisen- und Kupfererz-Lagern. Er ist sehr verbreitet und kommt unter andern ausgezeichnet vor: zu Zöblitz in Sachsen; Reichenstein in Schlesien; Levitschneet in Steyermark; Matrey, Pfitsch, Grainer u. a. D. in Tyrol; Treseburg und Baste am Harz; St. Gotthard; Piemont; Schweden; Norwegen; Portsoy und die Shetland-Inseln in Schottland; Cornwall; Sibirien u. s. w.

c) *Bergholz*.

Syn. Holzasbest. *Asbeste ligniforme. Lignous Asbestos.*

Berbe, plattensförmige Massen; Textur zart- und untereinander laufend faserig. Die Fasern ziemlich fest zusammenhängend; trennbar in Stücke wie Holzsplitter; elastisch biegsam. Undurchsichtig, in dünnen Stücken etwas durchscheinend. Matt. Holzbraun. An der feuchten Lippe hängend.

Kommt zu Schneeberg in Tyrol, wahrscheinlich auf Lagern

mit Bleiglanz, Strahlstein u. s. w. vor; auch auf dem Harz in Steyermark und Piemont soll er sich finden.

d) Bergkork.

Syn. Bergleder. Asbeste tressé. Mountain Cork.

Plattenförmige, lappenartige Stücke, oft zerfressen und mit Eindrücken versehen. Zart verworren-faserig; die Fasern faserig in einander gewebt, und einzeln nicht trennbar; etwas elastisch biegsam. Schwimmend. Undurchsichtig, nur in dünnen Stücken durchscheinend. Matt oder schimmernd. Weiß; gelblichweiß; lichte strohgelb ins Gelblichbraune.

Auf Gängen im älteren Gebirge, auch in dünnen Lagen im Serpentin: Brunn in Mähren; Chamouny-Thal; St. Gotthard; St. Christophe in der Dauphinée; Norwegen; Schweden; Schottland u. s. w.

Den Amianth verwendet man zur Fertigung verschiedener Gespinste, namentlich zu Leinwand, Mäzen, Handschuhen, Gürteln, Bändern u. s. w. Er wird mit Flachs zusammengesponnen, auf gewöhnliche Weise gewoben, und dann der Flachsfaden durch gelindes Glähen über Kohlen zerstört, wo das Amianthgewebe rein zurück bleibt. Auf diese Weise werden Netze und Kleidungsstücke bereitet, die in neuerer Zeit mit Glück bei Brand-Rettungs-Anstalten angewendet wurden. Auch bei chemischen Feuerzeugen, als Lampendochte, u. s. w. gebraucht man ihn.

437. Schillerspath.

Syn. Schillerstein. Diatomer Schillerspath. Kaltartiger Diallag. Diallage metallide; 3. Th. Schillerspar.

Bis jetzt nicht in Krystallen vorgekommen, nur in krystallinisch-blätterigen und derben Massen, eingewachsen und eingesprengt.

Spaltbar nach zwei Richtungen, nach einer sehr vollkommen, nach der andern undeutlich, und beide ungefähr unter 135° zu einander geneigt. Bruch: uneben, splittterig. Härte = 3,5. Wenig spröde. Spec. Gew. = 2,68 — 2,8. An den Kanten durchscheinend. Auf den vollkommenen Spaltungsflächen metallähnlicher Perlmutterglanz, mit eigenthümlichem Schillern verbunden. Pistazien- und olivengrün in das Rellen- oder Tombacbraune und Bronzgelbe. Strich: graulichweiß.

B. v. P. schwer zu einem graulichgrünen Glase schmelzend; mit Borax zu einem klaren, etwas von Eisen gefärbten Glase. Im Kolben Wasser gebend. Das feine Pulver wird von concentrirter Salzs- oder Schwefelsäure vollkommen zerlegt; die Kiesel-erde bleibt als schleimiges Pulver zurück (v. Kobell). Chem. Gehalt nach K ö h l e r:

Kiesel-erde	43,90
Tal-erde	25,85
Kalk-erde	2,64
Eisenorydul mit etwas Chrom	13,02
Manganorydul	0,53
Thonerde	1,28
Wasser	12,42
	<hr/>
	99,64

Kommt eingewachsen in Serpentin an der Basis im Harze- burger Forste auf dem Harze vor.

138. Chrysolith.




Syn. Olivin. Prismatischer Chrysolith. Péridot.

Kernform: gerade rektanguläre Säule. Die am häufigsten vorkommenden Gestalten sind: 1) entseitet (n), entlängenrandet (d) und enteckt zur Schärfung über den Breitenrand (e), Fig. 148.; 2) enteckt, entrandet und entseitet; 3) entlängenrandet (d), zweifach enteckt (o und f), zweifach entseitet (n und s) und zweifach entbreitenrandet (h und k), Fig. 149.; 4) entlängenrandet, enteckt, entseitet und zweifach entbreitenrandet; 5) entlängenrandet, enteckt, zweifach entseitet z. Versch. von M. und entbreitenrandet. z. Schärfung über P. (h) Fig. 150. u. f. w.

Fig. 148.

Fig. 149.

Fig. 150.



Krystalle, meist kurz säulenartig, die Seitenflächen vertikal gestreift, die anderen glatt, zuweilen auch rauh, eingewachsen oder lose, in Körnern; krystallinische und derbe rundliche Massen mit körniger Textur.

Spaltbar parallel den Kernflächen, am deutlichsten mit T. Bruch: muschelig. Härte = 6,5 — 7. Spröde. Spec. Gew. = 3,3 — 3,44. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Vistazien-, oliven-, spargel-, olgrün; isabell-, ocker-, pomeranzengelb; gelblich-, röthlichbraun. Strich: weiß.

B. d. L. für sich unveränderlich, nur an den Kanten etwas dunkler werdend; mit Borax zu einem klaren, grünlichen Glase auflösbar. Das Pulver wird von Schwefelsäure leicht und vollkommen zersezt (v. Kobell); Salzsäure ohne merkl. Wirkung. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde... 40,5

Talkerde.... 50,6

Eisenoxydul. 8,9

100,0

Stromeyer's Analysen ergaben noch etwas Manganoxydul, Nickeloxyd und Thonerde.

Findet sich eingewachsen in Basalt, in basaltischen Trümmer-Gesteinen und Laven: Habichtswald und Steinau in Hessen; Rhön- und Vogelsgebirge; Dockweiler in der Eifel, Kaiserstuhl im Breisgau; Kapsenstein in Steyermark; Bulenreit in Baiern; Kosakowa in Böhmen; Altenberg in Sachsen; Puy de Charrade unfern Clermont in Auvergne; Schottland; Teneriffa; Bourbon u. s. w.; in Auswürflingen des Vesuv; in manchen Meteor-Eisen-Massen; lose Krystalle und Körner im aufgeschwemmten Boden und Sand: Brasilien; Natolien; Aegypten; Aetna etc.

Walchner's Hyaloxidit von Casbach am Kaiserstuhl ist ein an Eisenoxydul reicher Olivin. Nach Rose gehört auch der sogenannte krystallisirte Obsidian, der sich in den Höhlungen eines schwarzen Obsidians am Cerro de las Navajas bei Real del Monte in Mexiko findet, hierher.

Der Chrysolith wird zu verschiedenen Gegenständen des Schmucks, besonders zu Ring- und Halsnadel-Steinen verarbeitet.

139. Chondrodit.

Syn. Chondrodite. Brucite 3. Th.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 147^\circ 48'$ und $32^\circ 12'$. Die Gestalt, welche Hauy anführt, ist ent-
nebensetitet und entseitenect zur Schärfung über P.

Krystalle, sehr selten, meist mit rauher drusiger Oberfläche und undeutlich, gewöhnlich kleine krystallinische Massen und runde Körner, einzeln, selten aufgewachsen.

Unvollkommen spaltbar nach den Diagonalen der Kernform, nach der Endfläche vollkommen.

Bruch: unvollkommen muschelig bis uneben. Härte = 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,14 — 3,2. Durchscheinend. Glasglanz, zuweilen fettartig. Oder-, pomeranzengelb bis hyazinthroth; braunlichgelb; braunlichroth; olivengrün. Strich: weiß.

B. d. L. wird er milchweiß (der eisenhaltige undurchsichtig und braunlich) ohne zu schmelzen; mit Borax langsam zu einem klaren, wenig von Eisen gefärbten Glase. In einer Glasröhre stark geglüht gibt er schwache Reaktion von Flußsäure; das Glas bekommt in der Nähe der Probe einen milchweißen Ring. In Salzsäure ist er auflöslich, scheidet einige Flocken Kieselersde ab und gibt beim Abdampfen eine Gallerte (v. Kobell). Chem. Gehalt nach Seybert:

Kieselersde..	32,666
Talkerde...	54,000
Flußsäure..	4,086
Kali.....	2,108
Eisenoxyd..	2,333
Wasser....	1,000

96,193


Findet sich in körnigem Kalk eingewachsen: Sparta in New-Yersey; Ersby in Finland; Åker in Südermanland; Boden bei Marienberg in Sachsen; auch unter den Auswürflingen des Vesuvius soll er vorkommen.

140. Cordierit.

Syn. Dichroit. Zolith. Pelion. Steinhaillit. Prismatischer Quarz. Cordierite.

Fig. 151.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M = 119^\circ$ und 61° (Raumann). Vorkommende Gestalten: 1) entschärft; 2) dreifach entschärft (k und n n') und entschumpft (s); 3) beßgl. entrandet (z) und entspißet (o), Fig. 151.



Krystalle, säulenförmig, meist mit rauher und matter Oberfläche, eingewachsen; krystallinische Massen, Körner, Geschiebe.

Unvollkommen spaltbar nach den Seiten der Kernform und nach den Entschärfungs-Flächen. Bruch: muscheliger bis uneben. Härte = 7 — 75. Spröde. Spec. Gew. = 2,5 — 2,6. Durchsichtig bis durchscheinend. Viol., indig., schwärzlichblau; bläulich, gelblichgrau. Strich: weiß. Ausgezeichneter Dichroismus: indig-blau parallel der Hauptaxe, gelblichgrau, senkrecht auf dieselbe.

B. d. L. schmilzt er schwer zu einem weißen Glase; mit Borax zu einem klaren Glase. Säuern ohne Wirkung. Chem. Gehalt einer Varietät von Orijersvi nach Bonsdorff und einer andern von Bodenmais nach Stromeyer:

Rieselerde.....	49,95	48,352
Talkerde.....	10,45	10,157
Thonerde.....	32,88	31,706
Eisenoxydul ..	5,00	8,316
Manganoxydul	0,03	0,333
Wasser	1,75	0,595
	<u>100,06</u>	<u>99,459</u>

Eingewachsen in granitartigen Gesteinen: Cabo de Gata in Spanien; Abo in Finland; Arendal in Norwegen; auf einem Lager mit Kupfer- und Leberkies: Bodenmais in Baiern; Orijersvi in Finland; ferner trifft man ihn in Brasilien, Nordamerika, zu Simiutak in Grönland, in Sibirien; in Geschieben auf Ceylan.

Er wird unter dem Namen Luchs-Saphir zu verschiedenen Gegenständen des Schmucks, namentlich zu Ring- und Halsnadel-Steinen verarbeitet.

141. Fahlunit.

Syn. Trillast.

Kernform: rhombische Säule. $M||M = 109^{\circ} 28'$ und $70^{\circ} 32'$. Ueber die vorkommenden Gestalten werden noch genauere Angaben vermisst; nach Mitscherlich sollen sie denen des Topases ähnlich seyn.

Krystalle, glatt, häufig mit zugerundeten Kanten, wie geschmolzen, eingewachsen; krystallinische Massen, mit blätteriger Textur, nierenförmig, derb, eingesprengt.

Spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: splitterig ins Unebene und Splitterige. Härte = 5,5 — 6. Spec. Gew. = 2,68 — 2,79. An dünnen Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Glas-, oft auch Fettglanz. Schwarz, blaulich-, braunlich-, graulichschwarz; grau; grünlichgrau; oliven-, blgrün. Strich: graulichweiß ins Braune.

B. d. L. brennt er sich weiß und schmilzt an den Kanten zu einem weißen, blasigen Glase; mit Borax schwer zu einem, etwas von Eisen gefärbten, Glase. Gibt im Kolben etwas Wasser und färbt sich grau. Chem. Gehalt des derben (a), des schwarzen (b) und dunkelgrauen (c) Fahlunits nach Trolle-Wachtmelster:

	a	b	c
Kieselerde	45,51	44,60	44,93
Kalkerde	6,53	6,75	6,04
Thonerde	25,81	30,10	30,70
Eisenoxyd	6,35	Eisenoxydul 3,86	7,22
Manganoxydul	1,72	2,24	1,90
Natron	4,45	Spur	
Kali	0,94	1,98	1,38
Kieselhaltige Flußsäure	0,16		Spur
Kalkerde	Spur	1,55	0,95
Wasser	11,66	9,55	8,65
	101,13	100,25	101,79

Eingewachsen in Chloritschiefer: zu Fahlun in Schweden.

142. Sordawalith.

Derbe Massen, nierenförmig.

Bruch: muschelig. Härte = 5. Spröde. Spec. Gew. = 2,58. Undurchsichtig, zuweilen metallartig. Pech-, graulich- oder grünlichschwarz; schwärzlichbraun. Durch Verwitterung außen roth werdend. Strich: leberbraun.

B. d. L. schmilzt er, ohne anzuschwellen, zu einer schwarzen Kugel, die im Reduktions-Feuer einen grauen, metallartigen Glanz bekommt; mit Borax zu einem grünen Glase. Im Kolben Wasser gebend. In erhitzter Salzsäure lösbar. Chem. Gehalt nach Nordenskiöld:

Kieselerde... 49,40

Talkerde.... 10,67

Thonerde... 13,80

Eisenorydul. 18,67

Phosphorsäure 2,68

Wasser..... 4,58

99,10

Findet sich zu Sordawala in Schweden und zu Bodenmais in Baiern.

143. Nephrit.

Syn. Weilstein z. Th. Jade nephritique. Common Nephrite.

Derb, stumpfartige Stücke.

Bruch: grobsplitterig ins Unebene. Härte = 5. Spröde. Spec. Gew. = 2,9 — 3,02. Durchscheinend, meist nur an den Kanten. Fettartig schimmernd, auch matt, lauch-, schwärzlichgrün; grünlichgrau, grünlichweiß. Strich: weiß.

B. d. L. sich zuerst weiß löbrend, dann bei anhaltendem Feuer zu graulichem Schmelz fließend. Chemischer Gehalt nach Kastner:

Kieselerde. 50,50

Talkerde.. 31,00

Thonerde . 10,00

Eisenoryd. 5,50

Chromoryd 0,05

Wasser ... 2,75

99,80

Kommt aus China, Aegypten, Amerika (Land der Topaja's am Amazonasflusse) und von der Insel Tavai-Punamu.

Wird in der Türkei und Kleinasien häufig zu Dolch- und Säbelgriffen und zu verschiedenen Zierrathen verarbeitet, auch Dosen, Schalen etc. fertigt man daraus.

144. Pyrophyllit.

Syn. Strahliger Talt.

Krystallinische Massen mit blätterig-strahliger Textur, die Strahlen-Büschel laufen von einem Mittelpunkt nach allen Seiten aus, wodurch Kugeln und nierenförmige Aggregate entstehen, und zeigen zuweilen an den Enden ausgebildete Krystallspitzen; die Kugeln selten einzeln ein-, meistens zusammen verwachsen.

Vollkommen spaltbar nach einer Richtung in dünne Blättchen. Bruch: uneben, selten wahrzunehmen. Härte = 1,5. Biegsam in dünnen Lamellen. Spec. Gew. = 2,8. Durchscheinend, in feinen Blättchen durchsichtig. Perlmutterglanz. Gras-, apfel-, spangrün; grünlichweiß. Strich: weiß.

B. d. L. unschmelzbar, zertheilt sich aber zu einer fächerförmig aufgeschwollenen Masse, die ein bedeutenderes Volumen, als die ursprüngliche Probe einnimmt, und wird weiß. Mit Borax zu klarem, grünem Glase auflösbar, das nach dem Erkalten fast farblos wird: mit Soda unter Brausen zu klarem, gelben Glase. Chem. Gehalt nach Hermann:

Kieselerde. 59,79

Talkerde .. 4,00

Thonerde.. 29,46

Eisenoxyd. 1,80

Wasser ... 5,62

100,67

Mit einer Spur von Silberoxyd.

Findet sich eingewachsen in Quarz und Bitterspath in der Gegend von Beresofsk in Sibirien, in Talkschiefer bei Salm-Chateau.

145. Chlorit.

Syn. Prismatischer Talkglimmer z. Th. Talc chlorite.

Kernform: sechsseitige Säule.

Krystalle, höchst selten deutlich ausgebildet, meist in dünnen sechsseitigen Tafeln, häufig zu cylindrischen, kegels- oder fächerförmigen Gruppen verbunden; krystallinische Massen; schuppige Aggregate, staubartig, als Ueberzug angeflogen; derb, eingesprengt

Sehr vollkommen spaltbar parallel den P-Flächen. Härte =

1,5. Milde in dünnen Blättchen biegsam. Spec. Gew. = 2,65 — 2,85. Durchsichtig (in dünnen Lamellen) bis durchscheinend. Glas-; auf den Spaltungsflächen Perlmutterglanz. Berg-, lauch-, oliven-, schwärzlichgrün. Strich: grünlichgrau bis berggrün.

B. d. L. blättert er sich, wird weiß oder schwärzlich und schmilzt nur an sehr dünnen Kanten; mit Borax zu einem grünen Glase. Gibt im Kolben Wasser. In concentrirter Schwefelsäure vollkommen zerfetzbar. Chem. Gehalt einer Varietät von Achmatof und einer andern aus dem Zillerthale nach v. Kobell:

Kieselerde....	31,25	26,51
Kalkerde.....	32,08	22,83
Thonerde.....	18,72	21,81
Eisenoxydul...	5,10	15,00
Wasser.....	12,63	12,00
	<hr/> 99,78	<hr/> 98,15

Bildet eine eigenthümliche Gebirgsart, den Chloritschiefer: Schweiz; Tyrol; Steyermark; Böhmen; Ungarn; Schweden u. Findet sich ferner auf Erz-Lagerstätten: Arendal in Norwegen; Sala in Schweden; Berggießhübel in Sachsen; Dognaczka im Bannat; auf Drusenräumen und Klüften von Gängen, oft die Krystalle von Bergkrystall, Feldspath, Arinit, Titanit, Periklin u. überkleidend: St. Gotthard; Pfiffisch und Pustertal in Tyrol; Disans in der Dauphinée u. s. w.

146. Einaxiger Glimmer.

Syn. Glimmer z. Th. Rhomboedrischer Glimmer z. Th. Mica.

Kernform: Rhomboeder. $P \parallel P =$ Fig. 152.

$71^{\circ} 3' 46''$ über den Scheitellanten; $= 108^{\circ}$

$56' 14''$ den Randlanten. Vorkommende Ge-

stalten: 1) entrandet zur Säule und entschei-

telt z. Versch. der Kernflächen (sechseckige

Säule); 2) zweifach entrandet in der Rich-


tung der Flächen und entscheidet z. Versch.

der Kernflächen (entschiedenes Bipyramidal-

Dodekaeder); 3) zweifach entrandet in der Richtung der Flächen

(r und r'), entrandet zur sechseckigen Säule (a) und entschei-

telt (o), Fig. 152.; 4) desgl. z. Versch. der Kernflächen.



Kryftalle, meift dünn tafelartig, befonders die Varietäten 1 und 4., felten kurz fäulenförmig, wie 2 und 3 erſcheinen*) mit horizontal geſtreiften Seitenflächen, auf- und durcheinander gewachſen, auch zu Drüſen gruppiert; groſßblättrige Maſſen.

Sehr vollkommen ſpaltbar parallel der Entſcheidungsfläche. Härte 2,5. Milde, in dünnen Blättchen elafiſch-biegsam. Spec. Gew. = 2,78 — 2,94. In dünnen Lamellen durchſichtig; im polarifirten Lichte farbige Ringe zeigend, die von einem ſchwarzen rechtwinklichen Kranze durchſchnitten ſind. Glas-, auf den Spaltungsflächen ſtarker Perlmutterglanz. Dunkel piſtazien-, ſchwärzlichgrün; grünlich-, pechſchwarz; ſchwärzlich-, nelfen-, kaſtanienbraun. Strich: lichte grünlichgrau bis ungefärbt.

B. d. L. wird er trüb und mürbe, und fließt nur an ſehr dünnen Kanten zu einem grauen oder ſchwärzlichen Glaſe; mit Borax leicht, unter Aufbrauſen zu einem von Eiſen gefärbten Glaſe auflöslich. Im Kolben etwas Waſſer gebend, meift mit geringer Reaktion von Flußſäure. Dünne Blättchen werden von koncentrirter Schwefelſäure vollkommen zerſetzt. Chem. Gehalt einer Varietät von Monrö (a), einer anderen von Miasſ (b) und einer dritten von Karoſulik (c) nach v. Kobell:

	a	b	c
Kieſelerde...	40,00	42,12	41,00
Talkerde....	21,54	16,15	18,86
Thonerde...	16,16	12,83	16,88
Kali.....	10,83	8,58	8,76
Eiſenoryd...	7,50	10,38	4,50
Titanſäure..	0,20	Eiſenorydul	9,36
Flußſäure...	0,55		5,05
Waſſer.....	3,00	1,07	Spur
	99,76	100,49	99,35

Scheint im Ganzen weit ſeltener als der zweiarige vorzukommen. Man findet ihn in kryſtalliniſchen Gebirgsgeſteinen, in Baſalt, Dolerit und auf Gängen. Miasſ u. a. D. in Sibirien; Karoſulik in Grönland; Bodenmais in Baiern; Gegend von Rom; Monrö in New-Jerſey u. ferner gehört wohl der meiſte Glimmer, welcher in den Auswürflingen des Beſuv vorkommt, hierher.

*) Dieſe Varietäten ſind beide vom Beſuv, No. 2. führen Monticelli und E. velli an, No. 3. befindet ſich in meiner Sammlung;

147. Melilith.

Kernform: gerade rektanguläre Säule. Sie soll auch mit Entseitungen vorkommen.

Krystalle, säulenartig mit rauher Oberfläche, aufgewachsen.

Bruch: uneben bis unvollkommen muschelig. Härte = 5,5.

Espec. Gew. = 3,24 — 3,29. Undurchsichtig. Außen nur schimmernd oder matt, auf den Bruchflächen glasglänzend. Honiggelb; rötlich- oder grünlichgelb, bräunlichroth. Strich: gelblichweiß.

B. d. L. leicht schmelzbar zu einem durchscheinenden grünen Glase. Das Pulver mit Salzsäure gelatinirend. Chem. Gehalt nach Carpi:

Kieselerde .. 38,0

Falkerde ... 19,4

Thonerde .. 2,9

Kalkerde ... 19,6

Eisenoxyd .. 12,1

Titanoxyd .. 4,0

Manganoxyd 2,0

98,0

In einem doleritartigen vulkanischen Gestein: Capo di Bove bei Rom; in Lava am Vesuv.

148. Chrysoberyll.

Syn. Prismatischer Korund. Cymophane. Crysoberyll.

Kernform: gerade rektanguläre Säule. Vorkommende Gestalten: 1) entbreitenrandet z. Schärfung über P. (i), Fig. 153.; 2) beßgl. entseitet (s) und enteckt (o) zur Schärfung über dem Längsrand (Fig. 153. ohne z); 3) entbreitenrandet zur Schärfung über P., enteckt zur Schärfung über dem Längsrand und zwelfach entseitet (s und z) Fig. 154.; 4) Zwillinge u. f. w.

Fig. 153.





Fig. 154.



Krystalle, mit vertikal gestreiften Seitenflächen, einzeln ein- oder zu mehreren zusammengewachsen. Körner und kleine Geschiebe.

Unvollkommen spaltbar parallel den Kernflächen, am deutlichsten mit T. Bruch: vollkommen muschelig. Härte = 8,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,68 — 3,70. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz, zuweilen fettartig. Grünlichweiß, spargel-olivengrün, gelblichgrau. Strich: weiß. Zuweilen mit bläulich- oder milchweißem wogenden Lichtscheine.

B. d. L. unschmelzbar; mit Borax langsam und schwer zu einem klaren Glase lösbar. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusammf. nach v. Kobell:

Kieselerde... 5,66

Thonerde... 75,49

Beryllerde .. 18,85

100,00

Titan- und Eisenoxyd sind zuweilen beigemengt.

Findet sich eingewachsen in Granit zu Haddam in Connecticut und Saratoga in New-York; in Glimmerschiefer zu Weissenburg in Mähren; lose im Sande mancher Flüsse auf Ceylan, in Pegu, Brasilien, Sibirien.

Er wird zu Ring- und Nadelsteinen verarbeitet.

149. Smaragd.

Syn. Rhomboedrischer Smaragd. Émeraude. Emerald.

Kernform: sechsseitige Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseitigt (ähnlich Fig. 53. pg. 113.); 3) enteckigt; zuweilen zur Schärfung über den Randkanten, Fig. 155.; 4) entrandet (ähnlich Fig. 54. pg. 113.); 5) beßgl. und enteckigt (ähnlich Fig. 55. pg. 113.); 6) entrandet (t), enteckigt (s) und entseitigt (n), Fig. 156.

Fig. 155.





Fig. 156.



Krystalle, mit glatten oder vertikal gestreiften Seitenflächen, einzeln ein-, auf- oder zu mehreren durcheinander gewachsen und zu Drüsen gruppiert; stumpfckige Stücke und Geschiebe.

Wiemlich vollkommen spaltbar parallel den P., minder deutlich nach den Seitenflächen. Bruch: unvollkommen muschelig ins Unebene. Härte = 7,5 — 8. Spröde. Spec. Gew. = 2,67 — 2,73. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz. Grün; gelb; blau; weiß. Strich: weiß.

B. d. L. bei starkem Feuer und anhaltendem Bläsen wird er an den dünnen Ranten abgerundet, und bildet eine farblose blasige Schlacke; mit Borax zu einem klaren, farblosen oder chromgrünen Glase auflösbar. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde....	70,6
Thonerde.....	16,7
Beryllerde....	12,7
	<hr/>
	100,0

Chrom-, Eisen- und Tantaloryd finden sich beigemischt.

Arten:

1) Smaragd.

Syn. Glatter Smaragd. Emeraude verte.

Krystalle, kurz säulenförmig mit glatten Seiten- und rauhen Endflächen; meist einzeln ein- oder aufgewachsen. Smaragd- bis grasgrün und grünlichweiß.

Eingewachsen in Glimmerschiefer: Pinzgau in Salzburg; Katharinenburg in Sibirien; Kossitr am rothen Meere; auf Gängen im Thonschiefer: Thunkathal unfern Neu-Karthago.

2) Beryll.

Syn. Gestreifter Smaragd. Aquamarin. Emeraude verte-jaunâtre und verte-bleuâtre. Beryl.

Krystalle, säulenförmig und meist langgestreckt, mit vertikal gestreiften Seiten- und glatten Endflächen, zuweilen von bedeutender Größe; gewöhnlich durcheinander gewachsen und zu Drüsen gruppiert. Wasserhell (selten), meist grünlich-, gelblich-, blau-lichweiß; seladon-, ol-, span-, berg-, apfelgrün; stroh-, wachs-, honiggelb; himmel-, smalte-, indigblau.

Auf Quarz-Gängen und Nestern im Granit: Musfink, Miask, Berschofsk, Odon-Tschelon und Nertschinsk in Siberien; eingewachsen in Granit, Gneiß u.: Finbo und Broddbo bei Fahlun in Schweden; Schellerhan und Johann-Georgenstadt im Erzgebirge; Rabenstein bei Zwiesel in Baiern; Chanteloube in Frankreich; Spanien; Irland; Haddam in Connecticut u. s. w.; als Geschiebe: Aberdeenshire in Schottland; Rio-Janeiro in Brasilien.

Der Smaragd ist ein sehr geschätzter Edelstein, dessen Werth schon in den frühesten Zeiten anerkannt war; er wird vorzüglich zu Ring- und Nadelsteinen verarbeitet. Von bei weitem geringerem Werthe ist der Beryll, sein Preis wird vorzüglich durch ungewöhnliche Größe gesteigert; der edle Beryll dient zu Ring- und Halsnadelsteinen, zu Ohrgehängen, Berloquen an Uhrenketten u. s. w. Die unreinen Arten, der gemeine Beryll, werden zur Darstellung der Beryllerde verwendet.

150. Euclase.

Syn. Prismatischer Smaragd. Euclase.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 114^{\circ} 50'$ und $65^{\circ} 10'$; $P \parallel M = 123^{\circ} 39' 40''$. Die beobachteten Gestalten sind sehr complicirt, eine der einfachsten unter ihnen ist: dreifach entmittelseitet, dreifach entseltenect und entrandet z. Verschw. von P.

Krystalle mit vertikal gestreiften Seitenflächen.

Spaltbar parallel den beiden Diagonalen der P-Fläche, sehr vollkommen in der Richtung der kleinen Diagonale, Spuren nach den Endflächen. Bruch: kleinschuppig. Härte = 7,5. Sehr spröde und leicht zersprengbar. Spec. Gew. = 3,09. Durchsichtig bis durchscheinend. Starker Glasglanz. Wasserhell, grünlich-, blaulichweiß, lichte berg- und seladongrün ins Himmelblaue. Strich: weiß.

B. d. L. schwillt er an, wird weiß und schmilzt zu einem weißen Email; mit Borax schwillt er, unter etwas Aufbrausen, an, wird weiß und dann langsam zu einem klaren farblosen Glase aufgelöst. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde.. 44,4

Thonerde... 31,5

Beryllerde.. 24,1

100,0

Die Zerlegung von Berzelius ergab noch etwas Eisen- und Binnoryd.

Findet sich in Chloritschiefer mit Topas zu Capao de Laue bei Villa rica in Brasilien.

150. Zirkon.

Syn. Zirkonit. Spaziath. Pyramidaler Zirkon. Hyacinthe Zirkon.

Kernform: quadratisches Octaeder (Fig. 8. pg. 18.).




$P \parallel P = 123^{\circ} 49'$ über den Scheitelfanten; $= 84^{\circ} 20'$ über den Rand.

Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entrandet (x) zur Säule (Fig. 159. ohne die Flächen x); 3) entrandeckt (s) zur Säule (Fig. 157. ohne die Flächen l); 4) beßgl. und entrandet (l) Fig. 157.; 5) entrandeckt (s) und dreifach entrandet (l und u) Fig. 158.; 6) vierfach entrandeckt (x) und entrandet zur Säule, Fig. 159.; 7) vierfach entrandeckt und dreifach entrandet; 8) fünffach entrandeckt, entrandet und entschweifantet.

Fig. 157.

Fig. 158.

Fig. 159.



Nro. 1., 3. und 4. von Ceylan, Nro. 2., 6., 7. u. 8. von Frederikswärn, Nro. 5 aus Sibirien.

Kristalle, meist säulenförmig und vollständig ausgebildet, mit glatter oder rauher und unebener Oberfläche, einzeln eingewachsen; lose Kristalle und stumpfedige Körner.

Spaltbar parallel den Randfanten, nach den Flächen der Kernform nur Spuren. Bruch: muschelig bis uneben. Härte

= 7,5. Spröde. Spéc. Gew. = 4,4 — 4,6. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz, zuweilen diamantartig. Colombin-, kirsch-, bräunlich-, fleisch-, hyazinthroth bis pomeranzengelb; gelblichbraun; graulich-, gelblich-, röthlichweiß; rauchgrünlichgrau; lauch-, pyrstaziengrün. Strich: weiß.

B. d. L. verliert er seine Farbe, schmilzt aber nicht; mit Borax schwer zu einem klaren Glase auflösbar. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde.. 34,5

Zirkonerde. 65,5

100,0

Gewöhnlich sind 1 — 2 Pct. Eisenoxyd beigemengt.

Findet sich als Gemengtheil mancher Syenite, so vorzüglich zu Frederikswärn, Stavern u. a. D. in Norwegen; eingewachsen in Granit oder Gneiß: New-Yersey, Neu-York, Ceylan, Schottland, südlicher Abhang der hohen Jmen am nördlichen Ufer des Jmensees, 6 Werst von Miasch in Sibirien; in Mandelsteinen und Basalten: Vicenza, Expailly unfern le Puy, Siebengebirge; in körnigem Kalk zu Böhmischem-Eisenberg in Mähren u. — Häufig wird er in losen Krystallen und Körnern getroffen: Ceylan, Pegu, Madras, Ohlapian in Siebenbürgen, Hohenstein und Sebnitz in Sachsen, Bilin in Böhmen, Italien u. s. w.

Der Zirkon (Hyazinth) wird zu Ring- und Halsnabelsteinen, zum Einfassen von Halsbändern, Ohrgehängen, Uhren, Dosen u. s. w. verwendet. Auch wird er als Unterlage für die Zapfen des Balkens feiner Waagen, und als Hülse, worin die Spindeln feiner Räder laufen, gebraucht.

152. Eudialyt.

Kernform: Rhomboeder. $P \parallel P = 73^{\circ} 24'$ über den Scheitelfanten; $= 106^{\circ} 36'$ über den Randfanten. Vorkommende Gestalten: 1) vierfach entseittelt, drei in der Richtung der Flächen, und entrandet; 2) desgl. und entrandet zur Säule.

Krystalle mit glatter Oberfläche; krystallinische Massen.

Spaltbar parallel der Entseittelungs-Fläche, oder senkrecht gegen die Hauptaxe. Bruch: uneben. Härte = 5,5. Spec.

Gew. = 2,89. An den Ranten durchscheinend. Glasglanz. Pfirsichblüth-, auch bräunlichroth. Strich: weiß.

B. d. L. schmilzt er leicht zu lichtgrünem Glase; mit Borax zu klarem Glase lösbar. Gibt im Kolben etwas Feuchtigkeit. Mit Salzsäure übergossen bildet das Pulver eine Gallerte.

Chem. Gehalt nach Stromeyer:

Kieselerde . .	53,325
Sirkonerde . .	11,102
Kalkerde . . .	9,785
Natron	13,822
Eisenoxyd . . .	6,754
Manganoxyd . .	2,062
Salzsäure . . .	1,034
Wasser	1,801

99,685

Findet sich mit Augit, Feldspath, Hornblende und Sodalit in einem Lager über Gneiß zu Rangerbluarfuk in Grönland.

153. Thorit.

Derbe Massen voller Sprünge; zuweilen mit einem dünnen rothfarbenen Ueberzug bekleidet.

Nicht besonders hart, läßt sich leicht mit dem Messer ritzen. Spröde. Spec. Gew. = 4,63. Undurchsichtig. Glasglanz. Schwarz. Strich: graulichroth.

B. d. L. verliert er seine schwarze Farbe und wird gelb ohne zu schmelzen; mit Borax leicht zu klarem grünlichem Glase auflösbar, das bei großem Zusatz während des Erkalstens unklar wird. In der Reduktions-Probe erhält man, auf Zusatz von Borax, kleine weiße Metallkörner, die sich platt drücken lassen, und aus Blei, das eine Spur von Zinn enthält, bestehen. Chem. Gehalt nach Berzelius:

Thorerde	57,91
Kieselerde	18,98
Kalkerde	2,58
Thonerde	0,36
Thonerde	0,06
Eisenoxyd	3,40
Manganoxyd	2,39
Uranoxyd	1,61
Bleioxyd	0,80
Zinnoxyd	0,01
Kali	0,14
Natron	0,10
Wasser	9,50
Ungelöstes Steinpulver	1,70
Verlust	0,46

100,00

Kieselerde..	27,8
Cerorydul..	15,7
Yttererde..	46,5
Eisenerydul	10,2
	<u>100,0</u>

Findet sich in Granit und Gneiß eingewachsen: Finbo und Broddbo bei Fahlun, und Ytterby in Schweden.

Der Gadolinit von Kärarfoet bei Fahlun zeigt sich in seinem chemischen Verhalten und Bestand verschieden von dem angeführten.

B. d. L. brennt er sich weiß und schmilzt in strengem Feuer, ohne anzuschwellen, zu einem dunkel perlgrauen oder röthlichen unklaren Glase; mit Borax leicht zu einem klaren, von Eisen wenig gefärbten, Glase auflösbar. Im Kolben etwas Wasser gebend. Chem. Gehalt nach Berzelius:

Kieselerde..	29,18
Cerorydul..	3,40
Yttererde..	47,30
Eisenerydul.	8,00
Beryllerde..	2,00
Kali.....	3,15
Manganoryd	1,30
Wasser....	5,20
	<u>99,53</u>

In Granit eingewachsen.

157. Orthit.

Lang- und schmalstrahlige Massen, eingewachsene Körner, eingesprengt.

Bruch: kleinmuschel. Härte = 7. Spröde. Spec. Gew. = 3,28. Undurchsichtig. Glasglanz. Schwarz, graulich und braunlichschwarz. Strich: braunlichgrau.

B. d. L. bläht er sich auf, wird gelblichbraun, und schmilzt endlich, unter starkem Aufwallen, zu einem schwarzen, blasigen Glase; mit Borax zu einem klaren Glase lösbar. Im Kolben Wasser gebend. In erhitzter Salzsäure auflöslich und gelatinisirend. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kieselerde	.. 32,5
Serorydul	.. 18,2
Yttererde	.. 3,3
Eisenoxydul	.. 11,8
Thonerde	.. 17,3
Kalkerde	... 4,8
Manganoxydul	3,0
Wasser	... 9,1
	100,0

Eingewachsen in Granit und Gneiß: Insel Schepsholmen bei Stockholm, Schonen, Linsöping, Finbo in Schweden; Hitterön in Norwegen.

II. Abtheilung.

Schwere Metalle.

Mineralien, deren Grundlage die schweren Metalle bilden, und die gewöhnlich Metalle, im engeren Sinne des Worts, genannt werden. Sie sind theils spröde, theils dehnbar; ihr specifisches Gewicht steigt bis zu 20,0; meist undurchsichtig; eigenthümlicher Glanz: Metallglanz. Gefärbt und die Farben bestimmter. Geben größtentheils vor dem Löthrohre auf der Kohle entweder für sich oder mit kohlensaurem Natron behandelt, einen Regulus oder einen farbigen Beschlag.

XVII. Gruppe. Titan.

Findet sich nur in geringer Menge und nicht rein in der Natur, sondern stets in oxydirtem Zustande, und bildet in dieser Form für sich, oder mit andern Metalloxyden verbunden, einige Mineralien.

Die hierher gehörigen Substanzen besitzen ein specifisches Gewicht von 3,4 — 5,9. Härte = 5,5 — 6,5. Spröde. Metallglanz. Gefärbt; braune Farbe vorherrschend. Unschmelzbar oder doch schwierig schmelzbar.

158. Anatas.




Syn. Oктаedrit. Pyramidales Titanerz. Titane anatase. Oisanite Octahedrite.

Kernform: quadratisches Oktaeder (s. Fig. 9. pg. 19.).
 $P \parallel P = 97^\circ 56'$ über den Scheitellanten; $= 136^\circ 22'$ über den
 Randkanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) ent-
 scheitelt (o), Fig. 160.; 3) vierfach entscheitelt (in der Richtung
 der Flächen (r), Fig. 161.; 4) achtfach entscheitelt, stets zwei
 Flächen in der Richtung einer Scheitellante; 5) entscheitelt und
 entscheitellkantet (n), (Fig. 162. ohne m); 6) desgl. und entrand-
 eckt (m), Fig. 162.; 7) entscheitelt, entscheitellkantet und zweifach
 entrandeckt in der Richtung der Scheitellanten u. s. w.

Fig. 160.

Fig. 161.

Fig. 162.



Krystalle, glatt, meist aber mit horizontaler Streifung, ein-
 zeln aufgewachsen, auch zu Reihen verbunden und durcheinander
 gewachsen; kleine Geschiebe und Körner.

Vollkommen spaltbar parallel den Kernflächen, undeutlich in
 der Richtung des Randes. Bruch: muschelig, auch uneben. Härte
 $= 5,5 - 6$. Spröde. Spec. Gew. $= 3,82$. Halbdurchsichtig bis
 undurchsichtig. Diamantglanz, häufig metallähnlich. Dunkel him-
 mel-, indigblau, nelken- und gelblichbraun; grünlich-, gelblichgrau;
 honig-, weingelb; hyazinthroth; eisen-schwarz; zuweilen bunt an-
 gelaufen. Strich: graulichweiß.

B. d. L. für sich unschmelzbar; von Borax wird er zu ei-
 nem klarem farblosen Glase aufgelöst, das im Reduktionsfeuer
 erst eine gelbe, und dann eine dunkle Amethystfarbe erhält; in
 Phosphorsalz schwierig lösbar, der ungelöste Theil erscheint weiß,
 halbdurchsichtig, wie ein eingemengtes Salz. Säuren ohne Wir-
 kung. Chem. Zusammensetzung nach *Vauquelin*: reines Titan-
 oxyd.

Auf Gängen und Drusen im Diorit, begleitet von Albit,
 Bergkrystall, Chlorit zc. bei Disans in der Dauphinée; Gegend von
 Hof im Fichtelgebirge; im Glimmerschiefer: Val Maggia und St.

Brigitta in Bündeln; in Granit: Cornwall, Spanien; in losen Krystallen, Geschieben und Körnern im Sande des Baches Itahira in Brasilien.

159. Rutil.

Syn. Titanschörl. Peritomes Titanerz. Titane oxyde.

Kernform: gerade quadratische Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entsetzt zur Spizung; 3) beßgleichen und entseitet; 4) entrandet zur Spizung; 5) beßgl. und entseitet; 6) entrandet (o) und entsetzt (s) zur Spizung und entseitet (l), Fig. 163.; 7) entrandet zur Spizung und zweifach entseitet (f.f.) zum Verschw. der Kernflächen, Fig. 164.; 7) verschiedene andere Formen, und häufig knieförmig, unter Winkeln von $115^{\circ} 4'$ zusammengewachsene Zwillinge und Drillinge, von Individuen mehrerer der angeführten Formen, wie z. B. Fig. 165. ein Drilling von No. 6.

Fig. 163.




Fig. 164.





Fig. 165.



Krystalle, säulenartig mit vertikaler Streifung auf den Seitenflächen, nadel- und haarförmig, und dann häufig zwillingsartig mit einander verwachsen, so daß neßähnliche und gegitterte Gewebe entstehen; verb und eingesprengt von körniger Zusammensetzung; angeflogen; auch in Geschieben.

Spaltbar nach den Seitenflächen und den beiden Diagonalen der Endflächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 6, — 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,2 — 4,4. Durchscheinend bis undurchsichtig. Metall-ähnlicher Diamantglanz. Blut-, hyazinth-, morgenroth; röthlich, gelblichbraun; schwärzlich. Strich: gelblichbraun.

B. d. L. verhält er sich wie Anatas; die Amethystfarbe jedoch, welche dieser im Reduktionsfeuer mit Borax erhält, ist nie so rein beim Rutil. Mit Soda auf Platinblech bekommt der Fluß grüne Ranten, ein Beweis seines Mangan-Gehaltes. Chem. Zusammens. nach v. Kobell:

Titan..... 60,29

Sauerstoff.. 39,71

100,00

Gewöhnlich mit etwas Eisenoxyd verunreinigt.

Findet sich auf Gängen in abnormen Gebirgsarten, begleitet von Bergkrysal (zuweilen als Einschluß desselben), Feldspath, Glimmer, Chlorit, Eisenglanz (diesem sehr häufig ein- und aufgewachsen), auf Erzlagern zumal von Magneteisen, auch lose im Sande der Flüsse: Schöllkrippen bei Aschaffenburg; Pinzgau und Gastein in Salzburg; Eisens, Pfisch in Tyrol; Saualpe in Kärnthen; Chamounythal; St. Gotthard; Simpson; St. Vrieux in Frankreich; Killin in Schottland; Buitrago in Spanien; Arendal in Norwegen; Rosenau in Ungarn; Sibirien; Nordamerika, Brasilien.



160. Titanit.

Syn. Gelb- und Braun-Manakerz. Sphen. Prismatisches Titanerz. Titane siliceo-calcaire. Sphène.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 133^{\circ} 48'$ und $46^{\circ} 12''$; $P \parallel M = 94^{\circ} 38'$ und $85^{\circ} 22'$. Vorkommende Gestalten: 1) entspißect z. Versch. der P-flächen (Fig. 166. ohne P und y); 2) zweifach entspißect (x und y), Fig. 166.; 3) beßgl. und entnebenseitig; 4) zweifach entspißect und dreifach entnebenseitig; 5) zweifach entspißect, zweifach entseitenect (a und r) in der Richtung des scharfen Randes und entnebenseitig (q), Fig. 167.; 6) entseitenect (n) z. Versch. der M-

Fig. 166.

Fig. 167.



Flächen und entspitzeckt (Fig. 168. ohne x); 7) entseitenect zum Verschw. der M-Flächen und zweifach entspitzeckt, Fig. 169.; 8) entspitzeckt (y) und zweifach entseitenect (n und r), die Entseitenectungs-Flächen (n) dehnen sich aus bis z. B. der Seitenflächen, Fig. 169.; 9) verschiedene andere Combinationen; häufig treten auch Zwillinge verschiedener der angeführten Gestalten auf.

Fig. 168.





Fig. 169.



Krysalte, meist säulen- oder tafelartig, mit glatter gestreifter oder gekrümmter Oberfläche, auch häufig mit einer Rinde von Chlorit-Blättchen bekleidet, ein- oder aufgewachsen und zu Drusen verbunden; krySTALLINISCHE Massen, derb mit körniger und schalliger Zusammensetzung, eingesprengt.

Spaltbar nach den Kernflächen, besonders nach den Seiten-Flächen. Bruch: kleinmuschelig bis uneben. Härte = 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,49 — 3,60. Durchsichtig bis undurchsichtig. Glasglanz, oft fett-, zuweilen diamantartig. Isabell-, erbsen-, honiggelb; gelblich-, grasgrün; hyazinthroth; röthlich-, nellen- bis schwärzlichbraun; gelblichgrau. Strich: weiß bis grau. Manche Varietäten durch Erwärmen elektrisch werdend.

B. d. L. schmilzt er an den Kanten unter einigem Aufwallen zu einem schwärzlichen Glase; mit Borax zu klarem gelben Glase; in Phosphorsalz schwer auflösbar und im Reduktionsfeuer, zumal bei Zusatz von etwas Zinn, violette Färbung zeigend. Das Pulver wird in erhitzter Salzsäure größtentheils zerlegt, ohne zu gelatiniren und mit Hinterlassung eines Rückstandes. Chem. Zusammens. nach v. Kobell;

Titansäure 34,64

Kalkerde.. 31,40

Kieselerde. 33,96

100,00

Plum, Drystognose. ♦

Findet sich auf Drusenräumen von Gängen in abnormen Felsgesteinen begleitet von Chlorit, Epidot, Albit zc.: Stubachthal in Salzburg; Pfaunder in Tyrol; St. Gotthard; Montblanc; auf Magnetiseisen-Lagern im Gneiß: Arendal, Buben und v. a. O. in Norwegen; eingewachsen in Gneuit, Granit, Gneiß und anderen Felsarten: Sulzbach in der Bergstraße; Gladbach bei Aschaffenburg und Passau in Baiern; Eisens in Tyrol; Saualpe; Plauischer Grund bei Dresden; Norwegen; Schweden; Schottland; hohe Flmen unsern Miasl in Sibirien; ferner in vulkanischen Auswürflingen des Vesuv; auch am Laacher-See; in Phonolith zu Auffig und Töpliz in Böhmen u. s. w.

161. Aeschynit.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 127^\circ$ ungefähr (Brooke). Die Gestalt, welche ich beobachtete, war entseitet, ähnlich der Augitform Fig. 137. pg. 234.; sie scheint meist zwillingsartig verbunden, jedoch so, daß die Zusammenwachsung mit den Nebenseiten Statt findet, wodurch ein- und ausspringende Winkel durch die Seitenflächen gebildet werden.

Krystalle meist undeutlich mit rauher oder gestreifter Oberfläche, eingewachsen.

Spuren von Theilbarkeit nach P. Bruch: Kleinmuscheltg. Härte = 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 5,14. Durchscheinend an den Kanten. Auf den Krystallflächen meist matt, oder schwach fettglänzend, auf den Bruchflächen metallähnlicher Glasglanz. Dunkelschwarz; rüthlich, bräunlichschwarz. Strich: bräun.

B. d. L. für sich unschmelzbar, aber sich aufblähend und rostgelb werdend; von Borax zu dunkelgelbem Glase lösbar; in Phosphorsalz zu farblosem klarem Glase. Chem. Gehalt nach Hartwell:

Titansäure	56,0
Zirkonerde	20,0
Eroxyd...	15,0
Kalkerde..	3,8
Eisenoxyd.	2,6
Zinnoxyd..	0,5

97,9

Findet sich eingewachsen in Granit, begleitet von Zirkon an den hohen Flämen unfern Miasa in Sibirien.

162. Pyrochlor.

Syn. Oktaedrisches Titanerz.

Kernform: regelmäßiges Oktaeder. Bis jetzt nur dieses beobachtet.

Krystalle meist glatt, zuweilen etwas rauh, gewöhnlich klein, eingewachsen, eingesprengt.

Bruch: muschelig. Härte = 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,21. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Glasglanz, meist fettartig. Dunkel röthlich- oder schwärzlichbraun. Strich: lichtebraun.

B. d. L. schwer zu einer schwarzbraunen, schlackigen Masse schmelzend; mit Borax zu rothgelbem durchsichtigem Glase; in Phosphorsalz leicht lösbar zu einer Perle, die im Oxydationsfeuer gelb erscheint, beim Erkalten aber gewöhnlich schön grasgrün wird. Chem. Gehalt nach Wöhler:


Titansäure	62,75
Cerorydul (Zirkonerde-haltig)	6,80
Kalkerde	12,85
Uranorydul	5,18
Manganorydul	2,75
Eisenoxyd	2,16
Zinnoxyd	0,61
Wasser	4,20
	<hr/> 97,30

Spuren von Flußsäure, Talk- und Thonerde sind vorhanden.

Eingewachsen in Zirkon-Syenit: Fredrikswärn und Laurvig in Norwegen; in Granit: Gegend des Flusses Tschereentschanka sieben Werst von Miasa im Gouvernement Orenburg.

Fig. 170.

162. Polymignit.



Kernform: gerade rektanguläre Säule. Die einzige bis jetzt, von G. Rose, beobachtete Gestalt ist: dreifach entseitert (n, s, t) und entseit (n) zur Spitze über P. Fig. 170.

Krystalle, klein, dünn, zwischen den M-Flächen zusammenge-
drückt, meist in der Richtung der Hauptaxe sehr verlängert, ge-
wöhnlich mit starker vertikaler Streifung auf den Seitenflächen,
eingewachsen.

Unvollkommen spaltbar nach den M- und T-Flächen. Bruch:
muschelig. Härte = 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,8. Undurch-
sichtig. Metallartiger Glanz. Schwarz. Strich: braun.

B. d. L. für sich unveränderlich; mit Borax leicht zu ei-
nem von Eisen gefärbten Glase schmelzbar, in Phosphorsalz
schwierig lösbar zu einem Glase, das im Reduktionsfeuer röthlich
wird. Chem. Gehalt nach Berzelius:

Tantalsäure	46,30
Zirkonerde	14,14
Yttererde	11,50
Erorxhd....	5,00
Eisenorxhd..	12,20
Manganorxhd	2,70
Kalkerde...	4,20

96,04

Eingewachsen im Zirkon-Syenit der Gegend von Fredriks-
wärn in Norwegen.

XVIII. Gruppe. Tantal.

Findet sich sehr selten und nur im oxydirten Zustande, als
Tantalsäure in Verbindung mit Yttererde, Eisen und Mangan-
oxydul und wenigen andern Metalloxyden.

Die Mineralien dieser Gruppe besitzen ein spezifisches Ge-
wicht von 5,3 — 5,8. Härte = 5,5 — 6. Spröde. Unvollkomme-
ner Metallglanz. Schwarze Farbe vorherrschend. B. d. L. un-
schmelzbar. Säuren ohne Wirkung.

164. Yttrtantalit.

Syn. Yttertantal. Tantale oxyde yttrifere. Yttr-Columbite.

Kernform: schiefe rhombische Säule.

Krystalle höchst undeutlich, meist in eingewachsenen Stücken
und Körnern, die zum Theil körnige Textur besitzen.

Sehr unvollkommen spaltbar parallel den Seitenflächen.
Bruch: muschelig ins Unebene. Härte = 5,5. Spröde. Spec.
Gew. = 5,39 — 5,88. Unvollkommen metallischer Glanz, zum
Fettglanz geneigt. An den Kanten durchscheinend, undurchsichtig.

Bruch, eisen-, graulich-, bräunlichschwarz; gelblichbraun. **Strich**: grau bis graulichweiß.

B. d. L. für sich unschmelzbar, aber die Farbe etwas verlierend; mit Borax zu einem beinahe farblosen Glase; in Phosphorsalz auflösbar. Im Kolben etwas Wasser gebend mit Reaktion von Flußsäure. Säuren ohne Wirkung. Chem. Gehalt nach v. Kobell (a); die Analysen des schwarzen (b), gelben (c) und braunen (d), Ytterantalits von Berzelius gaben:

Tantalsäure.	63,39	57,00	60,124	51,815
Yttererde ...	36,61	20,25	29,780	38,515
Kalkerde		6,25	0,500	3,260
Eisenoxyd ...		3,50	1,155	0,555
Uranoxyd ...		0,50	6,622	1,111
Wolframsäure		8,25	1,044 zinnhaltig	2,592
	100,00	95,75	99,225	97,818

Findet sich auf einem Feldspath-Lager im Gneiß: Finsbo, Ytterby und Kärarsfot in Schweden.

165. Fergusonit.

Kernform: quadratisches Oktaeder. $P \parallel P = 100^\circ 28'$ über den Scheitellanten; $= 128^\circ 27'$ über den Randlanten. Die bis jetzt beobachteten Gestalten sind: 1) fünffach, entseittelt und entrandet; 2) beßgl. zum Versch. der Kernflächen.

Krystalle mit unebener Oberfläche, eingewachsen.

Unvollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: vollkommen muschelig. Härte = 5,5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 5,8. Undurchsichtig in dünnen Splintern durchscheinend. Zwischen Fett- und Metallglanz. **Bruch**, dunkel braunlichschwarz. **Strich**: hellbraun.

B. d. L. bläßgelb werdend, aber unschmelzbar; mit Borax schwierig zu einem gelben Glase; in Phosphorsalz langsam auflösbar. Chem. Gehalt nach Hartwell:

Tantalsäure	47,75
Yttererde ..	41,91
Cerorydul. .	4,68
Zirkonerde .	3,02
Zinnoxyd ..	1,00
Uranoxyd ..	0,95
Eisenoxyd ..	0,34
	99,65

Kommt in Quarz und Feldspath eingewachsen vor, zu Akkreturstat unfern des Kaps Farwell in Grönland.

XIX. Gruppe. Scheel.

Kommt selten und nicht rein in der Natur vor, sondern stets in oxydirtem Zustande als Scheelsäure, mit Kalkerde, Eisen- und Manganoxydul oder Bleioxyd verbunden.

166. Scheelit.

Syn. Scheelkalk. Scheelspath. Schwerstein. Tungstein. Prismatischer Scheelbaryt. Schéelin calcaire. Tungstate of Lime.

Kernform; quadratisches Oktaeder. $P || P = 108^\circ 12' 30''$ über den Scheitellanten; $= 112^\circ 1' 30''$ über den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform, 2) vierfach entseittelt in der Richtung der Flächen (ähnlich Fig. 161. pg. 266.); 3) fünffach entseittelt vier Entseittelungs-Flächen, in der Richtung der P-Flächen, z. Versch. der Kernflächen (d), die fünfte horizontal (a), Fig. 171.; 4) zwölffach entrandeckt (n) in der Richtung der Scheitellanten, Fig. 172.; 5) beßgl. und entseittelt, Fig. 173.; 6) vierfach entrandeckt, zwei Entrandeckungsflächen in der Richtung der Scheitellanten (n) und zwei anliegende in der Richtung des Randes (a), wodurch eine abnorme Flächenstellung entsteht, Fig. 174.; 7) verschiedene andere Combinationen und Zwillinge.

Fig. 171.




Fig. 172.




Fig. 173.





Fig. 174.



Krytalle, meist pyramidal, selten tafelartig, mit glatter, zuweilen auch drüsiger, rauher oder gestreifter Oberfläche, einzeln auf-, selten eingewachsen, auch zu Drüsen versammelt und mannigfach gruppiert; krytallinische Massen von körniger Zusammensetzung, nierenförmig eingesprengt.

Ziemlich deutlich spaltbar parallel den Kern- und den Ent-randungs-Flächen; Spuren nach der Entschüttelung. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 4,5. Spröde. Spec. Gew. = 6 — 6,1. Durchscheinend meist nur an den Ranten. Glasglanz, häufig diamant- oder fettartig. Weiß; gelblich, graulichweiß; grau; gelb; orangegelb; gelblichbraun; braun. Strich: weiß. Erwärmte Bruchstücke phosphoresziren.

B. d. L. schmilzt er schwer zu einem halbdurchsichtigen Glase; mit Borax leicht zu einem klaren Glase, das schnell unklar, milchweiß und krytallinisch wird; in Phosphorsalz leicht zu klarem Glase, das in der innern Flamme grün und blau bei der Abkühlung erscheint. Das feine Pulver wird von Salz- und Salpetersäure zersetzt, mit Hinterlassung eines citronengelben Pulvers. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Scheelsäure 81,4

Kalkerde .. 18,9

100,0

Auf Zinnerz-Lagerstätten im älteren Gebirge, begleitet von Wolfram, Quarz, Kupferkies, Glimmer: Zinnwald, Schlaggenwald, Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge; Cornwall; St. Léonard im Departement der hohen Vienne; Konnektikut; auf Magnet-eisen-Lagern: Ribbarhyttan und Bispsberg in Schweden; auf Erzgängen im Grauwacke-Gebirge: Reudorf im Anhaltischen; auf Lagern im Granit zu Pöding in Ungarn; auf Quarzlagern im Gneiß zu Schellgaden in Salzburg.

XX. Gruppe. Molybdän.

Das Molybdän wird nicht rein gefunden, sondern theils im oxydirten Zustande, als Molybdänoryd, und zwar dieses für sich oder mit Bleioryd vereinigt, auch mit Schwefel verbunden.

Das specifische Gewicht der Mineralien dieser Gruppe über-

folgt nicht 4. a. Sie sind weich, undurchsichtig, gefärbt, gelb oder bleigrau. B. d. L. mit Borax und etwas Salpeter in der äußern Flamme ein farbloses, in der innern ein braunes, durchsichtiges Glas gebend.

167. Molybdänocter.

Syn. Wasserbleiocter. Molybdäno oxydé. Molybdäna-Ochre.

Bis jetzt nur in erdartigen, zerreiblichen Theilchen, auch als Ueberzug oder eingesprengt gefunden.

Undurchsichtig. Matt. Schwefelgelb ins Pomeranzengelbe. Strich: gelb, etwas glänzend.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er, raucht und wird eingesogen; mit Borax in der äußeren Flamme ein farbloses oder von Eisen gefärbtes Glas gebend; mit Phosphorsalz im Reduktionsfeuer zu einem Glas schmelzend, das beim Abkühlen klar und schön grün wird. In Salzsäure leicht auflöslich. Chem. Zusammens. nach Berzelius:

Molybdän . 66,613

Sauerstoff . 33,387

100,000

Etwas mit Eisenoryd verunreinigt.

Als Ueberzug auf Molybdänglanz (aus dem er wahrscheinlich durch Zersetzung hervorgegangen ist) auf Quarz oder Feldspath: Bispsberg und Linnäs in Schweden; Nummedalen in Norwegen; Corybup in Schottland; Sibirien.

168. Molybdänglanz.

Syn. Wasserblei. Rhomboedrischer Molybdänglanz. Schwefel-Molybdän. Molybdäno sulfuré. Sulphuret of Molybdäna.

Kernform: sechsseitige Säule. Außer dieser, die besonders deutlich zu Heskett-new-market in Cornwall und zu Brunswick in Massachusetts gefunden wird, sollen noch Entzündungen zur Spizung vorkommen.

Krystalle, tafelartig, selten deutlich, sächerförmig gruppiert oder einzeln eingewachsen, mit glatten P. und horizontal gestreiften M.-Flächen; krystallinische Massen, eingesprengt.

Sehr vollkommen spaltbar parallel den Endflächen. Bruch nicht beobachtbar. Härte = 1 — 1,5. Sehr milde, in dünnen Blättchen biegsam. Spec. Gew. = 4,5 — 4,6. Undurchsichtig. Starker Metallglanz. Rötlich-bleigrau. Strich: bleigrau. Abfärbend, schreibend. Fettig anzufühlen.

B. d. L. färbt er die Flamme lichte grün; auf Kohle riecht er nach schwefeligter Säure, raucht, beschlägt dieselbe weiß, und bleibt unverändert. Von Borax wird er nur schwer angegriffen. Mit Salpeter im Platinsöffel betonirt er mit einer Feuer-Erscheinung, und löst sich in dem geschmolzenen Salze auf, unter Hinterlassung einiger gelben Flocken. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Molybdän 60

Schwefel . 40

100

Findet sich eingewachsen in verschiedenen abnormen Felsarten, wie in Granit, Gneiß zc., auch auf Gängen, Zinnerz- und anderen Lagerstätten, begleitet von Quarz, Zinnerz, Wolfram u. m. a. Mineralien. Zinnwald, Schlaggenwald, Altenberg, Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge; Glaz in Schlesien; Obergas in Mähren; Drowicza in Ungarn; Chamounythal; Cornwall; Corybuc in Schottland; Arendal, Hitterdalen, Laurvig in Norwegen; Bispberg, Bärgeberg, Märzhytta u. v. a. D. in Schweden; Siberien; Grönland; Haddam, Northampton, Baltimore und New-York in Nordamerika.

Man verwendet denselben zur Bereitung von blauer Farbe, zum Poliren des Stahles, zum Lössiren von Messingwaaren.

Banadium, von Sefström in neuerer Zeit im schwedischen Eisen entdeckt, soll sich auch noch in Verbindung mit Bleioryd zu Zimapan in Mexiko finden.

XXI. Gruppe. Chrom.

In der Natur findet sich das Chrom nur oxydirt; und in diesem Zustande besonders mit Bleioryd und Eisenoxydul verbunden. In geringerer Menge kommt es noch in einigen Mineralien vor.

169. Chromocer.

Syn. Chrome oxidé. Oxyde of Chrom.

Bis jetzt nur in erdigen, zerreiblichen und verben Massen gefunden, die zuweilen Spuren von krystallinischer Struktur zeigen.

Weich. Undurchsichtig oder nur schwach durchscheinend. Wenig glänzend, matt. Gras-, span-, apfelgrün, blaßgelb. Strich: grünlichweiß.

B. d. L. blüßt er die Farbe ein, wird zuweilen weiß, schmilzt nicht, verschlackt sich aber auf der Oberfläche. Färbt die Flasse smaragdgrün. Chem. Zusams. im reinsten Zustande Chromorydul.

Chrom.... 70

Sauerstoff. 30

100

Als Ueberzug und als Ausfüllung kleiner Höhlungen im Chromeisen auf der Shetland-Insel Unst; in einem Trümmer-Gestein mit Quarz und Thon gemengt bei Creuzot im Departement der Saonne und Loire; zu Elfdalen in Schweden, wahrscheinlich in Albit; in Porphyr bei Halle.

XXII. Gruppe. Uran.

Das Uran findet sich nur in geringer Menge und stets oxydirt in der Natur; und in solcher Form theils rein, theils mit Schwefel, Phosphorsäure und einigen Metakorpern verbunden.

Das specifische Gewicht der hierher gehörigen Mineralien übersteigt nicht 6,5; ihre Härte steht, mit Ausnahme des Uranpacherzes, unter der des Kalkspaths; sie sind gefärbt. Mit Phosphorsalz vor dem Löthrohre geschmolzen, geben sie in der Oxydationsflamme ein gelbes, in der Reduktionsflamme ein grünes Glas; ersteres wird beim Abkühlen zuweilen etwas grünlich, die Farbe des letzteren dagegen wird erhöht.

170. Uran-Pecherz.

Syn. Pechblende. Untheilbares Uranerz. Urane oxydulé. Pitch-Blende.

Derbe Massen, nierenförmig, traubig, eingesprangt.

Nicht spaltbar. Bruch: flachmuschelig bis uneben. Härte = 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 6,3 — 6,5. Undurchsichtig. Metallähnlicher Fettglanz. Pech-, raben-, graulich-, braunlich-, grünlich-schwarz. Strich: grünlichschwarz.

B. d. L. für sich unschmelzbar, färbt aber die äußere Flamme grün; mit Borax zu einem dunkelgelben Glase, das im Reduktionsfeuer unrein grün wird; mit Phosphorsalz im Reduktionsfeuer zu einem gelben Glase, das beim Abkühlen einen Stich ins Grünliche bekommt; im Reduktionsfeuer zu einem grünen Glase, dessen Farbe beim Abkühlen noch schöner wird. Das Pulver ist größtentheils in Salpetersäure auflöslich. Chem. Zusamm. im reinsten Zustande Uranorydul:

Uran..... 96,446

Sauerstoff.. 3,554

100,000

Gewöhnlich mit etwas Eisenorydul, Kieselerde, Kupferoryd, Schwefel, Blei u. verunreinigt.

Findet sich auf Silber- und Zinnerz-Gängen, begleitet von Kupferkies, Uranglimmer, Silber u. Johann-Georgenstadt, Annaberg, Schneeberg und Marienberg in Sachsen; Joachimsthal in Böhmen; Redruth in Cornwall.

Es werden gelbe und bräune Farben aus demselben bereitet, welche man in der Porzellan-Malerei verwendet.

171. Uranocer.

Syn. Urane oxyde terreux. Uran-Ochre.

Derbe Parteen, angeflogen, eingesprengt.

Bruch: erdig. Sehr weich. Undurchsichtig. Schwefel-, citronengelb; bräunlich, röthlich.

B. d. L. gibt er im Kolben Wasser und wird roth, im Reduktionsfeuer färbt er sich grün, ohne zu schmelzen; im Uebrigen verhält er sich ganz wie das Uranpecherz. Chem. Zusamm. im reinen Zustande Uranoryd-Hydrat.

Findet sich mit anderen Uranerzen zu Joachimsthal in Böh-

men; Johann-Georgenstadt in Sachsen; St. Vrieux bei Annoges in Frankreich.

172. Johannit.

Syn. Uran-Bismut.

Krystallsystem wahrscheinlich Kline-rhombisch. Haidinger beschreibt zwei Gestalten, aus deren Winkel er jedoch keine Kernform berechnen konnte.

Krystalle, sehr klein, zu traubenförmigen Drusen verbunden, nadel- und haarförmig.

Spaltbarkeit schwierig zu beobachten, es sind jedoch Spuren derselben vorhanden. Bruch: vollkommen muschelig. Härte = 2 — 2,5. Spec. Gew. = 3,191. Halbdurchsichtig. Glasglanz. Grasgrün. Strich: blaß zeisiggrün. Geschmack mehr bitter als zusammenziehend.


B. d. L. im Kolben ziemlich viel Wasser gebend und zu einer schwärzlichbräunen, zerreiblichen Masse werdend. Mit Borax zu einem grünen Glase lösbar, mit Phosphorsalz grüne Farbe zeigend, in der äußern Flamme mehr von Kupfer, in der innern mehr von Uran. In Salpetersäure auflösbar. Aehendes Ammoniak fällt aus der Auflösung einen orangegelben Niederschlag, der sich vor dem Löthrohre wie Uranoryd verhält. Chem. Zusamm. nicht genau gekannt; wahrscheinlich Uranoryd, Schwefelsäure und Wasser mit etwas beigemengtem Kupferoryd.

Als Ueberzug auf Uranerzen bei Joachimsthal in Böhmen gefunden. — Er ist ein secundäres Gebilde.

173. Uranglimmer.

Syn. Uranit. Chalkolith. Pyramidaler Euxlor-Glimmer. Uranoxyd. Phosphate of Uranium.

Fig. 175.



Kernform: quadratisches Octaeder. $P || P = 95^{\circ} 46'$ über den Scheitelfanten; $= 143^{\circ} 2'$ über den Randfanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform, selten; 2) entscheidet (c), Fig. 175.; 3) beßgl. und

entrandet (m), Fig. 176.; 4) entseiteitelt und entrandet β . Verschwinden der Kernflächen (quadratische Säule, Fig. 176. ohne die P-Flächen); 5) entseiteitelt und entseiteiteltantet (d), Fig. 177.; 6) entseiteitelt und entrandet (r), Fig. 178.; 7) beßgl. und entrandet β . Verschw. der Kernflächen (entseitete quadratische Säule) u. s. w.

Fig. 176.



Fig. 177.





Fig. 178.



Krystalle, gewöhnlich tafelartig durch Vorherrschen der o-Flächen seltener säulenartig, die o-Flächen glatt, die anderen meist horizontal gestreift, auch rauh, einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden; in dünnen Blättchen, angeflogen; selten derb von körnig-blättriger Zusammensetzung.

Sehr vollkommen spaltbar parallel den Entseittelungsflächen: undeutlich nach 'm'. Bruch nicht zu beobachten. Härte = 2 — 2,5. Milde. Spec. Gew. = 3,1 — 3,3. Durchsichtig bis durchscheinend. Diamantartiger Glasglanz, auf den Spaltungsflächen Perlmutterglanz. Gräs-, smaragd-, zeisiggrün; citronengelb. Strich: gleichfarbig.

B. d. L. auf Kohle zu einem schwarzen etwas krystallinischen Korne schmelzend; mit Borax und Phosphorsalz leicht zu einem klaren Glase lösbar, das im Drydationsfeuer dunkelgelb und im Reduktionsfeuer schön grün ist. Der kupferorydhaltige Uranglimmer gibt mit Phosphorsalz und Zinn Reaktion von Kupferorydul. Im Kolben Wasser gebend. In Salpetersäure leicht auflöslich zu einer gelben Flüssigkeit. In der chem. Zusams. zeigt sich der Uranglimmer verschieden, ein Theil enthält Kalkerde (Uranit), der andere Kupferoryd (Chalkolith); in ihren stereometrischen und physikalischen Merkmalen scheinen beide Arten außerdem jedoch ganz übereinzustimmen. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Kalk-Uranglimmer. Kupfer-Uranglimmer.

Uranoryd	59,0	61,9
Phosphorsäure	14,2	14,9
Kalkerde	5,5	Kupferoryd 8,3
Wasser	21,3	14,9
	<hr/> 100,0	<hr/> 100,0

Häufig mit etwas Kiesel-erde, Eisen-oryd und Baryterde verunreinigt.

Findet sich auf Zinn-, Silber-, Kupfer- und Eisenerz-Gängen in Granit und Thonschiefer: Redruth, St. Day u. a. D. in Cornwall; Eibenstock, Johann-Georgenstadt, Schneeberg und Zinnwald im Erzgebirge; Welsendorf und Bodenmais in Baiern; Autun und Limoges in Frankreich.

XXIII. Gruppe. Mangan.


Findet sich nicht rein in der Natur, sondern mit Sauerstoff, und zwar mit diesem in mehreren Verhältnissen, und mit Schwefel verbunden. Im oxydirten Zustande kommt es in vielen Mineralien vor.

Die hierher gehörigen Mineralien besitzen ein specifisches Gewicht von 3,3 — 4,9. Härte = 2,5 — 6,5. Sie sind meist undurchsichtig. Gefärbt. Vor dem Löthrohre schmelzen sie mit Borax in der Oxydationsflamme zu einem violetten Glase. Sie werden, mit Ausnahme des Kiesel-Mangans, durch Salzsäure aufgelöst, oder doch zersezt.

174. Pyrolusit.

Syn. Mangan-Hyperoxyd. Prismatisches Manganerz. Grau-Braunstein ꝛ. Th. Grey oxyde of Manganese.

Fig. 179.



Kernform: gerade rhombische Säule. $M || M = 93^{\circ} 40'$ und $86^{\circ} 20'$. Beobachtete Gestalten: 1) entmittelseitet (e) und entspißect (d) (Fig. 179. ohne die Flächen b); 2) entseit (e und b) und entspißect (d), Fig. 179. Die Flächen e zuweilen so vorherrschend, daß ganz dünne Blättchen entstehen.

Krystalle, theils kurz, theils lang säulenartig oder nabelförmig, spießig, mit unebener oder gestreifter Oberfläche, auf- und mannigfach durcheinander gewachsen, auch zu Drusen und Büscheln gruppirt; Auster-Krystalle nach Kalkspathformen; krystalli-

nische Massen von körniger, stängeltiger und faseriger Zusammen-
setzung; strahlenförmig von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte
auslaufend; nierenförmige Schalen, tropfsteinartig.

Spaltbar parallel den Seitenflächen und nach der kleinen
Diagonale der Endflächen, hier ziemlich vollkommen. Bruch: un-
eben. Härte = 4,8 — 4,94. Undurchsichtig. Metallglanz. Eisen-
schwarz, zuweilen ins Stahlgraue. Strich: schwarz.

B. d. L. für sich unschmelzbar; mit Borax leicht zu einem
klaren Glase fließend, das in der äußern Flamme Amethystfarbe
bekommt. Gibt im Kolben kein Wasser oder nur Spuren. In
Salzsäure löst sich das Pulver unter Entwicklung von Chlor
vollkommen auf zu einer grünlichen Flüssigkeit. Chem. Gehalt
nach Turner:

Rothes Manganoryd	86,055	Mangan....	63,364
Sauerstoff.....	11,780	Sauerstoff...	36,636
Wasser.....	1,120		100,000
Baryterde.....	0,532		
Kieselerde.....	0,513		
	100,000		

Findet sich auf Gängen im Porphyr, begleitet von Baryt-
spath zu Ilmenau, Elgersburg, Dehrenstock, Friedrichsrode u. a.
O. in Thüringen; auf kleinen Gängen von Quarz und Kalkspath
im Thonschiefer am Singelsberge bei Goslar auf dem Harze;
auf Eisenerz-Gängen und Lagern: Hüttenberg in Ädrnthen;
Schmalkalden in Hessen; Ruhbach bei Weilburg in Nassau; Vol-
lenbach im Saynischen; Gruben Eisenzeche, Kohlenbach, alte und
starke Birke im Siegen'schen; ferner trifft man ihn im Bairen-
thischen; zu Johann-Georgenstadt in Sachsen; zu Ehrendorf in
Mähren; zu Konradswaldau in Schlesien; zu Nababula in Un-
garn; in Schweden; in Brasilien u. s. w.

Man benutzt den Pyrolusit auf Glashütten zur Reinigung
und Entfärbung der Glasmasse, zum Färben der violblauen,
braunen und schwarzen Gläser, zur Darstellung der amethystfar-
benen Glasfläße, zum Malen auf Porzellan und Fayence, zur
Töpferglasur zc., besonders wichtig macht sich das Metall in der
Chemie durch die Gewinnung des Sauerstoffgases aus ihm, wel-
ches zur Darstellung des Chlors verwendet wird.

175. Hausmannit.

Syn. Schwarz-Manganerz. Schwarzer Braunstein. Blätteriger Schwarz-Braunstein. Pyramidales Manganerz. Black-Manganese-Ore.

Kernform: quadratisches Octaeder $P||P=105^{\circ} 25'$ über den Scheitellanten; $=177^{\circ} 54'$ über den Randkanten (Haidinger). Vorkommende Gestalten: 1) Kernform, Fig. 180.; 2) vierfach entseittelt (a) in der Richtung der Flächen, Fig. 181.; 3) Zwillinge der Kernform.

Fig. 180.





Fig. 181.



Krystall, meist klein, Oberfläche parallel dem Rande gestreift, die Flächen a glatt und glänzend, aufgewachsen; berbe Massen mit körniger Zusammensetzung, jedoch fest verwachsen.

Ziemlich vollkommen spaltbar in der Richtung des Randes, minder deutlich nach den Kernflächen. Bruch: uneben. Härte = 5,0 — 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,72. Undurchsichtig. Unvollkommener Metallglanz: Braunlich-schwarz. Strich: dunkel röthlich- oder kastanienbraun.

B. d. L. unschmelzbar, mit Borax zu einem dunkel violet-blauen, fast schwarzen Glase. Im Kolben kein Wasser gebend. Ein Gemisch aus gleichen Theilen Wasser und Vitriolöl in der Kälte kolombinroth färbend. Chem. Gehalt nach Turner:

Manganoryd-Drydul	98,902	Manganoryd..	68,99
Sauerstoff.....	0,215	Manganorydul	31,01
Wasser	0,435		100,00
Baryterde.....	0,111		
Kieselerde.....	0,357		
	100,000		

Findet sich auf einem Gange im Porphyr zu Ilesfeld am Harz.

176. Braunit.

Syn. Brachytypes Manganerz.

Kernform: quadratisches Octaeder. $P||P = 109^{\circ} 53'$ über den Scheitellanten; $= 108^{\circ} 39'$ über den Randkanten (Haibinger). Vorkommende Gestalten: 1) Kernform (Fig. 182 ohne o); 2) entseittelt (o), Fig. 182.; 3) zweifach entrandet (s), Fig. 183; 4) beßgl. 3. Verschwinden der Kernflächen (Fig. 183. ohne die P-Flächen); 5) zweifach entrandet und entseittelt, Fig. 184; 6) vierfach entrandet (z) 3. Versch. des Randes, Fig. 185.

Fig. 182.

Fig. 183.







Fig. 184.

Fig. 185.



Krystalle, meist klein, theils glatt und eben oder auch etwas gekrümmt, theils rauh und uneben oder die Flächen o und s gestreift, aufgewachsen und zu Drusen verbunden; derbe Massen von körniger Zusammensetzung.

Vollkommen spaltbar parallel den Kernflächen (aber nicht in der Richtung des Randes). Bruch: uneben. Härte = 6,0. Spröde.

Blum, Oryktozoologie.

Spec. Gew. = 4,8 — 4,9. Undurchsichtig. Unvollkommen metallisch glänzend. Dunkel braunlichschwarz. Strich: von derselben Farbe.

B. d. L. unschmelzbar; mit Borax zu einem violetten Glase fließend. Im Kolben kein Wasser gebend. Das Pulver färbt Schwefelsäure sehr bald roth. Chem. Gehalt nach Turner:

Manganorydul 86,940	Mangan.. 69,752
Sauerstoff..... 9,851	Sauerstoff. 30,248
Wasser..... 0,949	100,000
Baryt..... 2,260	
100,000	

Findet sich auf Andern im Porphyr zu Dehrenstock bei J. menau, zu Friedrichsroda, Elgersburg u. a. O. in Thüringen; in Höhlungen von Quarz zu Lembach im Mansfeldischen; Streitberg im freien Grunde unweit Neuenkirchen auf dem Westerwald; St. Marcel in Piemont mit Grammatit; Wunsiedel bei Blareuth in Baiern.

177. Manganit.

Syn. Gewässertes Mangan-Hyperoxydul. Grau-Manganerz und grauer Braunstein ꝛ. Th. Prismatisches Manganerz. Manganese oxyde ꝛ. Th. Grey Oxide of Manganese ꝛ. Thl.

Kernform; gerade rhombische Säule. $M||M=99^{\circ}40'$ und $80^{\circ}20'$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) zweifach entschärfseitig (s), Fig. 186; 3) beögl. und entstumpfeckt (d), zur Schärfung über P, Fig. 187; 3) zweifach entschärfseitig (l), zweifach entstumpfeckt (r), zweifach entstumpfeckt (g), zur Schärfung über P, und fünffach entspitztekt (m, n und e), Fig. 188; 4) mehrere verwickeltere Combinationen, so wie Zwillinge, namentlich von No. 3.

Fig. 186.




Fig. 187.





Fig. 188.



Krystalle, meist lang gestreckt, nadelförmig, selten kurz säulenartig, glatt oder, besonders die Seitenflächen, vertikal gestreift; ein- und aufgewachsen, zu Drusen und Gruppen verbunden; krystallinische Massen mit blätteriger Textur, derb von stängelig bis faseriger, und von körniger Zusammensetzung; dicht, erdig.

Sehr vollkommen spaltbar parallel der kleinen Diagonale der Endflächen, minder deutlich nach den M-Flächen. Bruch: uneben. Härte = 3,5 — 4,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,3 — 4,4. Undurchsichtig. Glanz, unvollkommen metallisch. Eisenschwarz bis dunkel bräunlichschwarz; Stahlgrau. Strich: röthlich-braun. Häufig erhält man auf der Außenfläche von Krystallen und Aggregaten einen schwarzen Strich, während die inneren Theile die charakteristische Farbe in dieser Hinsicht zeigen.

B. d. L. unschmelzbar; mit Borax leicht zu einem Glase auflösbar, das in der äußeren Flamme eine violblaue Farbe erhält, in der inneren aber farblos bleibt. Im Kolben Wasser gebend. Färbt kalte Schwefelsäure erst nach zwei bis drei Tagen roth. Ohne Rückstand in Salpetersäure lösbar. Chem. Zusammf. nach Turner:

Roths Manganoxyd 86,85

Sauerstoff..... 3,05

Wasser..... 10,10

100,00

Er kommt auf Gängen im Porphyr, von Baryt- und Kalkspath begleitet, zu Ilfeld am Harze vor. Ferner: zu Ilmenau in Thüringen; Eibenstock, Platten, Schwarzenberg im Erzgebirge; Graham in Aberdeenshire; Cornwall; Christiansand in Norwegen; Undenæs in Westgothland u. s. w.

Wird auf ähnliche Weise wie der Pyrolusit verwendet.

178. W a d.

Syn. Braun-Eisenrath z. Thl. Wad. Black-Wad.

Faserige, schuppige und erdige Massen, derb, kugelig, traubig, niereinförmig, tropfsteinartig, staudenförmig, schaumartig, als Ueberzug.

Bruch: flachmuschelig, auch erdig. Härte = 0,5 — 1,5. Sehr milde. Spec. Gew. = 3,7. Undurchsichtig, zuweilen an

den Kanten durchscheinend. Schwach metallisch-glänzend, matt. Rellen-, schwärzlich-, leberbraun; braunlichschwarz. Strich: braun. Abfärbend.

B. d. L. an Volumen abnehmend, schwarz werdend und ein eisenartiges Ansehen erlangend; mit Borax leicht und schnell unter einigem Aufwallen, im Drydationsfeuer zu einem violblauen Glase schmelzend. Im Kolben Wasser gebend. In Salzsäure unter Chlor-Entwicklung bis auf einen geringen Rückstand lösbar. Chem. Gehalt nach Turner:

Roths Manganoxyd	79,12
Sauerstoff	8,82
Wasser	10,66
Baryt	1,40
	<hr/> 100,00

Häufig mit Eisenoxyd, zumeilen auch mit Kiesel-erde verunreinigt.

Findet sich mit anderen Manganerzen und Eisenerzen: Iberg, Elbingrode und Zellerfeld am Harz; mehrere Gruben auf dem Westerwalde; Naila in Baireuth; Wolfsteig in Thüringen; Hüttenberg in Kärnten; Radabula in Ungarn; la Romanèche in Frankreich; Upton-Pyne in Devonshire; Derbyshire u. s. w.

179. Manganglanz.

Syn. Manganblende. Schwefel-Mangan. Hexaedrische Glanzblende. Manganèse sulfuré. Sulphuret of Manganese.

Kernform: Würfel. Bis jetzt nur die Entdeckung, welche oft bis zum Verschw. der Randkanten vorschreitet, beobachtet.

Krystalle, rauh, aufgewachsen; krystallinisch-körnige Massen, eingesprengt.

Spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: uneben bis unvollkommen muschel. Härte=4. Wenig spröde. Spec. Gew. = 3,95 — 4,0. Undurchsichtig. Metallglanz. Eisenschwarz bis dunkel stahlgrau. Strich: lauchgrün.

B. d. L. schwer an den Kanten zu einer bräunlichen Schlacke schmelzend; mit Borax schwer zu einem gelblichen Glase fließend; in Phosphorsalz wird er unter starkem Brausen und lebhafter Gasentwicklung aufgelöst. Das Pulver braust heftig mit con-

centrirter Salpetersäure und entwickelt rothe Dämpfe. Chem. Gehalt nach Bauquelin:

Manganorydul 85

Schwefel..... 15

100

Nach Klaprotch's Analyse ergaben sich 5 Pct. Kohlen- säure.

Auf Gängen mit Tellurerzen, Eisenkies, Fahlerz u. zu Ragn-Åg in Siebenbürgen. — Mexiko. Cornwall?

180. Kohlen-saures Mangan.

Syn. Manganspath. Rother Braunstein. Makrotyper Parachros- barpt. Manganèse oxydé carbonate of Manganese.

Kernform: Rhomboeder. $P||P = 106^{\circ} 51'$ über den Scheitellanten; $= 73^{\circ} 9'$ über den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entscheitellantet (ähnlich Fig. 68. pg. 130.); 3) entrandet und entscheitelt z. Verschw. der Kernflächen (sechseitige Säule).

Krystalle, klein, die Rhomboeder häufig sattel- oder linsenar- tig gekrümmt, die Säulen tafelartig, theils glatt, theils gestreift, zu Drusen verbunden, auch kugelig oder traubig zusammenge- häuft; krystallinische Massen mit blätteriger Textur, die zuweilen ins Körnige übergeht (spätiges kohlen-saures Mangan, Dialogit); derb, nierenförmig, kugelig, eingesprengt (dichtes kohlen-saures Mangan, Rhodochrosit).

Vollkommen spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: uneben. Härte = 4. Spröde. Spec. Gew. = 3,4 — 3,6. Durch- scheinend, meist nur an den Ranten. Glasglanz, zuweilen perl- mutterartig. Rosen-, fleischroth; röthlichweiß, an der Luft bräun- lich werdend. Strich: lichte röthlichweiß.

B. d. L. zum Theil decrepitirend, und bei strenger Hitze grünlich-grau oder schwarz werdend; mit Borax leicht, und unter einigem Aufwallen zu vioiblauem Glase, das durch Eisen etwas verunreinigt ist. In erwärmter Salzsäure löst sich das Pulver

mit lebhaftem Brausen auf. Chem. Zusams. nach L. Gmelin (a), Analyse von Berthier (b);

	a	b
Manganorydul	62,4	51,0
Kohlensäure...	37,9	38,7
	100,0	Eisenoxydul... 4,5
		Kalkerde 5,0
		Talkerde 0,8
		100,0

Gewöhnlich mit Eisenoxydul und Kalkerde verunreinigt.

Findet sich auf Erz-Gängen, begleitet von Blende, Eisensies, Quarz u. Freiberg in Sachsen; Kapnik, Nagy-Ag und Offenbanpa in Ungarn; Schebenholz bei Elbingrode am Harz; Sibirien.

181. Psilomelan.

Syn. Untheilbares Manganerz. Schwarz-Eisenstein. Dichtes Schwarz-Manganerz. Manganèse oxydé hydraté concrétionné. Black-Iron-Ore.

Umhüllungs- Pseudomorphosen nach Flußspath- und Roth-Kupfererz-Ofttaedern, meist aber stalaktitische, trauben-, nieren-, kolben-, röhren-, staudenförmige Gestalten von krummschaliger, feinfaseriger bis dichter Zusammensetzung; derbe Massen von dichter, seltener von feinkörniger Zusammensetzung.

Bruch: flachmuschelig bis eben. Härte = 5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 4,0 — 4,14. Undurchsichtig. Unvollkommen metallisch-glänzend, auch nur schimmernd oder matt. Blaulich-, graulichschwarz; schwärzlich-, dunkel stahlgrau. Strich: braunlich-schwarz, glänzend.

B. d. L. unschmelzbar; mit Borax zu einem violblauen Glase. Im Kolben etwas Wasser gebend. In Salzsäure leicht auflöslich. Die Auflösung gibt mit Schwefelsäure einen Niederschlag von schwefelsaurem Baryt. Schwefelsäure wird von dem Pulver bald roth gefärbt. Chem. Gehalt einer Varietät von Schneeberg (a) und einer anderen von la Romandche (b) nach Turner:

	a	b
Roths Manganoryd	69,795	70,967
Sauerstoff	7,364	7,260
Baryterde	16,365	16,690
Kieselerde	0,260	0,953
Wasser	6,216	4,130
	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>

Kommt häufig vor. Auf Roth-Eisenstein-Gängen im Gneiß zu Johann-Georgenstadt, Schneeberg u. a. D. im Erzgebirge. Oft mit Pyrolusit in Lagen wechselnd und traubige Gestalten bildend, oder regellos mit ihm gemengt: Hollerter-Zug bei Kirchen auf dem Westerwalde; Eisersfeld u. a. D. im Siegen'schen; Biber und Schmalkalden in Hessen; Arzberg im Baireuth'schen; Ilmenau und Brotteroda in Thüringen; Langenberg in Sachsen; Schwarzenenthal in Böhmen; Neufkirchen und Konradswaldau in Schlesien; Steyermark; Ungarn; Cornwall; Erter und Upton Pyne in Devonshire u. s. w.

182. Kiesel-Mangan.

Syn. Mangan-kiesel. Rothstein. Manganèse oxydè silicifère. Siliciferous Oxide of Manganese.

Krystallinische Massen mit blätteriger oder körniger Textur; herb, dicht, eingesprenkt.

Vollkommen spaltbar nach den Seiten einer Säule unter Winkeln von $87^{\circ} 5'$ und $92^{\circ} 55'$, undeutlich nach beiden Diagonalen. Bruch: uneben, splitterig. Härte = 5 — 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,5 — 3,7. Durchscheinend, meist nur an den Kanten. Glas-, auch Perlmutterglanz. Dunkel rosenroth, pfirsich-blüthroth, zuweilen ins Violblaue oder Bräunliche. Strich: röthlichweiß.

B. d. L. im Reduktionsfeuer zu einem halbklares Glase, im Oxydationsfeuer zu einer schwarzen metallischen Kugel schmelzend; mit Borax in der äußeren Flamme zu einem violblauen in der innern zu einem farblosen Glase. Salz- und Salpetersäure ohne merkliche Einwirkung. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Manganorydul	52,9
Kieselerde	47,1
	<u>100,0</u>

Meistens mit Kalkerde, Eisenoryd und Talkerde verunreinigt.


Auf Magneteisen-Lagern zu Långbanshyttan in Schweden; auf Erzgängen zu Kapnik in Ungarn. Andere Fundorte desselben sind: Ekatharinburg in Sibirien; Neuwerk im Bedethale, Stahlberg bei Rübeland und Scheebenholz bei Elbingrode am Harz; Prackendorf in Ungarn; Cornwall; Devonshire; in losen Blöcken zu Cummington in Massachusetts.

Allagit, Rhodonit, Photizit und Hornmangan sind Gemenge von kohlensaurem und Kiesel-Mangan mit etwas Thonerde, Kalkerde und Eisenoryd; sie haben rosenrothe bis isabellgelbe, röthlich- und kastanienbraune, graue und gelblichweiße Farben und kommen zu Scheebenholz und Stahlberg am Harze vor.

183. Helvin.

Syn. Tetraedrischer Granat.

Fig. 189.



Kernform: Tetraeder. Außer diesem kommen noch vor: 1) enteckt, Fig. 189; 2) dreifach enteckt.

Krystalle, klein, mit glatter oder rauher und unebener Oberfläche, einzeln ein- oder aufgewachsen, auch zu Drusen verbunden; verb., eingesprengt.

Unvollkommen spaltbar parallel den Kern- und den Entseittelungs-Flächen. Bruch: uneben. Härte = 6 — 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,1 — 3,3. An den Kanten durchscheinend. Fettglanz, glasartig. Wachs-, honiggelb; gelblichbraun; öl-, oliven-, zeisiggrün. Strich: lichte graulichweiß.

B. d. L. auf der Kohle schmilzt er in der inneren Flamme unter Kochen zu einer unklaren Perle ohne wesentliche Veränderung der Farbe; in der äußeren Flamme ist er schwer schmelzbar und bekommt dunkle Farbe; mit Borax langsam zu einem farblosen Glase im Reduktionsfeuer, zu einem violblauen im Oxydationsfeuer; von Phosphorsalz wird er zerlegt; das Glas opalisirt beim Erkalten. Das Pulver wird durch Salzsäure,

unter Entwicklung von Schwefel-Wasserstoffgas zerfällt und gelatinirt. Chem. Gehalt nach C. G. Smelin:

Manganorydul	29,344
Schwefel-Mangan	14,000
Beryllerde	8,026
Kieselerde.	35,271
Eisenorydul	7,990
Thonerde (beryllerdehaltig)	1,445
Glühverlust	1,155
	<hr/> 97,231

Findet sich auf einem Granat-Lager im Gneise zu Bergmannsgrün und Rittersgrün bei Schwarzenberg, so wie in Brauneisenstein am Kalten-Kober bei Breitenbrunn in Sachsen.

XXIV. Gruppe. Antimon.

Es kommt gediegen, jedoch selten, in der Natur vor, häufiger mit Sauerstoff und Schwefel und einigen Metallen zu verschiedenen Mineralien verbunden.

Die hierher gehörigen Mineralien steigen mit ihrem specifischen Gewichte nicht über 6,7; ihre Härte steht unter 4; sie sind gefärbt. Vor dem Löthrohre sind sie flüchtig, geben auf der Kohle einen starken weißen flüchtigen Beschlag, und färben die Flamme schwach grünlich. Die meisten schmelzen schon in der Licht-Flamme. Löslich in Salzsäure.

184. Gediegen-Antimon.

Syn. Gediegen-Spiesglas. Rhomboedrisches Antimon. Antimoine natif. Native Antimony.

Kernform: Rhomboeder. $P||P = 117^{\circ} 15'$ über die Scheitelfanten; $= 62^{\circ} 45'$ über den Randfanten (Mohs), durch Spaltung erhalten.

KrySTALLINISCH-körnige Massen, verb, traubig nierenförmig, kugelig mit krümmenschaligen Ablösungen, eingesprengt.

Vollkommen spaltbar nach den P- und den Entscheidungsfächen. Härte = 3, 3,5. Wenig spröde; nicht dehnbar. Spec.

Gew. = 6,6 — 6,7. Undurchsichtig. Metallglanz. Zinnweiß, häufig gelblich oder graulich angelauten. Strich: unverändert.

B. d. L. leicht zu einer Kugel schmelzend unter Entwicklung eines dicken weißen Rauchs, der sich auf der Kohle und dann, bei langsamem Abkühlen, um die Kugel in kleinen weißen Krystallen von Antimonoryd anlegt. Es läßt sich ohne Rückstand verbrennen. Von Salpeter-Salzsäure wird es unter Brausen aufgelöst. Im reinen Zustande nur aus Antimon bestehend; häufig aber mit etwas Silber, Eisen oder Arsenik verunreinigt. — Hierher das sogenannte arsenikalische Gediegen-Antimon, welches 2 — 16 Pct. Arsenik enthält und zu Allemont vorkommt.

Findet sich auf Gängen im Gneiß und Thonschiefer: Allemont in der Dauphinée; Andreasberg am Harz; ehemals zu Sala in Schweden; Przibram in Böhmen.

185. Antimonblüthe.

Syn. Weiß-Spiesglanzerg. Antimonoryd. Prismatischer Antimon-Baryt. Antimoine oxydé. Oxide of Antimony.

Fig. 190.



Kernform: rektanguläres Ditetraeder. $P||P = 70^\circ 32'$. $M||M = 136^\circ 58'$. Vorkommende Gestalten: 1) entquerscheitelt (h Fig. 190. ohne n); 2) beßgl. und entnebenkantet (n). Fig. 190.

Krystalle, theils glatt und eben, theils gekrümmt und gestreift, meist sehr dünn- und lang tafelartig durch Vorherrschen der Flächen h , haar- und nadelförmig, zu Büscheln, Garben und Regeln verbunden; derb, von körniger Zusammensetzung, eingesprengt, angeflogen.

Sehr vollkommen spaltbar parallel den M -Flächen. Bruch: kleinschuppig ins Unebene. Härte = 2,5 — 3. Milde. Spec. Gew. = 5,5 — 5,6. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Perl-

mutter-, auch Diamantglanz. Weiß, gelblich-, graulichweiß; aschgrau. Strich: weiß.

Schmilzt schon in der Lichtflamme. B. d. L. verdampft sie und beschlägt die Kohle weiß; mit Borax unter Dampf-Entwicklung zu graulichweißem durchsichtigem Glase. Im Kolben sublimirt sie sich. In Salzsäure leicht lösbar zu einer farblosen Flüssigkeit, welche mit Wasser verdünnt einen weißen Niederschlag gibt. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Antimon... 84,2

Sauerstoff.. 15,8

100,0

Häufig mit Eisenoryd und Kieselersde verunreinigt.

Findet sich auf Gängen im älteren Gebirge mit anderen Antimonerzen und begleitet von Blei-, Silber-, Zink- und Eisenerzen: Bräunsdorf in Sachsen; Przibram in Böhmen; Malaczka in Ungarn; Wolfach in Baden; Horhausen in Nassau; Chalançes in der Dauphinée.

186. Antimonocker.

Syn. Spiesgalkanocker. Antimonichte Säure. Antimoine oxydé terreux. Antimony-Ochre.

Derbe erdige Massen, als Ueberzug, eingesprengt, angeflagen.

Bruch; uneben, erdig. Sehr weich, zerreiblich. Spec. Gew. = 3,69 — 3,8. Undurchsichtig. Matt. Schwefel-, citronen-, strohgelb ins Braune und Grüne. Strich: gelblichweiß bis gelblichgrau.

B. d. L. auf Kohle wird er für sich nicht reducirt, gibt aber einen geringen Antimonbeschlag. Mit Soda zu Antimon reducirbar; sammeln sich die Kugeln und rauchen sie fort, so kann man daran sehen ob der Antimonocker rein ist. Gibt im Kolben Wasser. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Antimon.. 76,2

Sauerstoff. 23,8

100,0

In welchem Verhältniß Wasser vorhanden, ist noch nicht bestimmt.

Auf Gängen mit anderen Antimon-Erzen und als Ueberzug derselben, namentlich von Antimonglanz: Horhausen in Nassau; Brück in Rhein-Preußen; Bräunsdorf in Sachsen; Wolfsberg am Harz; Kremnitz, Magurka und Mito in Ungarn; Frankreich; Spanien; Cornwall u. s. w.

186. Antimonglanz.

Syn. Schwefel-Antimon. Grau-Spiesglanzerg. Prismatoidischer Antimonglanz. Antimoine sulfuré. Sulphuret of Antimony.

Kernform: rhombisches Oktaeder. $P||P = 108^{\circ} 10'$ über den scharfen Scheitellanten; $= 109^{\circ} 16'$ über den stumpfen Scheitellanten; $= 110^{\circ} 58'$ über den Randkanten. Vorkommende Gestalten: 1) entrandet zur Säule; 2) desgl. und entspißrandeckt zur Säule (Fig. 191. ohne die Flächen b); 3) entrandet (m) und fünffach entspißrandeckt, vier Flächen (b) in der Richtung von P, die fünfte (o) zur Säule, Fig. 191; 4) entrandet, entspißrandeckt und vierfach entschitelt (s) in der Richtung und 3. Verschwinden der P-Flächen, Fig. 192.

Fig. 191.





Fig. 192.



Krystalle, meist lang-säulenartig, spießig und nadel förmig, mit vertikal gestreiften Seitenflächen, und häufig zugerundeten oder gebogenen Endflächen, zu Büscheln und Drusen verbunden; krystallinische Massen mit blätteriger bis strahliger Textur (blätteriger oder strahliger Antimonglanz), derb von feinkörniger bis dichter Zusammensetzung (dichter Antimonglanz).

Sehr vollkommen spaltbar parallel den Entspißrandeckungsflächen (o), undeutlich nach m. Bruch: unvollkommen muschelig bis uneben und körnig. Härte = 2. Milde. Spec. Gew. = 4,5

— 4,7. Undurchsichtig. Metallglanz. Bleigrau ins Stahlgrau, zuweilen bunt angelaufen. Strich: unverändert, aber matt.

N. d. L. auf Kohle schmilzt er leicht, wird von ihr eingesogen und überzieht dieselbe mit einer schwarzen, glasglänzenden Masse; verdampft allmählig und beschlägt die Kohle mit einem weißen Rauch. In der Glasröhre gibt er antimonigte Säure und Antimonoryd. In Salzsäure unter Entwicklung von Schwefel-Wasserstoffgas größtentheils lösbar; mit Wasser verdünnt gibt die Flüssigkeit einen weißen Niederschlag. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Antimon 72,7

Schwefel 27,3

100,0

Findet sich auf Gängen mit Barytspath, Kalkspath, Quarz, auch auf Eisenspath-Lagern. Kremnitz, Schemnitz, Magurka, Felsbánya u. a. D. in Ungarn; Bräunsdorf in Sachsen; Przibram in Böhmen; Neuborf im Anhaltischen; Wittichen und Wolfach in Baden; Goldkronach im Baireuthischen; Leogang in Salzburg; Schladming in Steyermark; Allemont in der Dauphinée; Cornwall; Spanien; Mexiko u. s. w.

Er ist dasjenige Antimonerz, welches in solcher Menge vorkommt, daß es bergmännisch gewonnen und zur Darstellung des reinen Antimon verwendet werden kann. Man gebraucht letzteres zu verschiedenen Metallcompositionen: zum Schriftgießer-Metall mit Zinn und Blei versetzt; zu sogenanntem Hartzinn, mit Zinn und Kupfer; — ferner zur Bereitung einiger gelber Farben, zur Glasur für Töpfer- und Steingut-Waaren, zum Gelbfärben der Glasflüsse, als Arzneimittel u. s. w.

188. Antimonblende.

Syn. Roth-Spießglanzerz. Prismatische Purpurblende. Antimoine oxydé sulfuré. Red Antimony.

Kernform: schiefe rhombische Säule, deren Winkelverhältnisse nicht genau gekannt sind; es sollen Entmittelseitig, Entspitz- und Entstumpfungen vorkommen.

Krystalle, spießig, nadel- oder haarförmig zu Büscheln und Sternen zusammengehäuft, strahlenförmig aus einanderlaufend

und durcheinander gewachsen, mit gestreifter Oberfläche; verb, eingesprenzt, angeflogen (strahlige Antimonblende), zuweilen dünne zunder-ähnliche Lappen oder Häutchen aus faszartig verwebten feinen Fasern bestehend (Zundererz).

Spaltbar parallel den Diagonalen der Endflächen und zwar höchst vollkommen nach der kürzeren. Bruch: nicht zu beobachten. Härte = 1 — 1,5. Milde; in dünnen Blättchen etwas biegsam. Spec. Gew. = 4,5 — 4,6. An den Ranten durchscheinend bis undurchsichtig. Diamantglanz (das Zundererz nur schimmernd). Kirschroth, zuweilen etwas ins Braune oder Graue, auch bunt angelaufen. Strich: kirsch- bis braunlichroth.

B. d. L. leicht schmelzbar und wie Antimonglanz sich verhaltend. Chem. Zusamm. nach H. Rose:

Schwefel-Antimon 69,86	{ Schwefel .. 19,02
	{ Antimon... 50,84
Antimonoryd 30,14	{ Antimon .. 25,41
	{ Sauerstoff. 4,73
100,00	100,00

Findet sich auf Gängen mit anderen Antimonerzen, mit Quarz, Kalkspath u. Bräunsdorf in Sachsen; Malaczka und Felsőbanya in Ungarn; Horhausen in Nassau; Allemont in der Dauphinée; das Zundererz zu Clausthal und Andreasberg am Harz.

XXV. Gruppe. Tellur.

Findet sich gediegen und mit einigen Metallen, als Gold, Silber, Blei u. zu verschiedenen Mineralien verbunden.

189. Gediegen-Tellur.

Syn. Gediegen-Sylvan. Tellure natif auro-ferrière. Native Tellurium.

Kernform: Rhomboeder. $P||P = 115^{\circ} 12'$ über den Scheitellanten; $= 64^{\circ} 48'$ über den Randlanten (Philipp). Es werden niedrige entrandete sechsseitige Säulen als vorkommend angeführt; dieß wäre demnach die Gestalt: entsetzt in der Richtung der Scheitellanten, entsetzt zur Säule und entsetzt.

Kryalle, selten, meist sehr klein, tafelförmig; kryallinisch-förmige Massen, eingesprenzt.

Spaltbar parallel den Kernflächen. Härte = 2, — 2,5. Etwas milde. Spec. Gew. = 6 — 6,4. Undurchsichtig. Metallglanz. Zinnweiß ins Silberweiße, öfters graulich oder gelblich angelauten. Strich: zinnweiß.

B. d. L. schmilzt es sehr leicht, verbrennt mit grünlicher Flamme und unter Entwicklung von starkem Rauch, welcher durch zufälligen Selengehalt rettigartig riecht; die Kohle wird weiß beschlagen. In Salpetersäure mit Entwicklung rother Dämpfe ohne Rückstand auflöslich; Wasser trübt die Flüssigkeit und fällt ein weißes Pulver. Concentrirte Schwefelsäure in der Kälte schön roth färbend. In reinem Zustande nur aus Tellur bestehend; enthält aber gewöhnlich etwas Eisen und Gold beigemengt.

Findet sich auf Gängen zu Facebay bei Zalachna in Siebenbürgen; angeblich auch zu Huntington in Connecticut und in Norwegen.

XXVI. Gruppe. Wismuth.

Kommt gebiegen, im oxydirten Zustande und mit verschiedenen Metallen verbunden vor.

Das specifische Gewicht der hierher gehörigen Mineralien liegt zwischen 4,3 und 10,0. Die Härte steht, mit Ausnahme der des Kiesel-Wismuths, unter 3. Meist undurchsichtig. Gefärbt. Vor dem Löthrohre schmelzbar und reducirbar, die Kohle beschlagend. In Salpeter- und Salpetersalzsäure auflöslich.

190. Gebiegen-Wismuth.

Syn. Oктаedrisches Wismuth. Bismuth natif. Native Wismuth.

Kernform: regelmäßiges Oктаeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform, diese zuweilen so verzogen, daß Formen einem spitzen Rhomboeder ähnlich entstehen; 2) entkantet; 3) beugleichen z. Verschw. der Kernflächen.

Krystalle, meist undeutlich und verzerrt, mit gebogener, rauher oder unebener Oberfläche, aufgewachsen und zu mehreren zusammengehäuft, öfter in baumförmigen und federartigen Gruppi-

rungen, gestriekt, zählig, draht- und moosförmig, in Blechen, derb, eingesprengt, angeflögen.

Vollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: uneben. Härte = 2 — 2,5. Sehr milde. Spec. Gew. = 9,6 — 9,8. Undurchsichtig. Metallglanz. Röthlich silberweiß, auf der Oberfläche gewöhnlich grau oder roth und blau angelauten. Strich: unverändert.

B. d. L. auf Kohle leicht schmelzend und sich verflüchtigend, wobei diese gelb beschlagen wird. Der Beschlag verschwindet im Reduktionsfeuer ohne die Flamme zu färben. In einer Glasröhre gibt es beinahe keinen Rauch und das Metall umgibt sich mit geschmolzenem Oxyd von dunkelbrauner Farbe, welches beim Abkühlen blaßgelb wird. Es greift Glas stark an. In Salpetersäure mit starkem Brausen und unter Entwicklung rother Dämpfe auflöslich. Die Auflösung gibt mit Wasser einen weißen Niederschlag. In reinem Zustande nur aus Wismuth bestehend, enthält aber häufig etwas Arsenik.

Findet sich auf Gängen im älteren Gebirge: Wittichen in Baden; Biber in Hessen; Johann-Georgenstadt, Annaberg, Altenberg und Schneeberg in Sachsen; Joachimsthal in Böhmen; Ebling in Kärnten; Broddbo und Bispsberg in Schweden; Modum in Norwegen; Cornwall; Bretagne; Humington in Baltimore; Huntington in Konnektikut.

Das Wismuth wird durch Saigerung gereinigt und vorzüglich, seiner leichten Schmelzbarkeit wegen, zu leichtflüssigen Metallmischungen verwendet, die von Glasern, Zingießern u. mit Vortheil gebraucht werden. Der weiße Niederschlag, welchen man durch Verdünnung mit Wasser aus einer Auflösung des Wismuths in Salpetersäure erhält, wird unter den Namen Wismuth- oder Spanischweiß zu Schminke verwendet; auch als Arzneimittel benutzt man ihn.

191. Wismuthocker.

Syn. Wismuthblüthe. Wismuthoxyd. Wismuth oxydé. Oxide of Wismuth.

Derbe, erdige Massen, häufig als Ueberzug, angeflögen, eingesprengt.

Bruch: erdig ins Unebene und Muschelige. Zerreiblich. **Spec. Gew.** = 4,36. Undurchsichtig. Geringer Wachsglanz, meist matt. Stroh-, pomeranzen-, wachs-, graulichgelb. Strich: gelblichweiß.

B. d. L. auf Kohle leicht reducirbar und verhält sich wie Gediegen-Bismuth. Mit Borax in der inneren Flamme zu trübem grauem Glase. Lösbar in Salpetersäure. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Bismuth.. 89,87

Sauerstoff.. 10,13

100,00

Gewöhnlich durch Eisenoryd, Arsenik u. verunreinigt.

Kommt mit Gediegen-Bismuth vor, aus welchem er auch entstanden zu seyn scheint. Joachimsthal in Böhmen; Schneeberg und Johann-Georgenstadt in Sachsen; Cornwall; Sibirien.

192. Bismuthglanz.

Syn. Prismatischer Bismuthglanz. Schwefel-Bismuth. Bismuthsulfur. Sulphuret of Bismuth.

Kernform: gerade rhombische Säule. $P||M = 130^\circ$ und 50° (Philipp's). Dieser führt die Gestalt: entschärffet, zweifach entspißet und entstumpfet an.

Krystall, lang-säulenartig, nadelförmig, spießig, mit starker, vertikaler Streifung auf den Seitenflächen, rissig, auch gekrümmt, durcheinander-gewachsen und büschelförmig gruppirt; krystallinische Massen, verb, eingesprengt.

Spaltbar parallel den Seiten- und nach der kleinen Diagonale der P-Flächen. Bruch: unvollkommen muschelig. Härte = 2. Milde. Spec. Gew. = 6,54. Undurchsichtig. Metallglanz. Lichte bleigrau ins Stahlgrau; zinn-, gelblichweiß; zuweilen messinggelb oder bunt angelaufen. Strich: unverändert.

B. d. L. an Kohle schmilzt er leicht mit Kochen und Spritzen, gibt eine Bismuthkugel und beschlägt die Kohle. In der Glasröhre gibt er schweflichte Säure und ein weißes Sublimat, zum Theil auch etwas Schwefel, kommt beim Glühen in starkes Kochen und setzt braunes Bismuthoryd rund um die Kugel an.

Blum, Oryktognosie.

Leicht auflöslich in Salpetersäure mit Ausscheidung von Schwefel. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Wismuth 84,6

Schwefel. 18,4

100,0

Auf Gängen und Lagern im älteren Gebirge mit Arsenik-, Kupfer-, Eisenkies, Bleiglanz: Mann-Georgenstadt, Altenberg, Schwarzenberg und Schneeberg in Sachsen; Joachimsthal in Böhmen; Wiber in Hessen; Rezbanya in Ungarn; Riddarhyttan und Bispsberg in Schweden; Redruth in Cornwall; Carroo in Cumberland; Veresofsk in Sibirien.

193. Kiesel-Wismuth.

Syn. Wismuthblende.

Kernform: Tetraeder. Vorkommende Gestalten: 1) zweifach entkantet z. Versch. der Kernflächen; 2) dreifach entkantet in der Richtung der Flächen und zweifach entkantet; 3) noch mehrere verwickelte Gestalten und Zwillinge.

Krystalle, meist sehr klein, aber deutlich, zuweilen mit zugrundeten Kanten, zusammengelagert zu kugelförmigen und tropfsteinartigen Gestalten, manchmal mit dünnstängeliger feilförmiger Zusammensetzung, einz. oder aufgewachsen.

Spaltbar parallel den dreifachen Entdeckungs-Flächen, aber undeutlich. Bruch: muschelig ins Unebene. Härte = 5. Spec. Gew. = 5,96. Halbdurchsichtig bis undurchsichtig. Die Bruchflächen Diamantglanz, zuweilen glas- oder fettartig. Relfen- und röthlichbraun ins Schwärzliche; wachsgelb. Strich: gelblichgrau.

B. d. L. auf Kohle schmelz. und reducirbar, und dieselbe mit einem grünen Beschlag belegend. Mit Borax ein gelblichgrünes Glas gebend. In Hydrochlorsäure mit Hinterlassung eines Kieselersde-Rückstandes auflösbar. Nach Hünefeld eine Verbindung von kohlen-, arsenik- und kiesel-saurem Wismuth-Oxyd mit arsenik-saurem Eisen- und Kobaltoxyd; nach Kersten aber nur ein Wismuth-Silicat.

Mit Quarz, Wismuthocker und Gebiegen-Wismuth zu Schneeberg in Sachsen.

194. Tellur-Bismuth.

Syn. Tetradimit. Rhomboedrischer Bismuthglanz. Molybdänsilber. Argent molybdique. Molybdie Silver.

Kernform: Rhomboeder. $P||P = 66^{\circ} 40'$ über die Scheitellanten; $= 113^{\circ} 20'$ über den Randkanten. Vorkommende Gestalten: 1) entschelt; 2) besch. und entrandet in der Richtung der Scheitellanten, zuweilen ~~z. B.~~ derselben (Haidinger).

Kryalle, tafelartig; krystallinische Massen mit blätteriger Textur, auch verb. von körniger Zusammensetzung.

Spaltbar parallel den Entscheltungs-Flächen. Härte = 2. Etwas milde, in dünnen Blättchen wenig elastisch-biegsam. Spec. Gew. = 7,5. Undurchsichtig. Metallglanz. Silber- bis zinnweiß; ins Stahlgrau. Strich: schwarz.

B. d. L. auf der Kohle schmilzt es zu einer metallischen Kugel, färbt die Flamme blau, riecht stark nach Selen und Schwefel und beschlägt die Kohle nächst dem Korne gelb, von diesem aber entfernt weiß. In der Glasrohre schmilzt es leicht, riecht nach Selen, gibt einen reichlichen weißen Rauch, der sich als weißes Sublimat an das Glas legt, und zu klaren durchsichtigen Tropfen geschmolzen werden kann. Im Glase bleibt eine Bismuthkugel, die nicht mehr raucht, ~~ist~~ aber mit einem geschmolzenen braunen Dryd umgibt bei fortgesetztem Blasen. In Salpetersäure leicht auflöslich; mit Rücklassung gelblicher Schwefel-Flocken. Chem. Gehalt einer Varietät von Schoubkau nach Behrle:

Bismuth 59,84

Tellur ... 35,24

Schwefel. 4,92

100,00

Neßt einer unbestimmbaren Menge von Selen.

Findet sich mit Cerit zu Riddarhyttan in Westmanland; mit Kupferkies, Molybdänglanz und Glimmer zu Tellemarken in Norwegen; mit Braunsparth und Eisensparth in aufgelöstem Porphyr zu Deutsch-Pilsen in Ungarn; durch Regen ausgewaschen aus einer Lettenkluft in Trachyt-Konglomerat zu Schoubkau bei Schernowitz unfern Schemnitz in Ungarn; mit Gediegen-Gold in Hornstein eingesprengt zu Pojana. Siebenbürgen.

XXVII. Gruppe. Zink.

Das Zink erscheint nicht rein in der Natur, sondern vorzüglich in Verbindung mit Sauerstoff und Schwefel; als Oxyd aber mit Kohlensäure, Kiesel- und Thonerde vereinigt.

Das specifische Gewicht der Mineralien dieser Gruppe übersteigt nicht 5,66. Ihre Härte steht, außer der des Sahnits, zwischen 3 und 5,5. Gefärbt. Sie sind meist schwer oder ganz unschmelzbar; für sich oder mit kohlensaurem Natron geben sie einen gelblichweißen Beschlag. Sie werden, mit Ausnahme des Sahnits, durch Salz- oder Salpetersäure aufgelöst oder doch zersezt.

195. Zinkoryd.

Syn. Rothes Zinkoryd. Prismatisches Zinkorz. Zinc oxyde ferrière brun rougeâtre. Red oxid of Zinc.

Kernform: regelmäßige sechsseitige Säule; durch Spaltung erhalten (Phillips).

KrySTALLINISCHE Massen mit blätteriger Textur, verb. von körniger Zusammensetzung, eingesprengt, lose Körner.

Spaltbar nach den Seiten der Kernform. Bruch: muschelig. Härte = 3,5. Spröde. Spec. Gew. = 5,4 — 5,5. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Diamantglanz, außen häufig matt. Morgenroth ins Blut- und Ziegelrothe. Strich: pomeranzengelb.

B. d. L. bei schnellem Erhitzen verknisternd, unschmelzbar, gibt aber im Reduktionsfeuer einen Zinkbeschlag auf der Kohle; mit Borax leicht zu klarem Glase fließend. In Salzsäure auflöslich. Die Auflösung gibt mit Ammoniak einen weißen Niederschlag. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Zink..... 80,1

Sauerstoff.. 19,9

100,0

Meist mit Manganoryd, bis zu 12 Pct. und etwas Eisenoxyd verunreinigt.

Findet sich auf Lagern in Grauwacke, begleitet von Franklinit, Kalkspath, Quarz, auf mehreren Eisengruben von Sussier und New-Yersey in Nord-Amerika.

196. Blende.

Syn. Zinkblende. Dodekaedrische Granatblende. Schwefel-Zink.
Zinc sulfure. Sulphuret of Zink.




Kernform: Rautendodekaeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entrhomboederscheitelt (d), Fig. 193., zuweilen schreiten die sekundären Flächen so weit vor, daß die Figur die Gestalt eines entkanteten Oктаeders erhält (Fig. 33. pg. 81.); 3) desgl. 3. Verschw. der Kernflächen (regelmäßiges Oктаeder); 4) polarisch entrhomboederscheitelt zum Verschw. der Kernflächen (Tetraeder, häufig treten jedoch die vier anderen Entrhomboederscheitelungs-Flächen auf, jedoch nur untergeordnet, so daß die Gestalt das Ansehen eines enteckten Tetraeders bekommt (s. Fig. 189. pg. 292.); 5) enteckt 3. Verschw. der Kernflächen (entecktes Oктаeder Fig. 32. pg. 81.); 6) polarisch dreifach (a) und einfach (r) entrhomboederscheitelt 3. Verschw. der Kernflächen, Fig. 194. (oft stoßen auch die Ecken der o-Flächen nicht zusammen, sondern werden durch eine Kante verbunden, so daß die Gestalt das Ansehen eines dreifach enteckten Tetraeders erhält); 7) polarisch vierfach und einfach entrhomboederscheitelt zum Verschw. der Kernflächen (die vorige Gestalt, nur sind die Ecken, welche die o-Flächen mit einander bilden, durch Flächen ersetzt, vierfach entecktes Tetraeder); 8) polarisch zweifach entoktaederscheitelt (e) *) und polarisch entrhomboederscheitelt (d), Fig. 195.; 9) polarisch zweifach entoktaederscheitelt und entrhomboederscheitelt (Stösaeder), Fig. 196.; 10) verschiedene verwickeltere Gestalten, so wie auch sehr häufig Zwillinge, besonders der Gestalten 1 und 3.

Fig. 193.

Fig. 194.

Fig. 195.

Fig. 196.



*) D. h. auf die Weise, daß sich statt des Oктаeder-Scheitels nur zwei Flächen anlegen, während es nach dem Ebenmaß Gesehe vier seyn müßten.

Zinkoxyd..... 28

Schwefelsäure.... 28

Wasser..... 44

100


Er scheint ein secundäres Erzeugniß und aus der Zersetzung von Blende hervorgegangen zu seyn. Findet sich am Rammelsberge bei Goslar auf dem Harz; zu Schemnitz in Ungarn; zu Fahslun in Schweden; Cornwall; zu Oyarzum in Spanien.

Der Zink-Vitriol wird nur selten gefunden, daher man denselben zur Anwendung in der Heilkunde und in der Kattun-Druckerei künstlich darstellen muß.

198. Zinkspath.

Syn. Galmei z. Th. kohlensaures Zinkoxyd. Rhomboedrischer Zinkarzt. Zinc carbonat. Carbonate of Zinc. Calamine.

Fig. 197.



Kernform: Rhomboeder. $P||P = 107^{\circ} 40'$ über den Scheitellanten; $= 72^{\circ} 20'$ über den Randkanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseittelt; 3) dßgl. und entrandet in der Richtung der Scheitellanten zum Verschw. der Randkanten (ähnlich Fig. 73. pg. 133.); 4) entrandet zur Säule (c), Fig. 197.

Krystalle, klein, häufig rauh, die P-Flächen oft zugerundet, einzeln aufgewachsen, meist aber zu Drusen verbunden und mannigfach gruppirt; traubige, nierenförmige und tropfstelnartige Gestalten von faseriger Zusammensetzung; derbe Massen von körniger bis dichter Zusammensetzung; in Umhüllungs-Pseudomorphosen nach Kalk- und Flußspath-Formen; erdig.

Spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: uneben. Härte = 5. Spröbde. Spec. Gew. = 4,4 — 4,5. Durchscheinend bis undurchsichtig. Glasglanz, zuweilen perlmutterartig. Weiß ins Graue, Gelbliche, Grünliche und Blauliche. Strich: weiß.

B. d. L. unschmelzbar; einige Zeit geglüht wird er gelblich-weiß und gibt einen gelblichen Beschlag, der sich beim Abkühlen bleicht. Das Pulver in Salzsäure leicht und mit Brausen auflöslich. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Zinkspath	64,63
Kohlensäure ..	35,37
	<hr/> 100,00

Findet sich auf Lagern, Gängen, Nestern und Drüsenräumen im älteren und neueren Gebirge: Hofsgrund in Baden; Altenberg bei Aachen; Iserlohn und Brilon in Westphalen; Raibel und Bleiberg in Kärnthen; Tarnowitz in Schlesien; Miedziana Gora in Polen; Derbyshire; Sommersetshire; Etberien u. s. w.

Anhang:

Zinkblüthe; nierenförmige erdige Massen. Weiß. Gibt für sich im Kolben Wasser, und verhält sich sonst wie Zinkoryd. Chem. Gehalt nach Smithson:

Zinkoryd ...	74,4
Kohlensäure.	13,5
Wasser	15,1
	<hr/> 100,0

Findet sich mit Zinkspath zu Raibel und Bleiberg in Kärnthen.

Der Zinkspath wird vorzüglich zur Messing- und Bronze-Fabrikation und zu verschiedenen anderen Metall-Compositionen verwendet.

199. Sahnit.

Syn. Automolith. Oктаedrischer Korund. Spinelle zäciferé. Zäciferous Spinelle.

Kernform: regelmäßiges Oктаeder; bis jetzt hat man nur dieses, so wie Zwillinge dieser Gestalt, beobachtet.

Krysalte, oft rauh und mit Talk überzogen, einzeln eingewachsen; derb von körniger Zusammensetzung (Hisinger); Körner.

Deutlich spaltbar nach den Flächen der Kernform. Bruch: muschelig. Härte = 7,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,2 — 4,4. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Glasglanz, auf den Bruchflächen fettartig. Dunkel lauchgrün, graulich- und blaugrün. Strich: weiß.

B. d. L. unschmelzbar. In Borax und Phosphorsalz bei nahe unaufslöslich. Das feine Pulver mit Soda gemischt gibt mit Kohle bei gutem Reduktionsfeuer einen deutlichen Ring von

XXVIII. Gruppe. Zinn.

Findet sich nicht gebiegen, wenigstens haben sich die Nachrichten über dessen Vorkommen in Cornwall und zu Cherbourg in Frankreich bis jetzt nicht bestätigt; meistens erscheint es in oxydirtem Zustande, selten mit Schwefel und Kupfer verbunden; außerdem in sehr geringer Menge in manchen Mineralien.

201. Zinnerz.

Syn. Zinnstein. Pyramidales Zinnerz. Etain oxydé. Oxide of Tin.
Kernform: quadratisches Oktaeder. $P||P = 421^{\circ} 35'$ über den Scheitellanten; $= 87^{\circ} 16' 42''$ über den Randlanten (Mohs). Vorkommende Gestalten: 1) entrandet zur Säule; 2) beßgt. und entrandet; 3) entrandet (g), entrandet (h) und entscheitellantet (s), Fig. 200.; 4) entrandet (g) und vierfach entrandet (z), Fig. 201.; 5) entrandet, sechsfach entrandet; die zwei mittleren Enteckungsflächen zur Säule, so daß diese zwölfseitig wird, und entscheitellantet; 6) noch einige andere Formen; einfache Krystalle sind jedoch selten; meist erscheinen Zwillinge, wie z. B. von No. 1, Fig. 202. und von No. 3, Fig. 203.

Fig. 200.




Fig. 201.



Fig. 202.





Fig. 203.



Krystalle, verb, rundliche Stücke mit faseriger Textur.

Unvollkommen spaltbar nach den g- und l-Flächen. Bruch: unvollkommen muschelig ins Splitterige. Härte = 6 — 7. Spröde. Spec. Gew. = 6,8 — 7,0. Halbdurchsichtig bis undurchsichtig. Diamantglanz, zuweilen fettartig. Graulichweiß; gelblich, aschgrau; gelblich-, röthlich-, nelfen-, schwärzlichbraun bis pechschwarz; gelblichweiß bis weingelb und hyazinthroth; die Farben jedoch meist trübe. Strich: ungefärbt oder grau.

B. b. L. auf Kohle bei gutem und anhaltendem Reduktions-Feuer reducirbar; was leichter durch einen Zusatz von Soda bewirkt wird. In Phosphorsalz und Borax zu klarem Glase. Säuren ohne Wirkung. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Zinn..... 78,7

Sauerstoff... 21,3

100,0

Defters mit Eisen- und Manganoxyd, auch mit Kiesel-erde und Tantaloxyd verunreinigt.

Arten:

1) Späthiges Zinnerz.

Krystalle, glatt, auch auf den Seitenflächen vertikal gestreift, manchmal rauh oder uneben, säulenartig, selten nadelförmig, einzeln auf- oder eingewachsen, oder zu Drusen verbunden; verb, eingesprengt, Geschiebe und lose Körner.

Findet sich auf Gängen, Stockwerken und Lagern in älteren Gebirgs-Gesteinen, auch als Gemengtheil mancher Granite und eingesprengt in Porphyr, begleitet von Quarz, Glimmer, Topas, Flußspath u., Zinnwald, Schlaggenwald und Graupen in Böhmen, Ehrenfriedersdorf, Altenberg, Geyer u. a. D. in Sachsen; St. Agnes, Redruth und St. Austle in Cornwall; St. Leonard im Depart. der hohen Vienne; Insel Banka; Siam; Sumatra; China; Brasilien; Chili; Mexiko; außerdem auf secundärer Lagerstätte, im Seifengebirge, in den meisten der genannten Gegenden.

2) Faseriges Zinnerz.

Syn. Holzzinn: Kornisches Zinnerz. Etain oxydé concrectionné. Fibrous oxyde of Tin.

Stumpfeckige oder rundliche Stücke und Körner büschel- mit

weise zartfaseriger Zusammensetzung. Härte = 5,5 — 6. Spec. Gew. = 6,3 — 6,4. Undurchsichtig. Matt, oder schwacher Seidenglanz. Haarbraun, gelblichgrau, gelblichweiß. Die Farben oft in gebogenen Streifen miteinander wechselnd.

Findet sich in den Seifenwerken von Cornwall, in Brasilien und Mexiko.

Das Zinnerz wird zur Ausbringung des regulinischen Zinnes verwendet, das in technischer Hinsicht von großer Wichtigkeit ist. Das reine Zinn wird in sehr dünnen Platten, als Staniol, gebraucht; gewöhnlich wird es mit anderen Metallen vermischt; mit Blei dient es zur Fertigung vieler, im Hauswesen brauchbarer, Gefäße und Geräthschaften; zum Löthen anderer Metalle; mit Kupfer bereitet man Glockenmetall, Stückgut und Bronze daraus. — Das Zinn besitzt eine große Verwandtschaft zu anderen Metallen, so daß es geschmolzen, an diesen haftet, auch wenn jene fest sind. Hierauf beruht die so sehr wichtige Verzinnung des Eisens, Kupfers, Messings und Bleis. Zinnoryd, Zinnasche, welches durch Verbrennen des Zinns an der Luft erhalten wird, verwendet man zur Politur der Metalle, des Glases und der Steine. — Zinn, Quecksilber und Schwefel geben das Musivgold, das zur unächten Vergoldung und als Farbe verwendet wird, u. s. w.

XXIX. Gruppe. Blei.

Das Blei ist bis jetzt nur sehr selten gediegen gefunden worden; meistens kommt es theils im oxydirten Zustande, entweder rein oder mit anderen Stoffen verbunden, theils mit Schwefel vereinigt, als Bleiglanz und in einigen zusammengesetzten Schwefel-Metallen vor.

Das specifische Gewicht der hierher gehörigen Mineralien steht, mit Ausnahme des Selen- und des gediegen-Bleies, zwischen 4,6 und 8,0. Ihre Härte übersteigt selten die des Kalkspaths. Sie sind meistens gefärbt. Vor dem Löthrohre geben sie schon für sich oder mit Soda geschmolzen, metallisches Blei und beschlagen dabei die Kohle gelblich. In Salpetersäure vollkommen oder theilweise lösbar. Zinkstückchen schlagen aus dieser Flüssigkeit metallisches Blei nieder.

202. Gediegen-Blei.

Syn. Plomb natif. Native Lead.

Undeutlich krystallinisch, angeblich Cubo-Octaeder; draht- und haarförmige, ästige und dentrische Massen.

Bruch: hackig. Härte = 1,5. Geschmeidig, dehnbar. Spec. Gew. = 11,0 — 11,5. Undurchsichtig. Metallglanz, außen meist matt. Bleigrau, auch graulichschwarz angelauten. Strich: lebhaft metallglänzend. Etwas abfärbend.

B. d. L. leicht schmelzbar, raucht und beschlägt die Kohle mit gelbem Dryd. Lösbar in Salpetersäure. Zink fällt es wieder metallisch aus der Auflösung. Im reinen Zustande Blei.

In Blasenräumen vulkanischer Gesteine auf der Insel Madeira; verwachsen mit Bleiglanz im Bette des Flusses Anglaize in Nordamerika gefunden; zu Murcia in Carthagina in Thonstein; auf einem Gange in Kalkstein in Bleiglanz zu Alston in Cumberland.

Das im Handel vorkommende Blei wird aus verschiedenen Bleierzgen gewonnen.

203. Mennig.

Syn. Blei-Superoxyd. Plomb oxydé rouge. Native Minium.

Derbe Massen, zuweilen in pseudomorphischen Krystallen nach kohlensaurem Blei und Bleiglanz, eingesprengt, angefügt.

Bruch: eben ins Flachmuschelige, erdig. Härte = 2, oft zerreiblich. Spec. Gew. = 4,6. Undurchsichtig. Matt, seltener schwach glänzend, zwischen Fett- und Perlmutterglanz. Morgenroth, zuweilen ins Braunsliche und Graue. Strich: pomeranzengelb.

B. d. L. wird er bei gelindem Erhitzen braun, erhält aber beim Abkühlen seine vorige Farbe wieder; bei stärkerer Hitze auf Kohle leicht zum Bleiforne reducirbar. In verdünnter Salpetersäure wird das Pulver braun gefärbt und zum Theil aufgelöst. Zink fällt aus der Flüssigkeit metallisches Blei. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Blei 89,66

Sauerstoff . . . 10,34

100,00

Findet sich in einem verwitterten Gestein in dünnen Lagen und Trümmern: Schlangenbergr in Siberien; in Bleiglanz: Badenweiler in Baden; auf alten Halben: Bleialf in der Eifel; eingesprengt in Galmey: Brilon in Westphalen; ferner zu Grassington Moor und Grasshill Chappel in Yorkshire; Insel Anglesea.

Natürliche Bleiglätte (gelbes Bleioxyd), von der künstlichen in nichts verschieden, wurde neuerdings in ziemlich bedeutender Menge in den Schluchten der beiden erloschenen Vulkane Popocatepetl und Tzaccituatl, südöstlich von Mexiko, aufgefunden.

204. Cotunnit.

Syn. Chlorblei.

Krystalle so klein, daß sich deren Winkel nicht genau bestimmen lassen; Monticelli und Covelli führen rhombische Säulen, anscheinend mit Winkeln von 120° und 60° , sechsseitige und rektanguläre Säulen; meist nadel- oder haarförmig, flockig; krystallinisch-blätterige und körnige Massen, knollig, mehlig.

Leicht spaltbar. Das Messer ritzt ihn stark. Spec. Gew. = 5,238. Durchsichtig. Starker Diamantglanz, zuweilen seiden- oder perlmutterartig. Farblos; weiß.

In der Licht-Flamme zu metallischem Blei reducierbar. B. d. L. auf Kohle schmilzt er leicht, färbt die Flamme rauchblau und beschlägt die Kohle. In Wasser auflöslich. Zerfällt sich nicht an der Luft. Chem. Zusams. nach v. Kobell:

Blei.. 74,52

Chlor. 25,48

100,00 .

Findet sich am Krater des Vesuv.

205. Bleierz von Mendip.

Syn. Basisches Chlorblei. Peritomer Blei-Baryt. Lead-spar from Mendip.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M = 102^{\circ} 27'$ und $77^{\circ} 33'$. Die Gestalt: entstumpft zur Schärfung über P, wird als vorkommend angeführt.

Krystalle und krystallinische Massen.

Sehr vollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: muschelrig ins Uebene. Härte = 3. Wenig spröde. Spec. Gew. = 7,0 — 7,1. Durchscheinend. Diamantglanz, auf den Spaltungsflächen perlmutterartig. Gelblichweiß ins Strohgelbe, auch blaß rosenroth.

B. d. L. auf Kohle wird es leicht unter Ausstoßen salzsaurer Dämpfe zu Blei reducirt. In Salpetersäure leicht auflöslich. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Bleiorpd. 61,5

Ehlorblei. 38,5

100,0

Enthält auch etwas Kiesel-erde, Kohlen-säure und Wasser.

Kommt zu Churhill in den Mendiphügeln in Sommerfetshire mit Kalkspath, Mangan und Bleierzen vor.

206. Bleiglanz.

Syn. Schwefelblei. Hexaedrischer Bleiglanz. Plomb sulfuré. Sulphuret of Lead. Galena.

Kernform: Würfel. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) enteckt; 3) beßgl. z. Versch. der Kernflächen (regelmäßiges Oktaeder); 4) enteckt (c) und entkantet (o), Fig. 204.; 5) beßgl. z. Versch. der Kernflächen (entkantetes Oktaeder); 6) dreifach enteckt in der Richtung der Flächen; 7) vierfach enteckt (c und l), drei Flächen in der Richtung der Kernflächen (l), (Fig. 205. ohne o); 8) beßgl. und entkantet (o), Fig. 205.; 9) noch verschiedene andere Formen und Zwillinge.

Fig. 204.





Fig. 205.



Krystalle, häufig groß, Oberfläche glatt oder gestreift, zuweilen geflossen oder zerfressen, selten ein- oder einzeln aufgewachsen, Blum, Drytognose.

gewöhnlich zu Drüsen verbunden; krystallinische Massen, gestrikt röhrenförmig traubig, zerfressen, angeflogen, spiegelig, derb von großkörniger bis dichter Zusammensetzung, zuweilen auch krummschalig, Ausfüllungs- und Umbildungs-Pseudomorphosen nach phosphorsaurem Blei.

Sehr vollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: muscheliger, selten beobachtbar. Härte = 2,5. Milde. Spec. Gew. = 7,4 — 7,6. Undurchsichtig. Metallglanz. Bleigrau, röthlichbleigrau; zuweilen bunt oder dunkel angelaufen. Strich: graulichschwarz.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er zu einem Bleikorne, jedoch nicht eher, als bis der Schwefel fort ist. Wird das Korn auf Knochenasche abgetrieben, so kann man sehen, ob die Probe Silber enthält. In der Röhre gibt er Schwefel und weißes Sublimat von schwefelsaurem Bleioxyd. Das Pulver wird in verdünnter Salpetersäure aufgelöst, unter Entwicklung von Hydrothionsäure und mit Hinterlassung von schwefelsaurem Bleioxyd und Schwefel. Zink fällt aus der Auflösung metallisches Blei. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Blei..... 86,7

Schwefel... 13,3

100,0

Häufig enthält er Silber, zuweilen auch Antimon, Gold, Eisen oder Arsenik.

Allgemein verbreitet, findet sich an Lagerstätten und Gängen in älterem und neuerem Gebirge: Wolfach in Baden; Freiberg, Johann-Georgenstadt und Annaberg in Sachsen; Příbram in Böhmen; Clausthal, Zellerfeld, Lauterthal und Goslar am Harz; Pfaffenberg bei Neuborf im Unhaltischen; Dillenburg in Nassau; Sterzing und Klausen in Tyrol; Bleiberg und Windischkappel in Kärnten; Tarnowitz in Schlesien; Schemnitz, Kapnik und Felsbánya in Ungarn; Leadhills, Wanlockhead und Strontian in Schottland; Derbyshire; Northumberland; Sala in Schweden; Rongsberg in Norwegen; Piemont; Sardinien; Spanien u. s. w.

Der Bleischweif scheint ein mit Schwefel-Antimon innig gemengter Bleiglanz, er ist dicht und zeigt keine Spur von Blätter-Gefüge. Bruch: eben bis flachmuskelig. Spec. Gew. = 7,2. Matt oder schimmernd. Lichte bleigrau. — Kommt mit Bleiglanz vor: Clausthal; Wolfach; Rauschenberg in Baiern; Freiberg; Sala; Leadhills; Derbyshire u. s. w.

Der Bleimulm ist ein zeretzter Bleiglanz; und findet sich vorzüglich zu Freiberg.


Der Bleiglanz ist dasjenige Bleierz, aus welchem das reine Metall am häufigsten gewonnen wird. Diefes verwendet man zu den verschiedensten Zwecken: in Platten zum Dachdecken; ferner zu Regenrinnen, zu Röhren für Wasserleitungen; zu Wasserbehältern, zu Siedpfannen in Vitriolhütten, zum Gießen der Kugeln und des Schrots zur Darstellung des Bleiweißes, welches als Farbe in der Malerei benutzt wird: Der Bleizucker, reines Bleiweiß in Essig aufgelöst, wird in den Färbereien und Rattun-Druckereien benutzt. Das Blei gebraucht man ferner zur Darstellung einiger Metall-Compositionen, der Bleiglätte, des Mennigs u. s. w.

207. Blei-Vitriol.

Syn. Vitriol-Bleierz. Schwefelsaures Bleioryd. Prismatischer Bleibaryt. Bleisulphat. Plomb sulfaté. Sulphate of Lead.

Kernform: rektanguläres Oktaeder. $P||P=101^{\circ} 32'$; $M||M=76^{\circ} 12'$; $P||M=119^{\circ} 51'$. Vorkommende Gestalten:

Fig. 206.



1) Kernform (meist in der Richtung des Breitenrandes in die Länge gezogen); 2) entbreitenrandet (n), Fig. 206.; 3) desgleichen und zweifach entseiteneckt; 4) entbreitenrandet und dreifach entseiteneckt; 5) entrandet und dreifach entseiteneckt; 6) desgl. und entscheidet u. s. w.

Krystalle, säulenförmig durch Vorherrschen von M oder tafelförmig durch Vorherrschen von n, glatt, zuweilen auch gestreift oder rauh, einzeln aufgewachsen, häufiger zu Drusen verbunden; krystallinische Massen, zerfressen eingesprengt.

Spaltbar parallel den Kernflächen, am deutlichsten mit P. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 3. Spröde. Spec. Gew. = 6,22 — 6,4. Durchsichtig bis durchscheinend. Diamant- bis Fettglanz. Wasserhell; weiß; gelblich-, graulich-, grünlichweiß; gelblich-, rauh-, aschgrau; zuweilen durch Kupferoryd grün oder blau gefärbt; die Oberfläche häufig gelblichbraun überzogen. Strich: graulichweiß.

B. d. L. decrepitiert er, schmilzt auf Kohle in der äußeren

Flamme zu einer klaren Perle, die beim Gesteßen milchweiß wird und sich in der inneren Flamme unter Brausen zu einem Bleikorn reducirt. Das feine Pulver ist nur in geringer Menge in Salpetersäure lösbar. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Bleioryd 73,7

Schwefelsäure . . 26,3

100,0

Findet sich auf Gängen im älteren Gebirge, begleitet von Kupferkies, Braun-Eisenstein, Bleiglanz u. s. w.: Badenweiler und Schapbach in Baden, Mäsen, Burbach und Litzfeld auf dem Westerwald; Zellerfeld und Clausthal am Harz; Pary's Gruben auf Anglesea; Wanlockhead und Leadhills in Schottland; St. Ives und Pensance in Cornwall; Spanien; Sibirien u. s. w.

Wird mit anderen Bleierzten auf Blei benutzt.

Anhang:

Kupfer-Blei-Bitriol.

Syn. Diplogener Blei-Baryt. Cupreous Sulphate of Lead.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M||M=119^{\circ}$ (Brooke). Es wurde Entseitung mit vierfacher Entspitzung beobachtet.

Krystalle. Spaltbar parallel den Seitenflächen. Härte = 3. Spec. Gew. = 5,43. Schwach durchscheinend. Diamantglanz. Dunkel lasurblau. Strich: blaßblau. Nach Brooke's Analyse besteht derselbe aus 75,4 schwefelsaures Bleioryd, 18,0 Kupferoryd und 4,7 Wasser. — Findet sich in Schottland (Wanlockhead und Leadhills) und Spanien (Linares).

208. Selenblei.

Syn. Kobalt-Bleierz. Cobaltic Galena.

Es finden sich kleine moosartig gruppirte Krystalle und krystallinische Massen; derb, eingesprengt. Bruch: muschelig ins Unebene. Härte = 3. Milde. Spec. Gew. = 8,2 — 8,8. Undurchsichtig. Metallglanz. Bleigrau ins Röthliche und Blaue. Strich: grau. Etwas abfärbend.

B. d. L. zerknisternd; auf Kohle raucht es, riecht stark nach Selen, beschlägt die Kohle mit einem rothen, gelben und weißen Anflug und färbt die Flamme blau. Schmilzt nicht, sondern rundet sich ab; und verflüchtigt sich unter beständiger Entwicklung

von Selengeruch. Von Soda wird es zu Bleiförnern reducirt. Auflösbar in Salpetersäure. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Blei.. 72,2
Selen. 27,8
100,0

Enthält häufig etwas Kobalt beigemengt, was sich durch die blaue Färbung des Borax-Glases zu erkennen gibt (Selenkobaltblei).



Findet sich auf Gängen im Grauwacke-Gebirge zu Clausthal; in Thonschiefer zu Zorge; mit Eisenstein zu Tilsrode am Harz.

209. Pyromorphit.

Syn. Phosphorsaures Blei. Grün- und Braun-Bleierz. Rhomboedrischer Bleibaryt. Plomb phosphaté. Phosphate of Lead.

Kernform: Bipyramidal-Dodekaeder. $P||P=142^{\circ} 12'$ über den Scheitellanten; $=80^{\circ} 44'$ über den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1) entschelt (o), Fig. 107.; 2) entrandet; 3) beßgl. und entschelt; 4) beßgl. z. Versch. der Kernflächen (sechseitige Säule, sehr häufig); 5) entrandet (m) und entrandet (g) zur Säule, Fig. 108.; 6) beßgl. und entschelt z. Versch. der Kernflächen, Fig. 109.; 7) verschiedene andere Formen und Zwillinge.

Fig. 107. Fig. 108. Fig. 109.



Krystalle, meist säulenartig, auch nadelförmig, die m-Flächen nicht selten horizontal gestreift, oft conver, o zuweilen hohl, P häufig rauh, einzeln aufgewachsen, zu Drusen verbunden, auch durcheinander gewachsen, so wie treppen-, igarben- und pyramidenförmig gruppiert; traubige, nierenförmige und tropfsteinartige Gestalten von stängeliger Zusammensetzung; herb, eingesprengt.

Spaltbar parallel den Kernflächen, jedoch undeutlich, Spuren

nach m. Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 3,5 — 4. Spröde. Spec. Gew. = 6,9 — 7,1. Durchsichtig bis undurchsichtig. Fettglanz, zuweilen diamantartig. Gras-, pistazien-, oliven-, bl-, spargel-, zeisiggrün; schwefel-, stroh-, honig-, pomeranzengelb; röthlich; weißlich; grünlichgrau; nelfen-, haarbraun; schwärzlich.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er in der äußeren Flamme zu einem Kry stallkorne, das dunkel grünlich beim Abkühlen ist; in dem Reduktionsfeuer gibt er Bleirauch, färbt die Flamme blau, schmilzt zu einem Korne, das bei der Abkühlung kry stallisirt. Mit Soda erhält man ein Bleikorn. Der zufällige Arsenik-Gehalt gibt sich durch den Geruch zu erkennen, wenn die Probe in der inneren Flamme geschmolzen wird. Das Pulver ist in Salpetersäure leicht auflöslich. Chem. Zusammf. nach v. Kobell:

Bleiorxyd	73,91
Phosphorsäure..	15,79
Blei	7,68
Chlor	2,62
	<u>100,00</u>

Findet sich auf Gängen, meist in den oberen Teufen, in älteren und neueren Felsarten, mit Quarz, Baryt- und Flußspath, seltner auf Lagern. Johann-Georgenstadt, Freiberg, Zschopau u. a. O. im Erzgebirge; Przibram und Bleistadt in Böhmen; Hofesgrund und Wolfach in Baden; Erlsbach im Elsaß; Holzappel in Nassau; Birneberg bei Rheinbreitbach; Harz; Ungarn; Spanien; Poullaouen und Huelgoet in Bretagne; Leadhills und Wanlockhead in Schottland; Alston in Cumberland; St. Agnes in Cornwall u. s. w.

Das Blau-Bleierz ist ein inniges Gemenge aus Bleiglanz und Pyromorphit, oder es sind Pseudomorphosen des Bleiglances nach Formen des letzteren Minerals. Matt. Bleigrau ins Indigblaue und Schwarze. — Grube Wheal hope in Cornwall; Poullaouen; Grube Himmelsfürst zu Freiberg; Grube Dreifaltigkeit zu Zschopau.

Der Pyromorphit wird mit anderen Bleierzen auf Blei benutzt.

210. Arseniksaures Bleiorpb.

Syn. Arseniksaures Blei. Arsenik-Blei. Plomb arsenié. Arseniato of Lead.

Kernform: Bipyramidal-Dodekaeder. $P||P = 142^{\circ} 7'$ über den Scheitellanten; $= 80^{\circ} 58'$ (G. Rose). Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entrandet; 3) desgl. und entscheidet zum Versch. der Kernflächen (sechseckige Säule).

Kristalle, selten säulenartig, haar- und nadelförmig; einzeln oder zu mehreren aufgewachsen; kugelige, nierenförmige, knollige Gestalten mit auseinanderlaufend faseriger Textur; als Ueberzug.

Spaltbar nach den Kern- und den Entrandungsflächen, jedoch undeutlich. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 3. Spröde. Spec. Gew. = 7,1 — 7,3. Durchscheinend bis undurchsichtig. Fettglanz, zuweilen diamantartig, Zitronen-, pomeranzen-, orangengelb ins Grüne und Rothe; gelblich, graulichgrün; bräunlich; außen ocker- oder strohgelb; die Farben manchmal in ringförmigen Streifen wechselnd. Strich: lichte gelb.

B. d. L. für sich auf Kohle schmilzt es etwas schwer, und wird nachher im Augenblick mit starkem Rauch und Arsenikgeruch zu Bleikörnern reducirt. Das Pulver ist in Salpetersäure leicht auflöslich. Zink fällt metallisches Blei aus der Auflösung. Chem. Zusammf. nach v. Kobell:

Bleiorpb.	67,44
Arseniksäure. ..	23,22
Blei.....	6,97
Chlor.....	2,37
	<hr/> 100,00

Kommt auf dieselbe Weise vor wie der Pyromorphit. Grube Hausbad bei Badenweiler in Baden; Johann-Georgenstadt in Sachsen; St. Prix-sous-Beuvray im Depart. der Saône und Loire; Guennap in Cornwall; Nertschinsk in Sibirien.

Benutzung wie beim Pyromorphit.

211. Kohlensaures Bleiorpb.

Syn. Kohlensaures Blei. Weiß-Bleierz. Diprismatischer Blei-Baryt. Bleispath. Plomb carbonaté. Carbonate of Lead.




Kernform: Rectangulär-Ditetraeder. $P||P = 108^{\circ} 13'$; $M||M = 117^{\circ} 14'$ (Kupffer). Vorkommende Gestalten:

1) dreifach entquerscheitelt, zwei Flächen (*u*) in der Richtung *u*. z. Verschw. von *P*, die dritte vertikal (*l*), und zweifach entseiteneckt (*t*), Fig. 210. (zuweilen laufen die Flächen *t* und *u* in einer Spitze aus, so daß die Figur das Ansehen einer zur Spitzung entrandeten sechsseitigen Säule erhält); 2) zweifach entquerscheitelt und zweifach enteckt zum Verschw. der Kernflächen (Bipyramidal-Dodekaeder); 3) dreifach entquerscheitelt, zwei Flächen *e* in der Richtung von *M*, und zweifach entseiteneckt; 4) dreifach entquerscheitelt (*e* und *l*), zweifach entseiteneckt und entseitigt; 5) fünffach entquerscheitelt (*e*, *u*, *l*), zweifach entgipfelfantet (*s*) z. Verschw. von *P* und zweifach entseiteneckt, Fig. 211.; 6) zweifach entgipfelfantet z. Verschw. von *P*, entquerscheitelt und entseiteneckt; 7) siebenfach entquerscheitelt (sechs Flächen in der Richtung von *P*, zweifach entseiteneckt und entgipfelfantet z. Verschw. von *P*).; 8) verschiedene andere Combinationen, so wie Zwillinge und Drillinge. Letztere sind so häufig, daß einfache Krystalle zu den Seltenheiten gehören. Von den angeführten Gestalten erscheinen besonders Nro. 3, wie Fig. 212. zeigt, und Nro. 5. (jedoch ohne *e*) zwillingsartig verbunden u. s. w.

Fig. 210.

Fig. 211.

Fig. 212.



Krystalle, theils tafelförmig, theils säulen- oder pyramidenartig, auch nadel- und haarförmig, glatt, einzelne Flächen fast stets gestreift, oder rauh, häufig mit einem Ueberzug von Kupferlasur, Braun-Eisenoxyd u. s. bekleidet, einzeln auf-, meist aber in Büscheln zusammengewachsen und zu Drusen verbunden; langstängelige Aggregate: verb, zellig, zerfressen, eingesprengt.

Spaltbar parallel den *M*- und *u*-Flächen. Bruch: muschelig. Härte = 3,5. Wenig spröde. Spec. Gew. = 6,4 — 6,6. Durchsichtig bis durchscheinend. Starke doppelte Strahlenbrechung. Diamantglanz, zuweilen fettartig oder metallähnlich. Farblos,

weiß, graulich, gelblichweiß, asch-, rauchgrau, gelb bis nelfenbraun, auch (durch Kohle) graulichschwarz (Schwarz-Bleierz) selten durch Kupferoxyd grün oder blau gefärbt. Strich: weiß. Gepulvert phosphoreszirt es auf glühenden Kohlen.

B. d. L. zerknistert es stark, färbt sich dann orangegelb und roth und wird leicht zum Bleikorn reducirt, wobei die Kohle mit Bleioryd beschlagen wird. In Salpetersäure leicht und mit Brausen auflöslich; Zink fällt metallisches Blei aus der Auflösung. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Bleioryd..... 83,6

Kohlensäure.. 16,4

100,0

Kommt häufig vor, und zwar meist auf Gängen im älteren Gebirge, zuweilen auch auf Lagern in Flözkalken, fast stets in Begleitung von Bleiglanz, auch von Eisen- und Kupfererzen von Baryt, Fluß- und Kalkspath u.: Badenweiler in Baden; Siegen, Müsen und Herdorf auf dem Westerwald; Zellerfeld und Clausthal am Harz; Freiberg, Zschopau, Bleistadt, Mieß, Przibram u. a. D. im Erzgebirge; Tarnowitz in Schlessen; Bleiberg in Kärnthen; Markirchen im Elsaß; Lothringen; Bretagne; Insel Anglesea; Alston in Cumberland; St. Agnes in Cornwall; Wanlockhead und Leadhills in Schottland; Nerstschinsk in Sibirien u. s. w.

Anhang.

Bleierde.

Derb erdige, zum Theil sphäroidische Massen, mehr oder minder fest verbunden, als Ueberzug oder Anflug. Undurchsichtig. Matt. Grau, gelb, roth, braun, graulichschwarz, grünlich. Zersetztes kohlensaures Bleioryd mit Eisenoryd, Kiesel- und Thonerde innig gemengt. — Kalt in der Eifel; Zellerfeld; Tarnowitz; Freiberg; Durham; Derbyshire; Krakau und Olsucz in Polen; Nerstschinsk u. s. w.

Das kohlensaure Bleioryd wird auf Blei benutzt.

212. Blei-Hornerz.

Syn. Hornblei. Salzaures Blei. Plomb murio-carbonaté. Murio carbonate of Lead.

scheinend. Glänzend. Gelblich und röthlichbraun; die Farben zuweilen in Streifen wechselnd.

B. d. L. auf Kohle verliert es die Durchsichtigkeit, wird weiß, schwillt wie Zeolith an und schmilzt halb bei strengem Feuer, ohne daß er jedoch in Fluß gebracht werden kann. Mit Soda erhält man metallisches Blei. Im Kolben gibt es Wasser und zerspringt mit Heftigkeit. In concentrirter Salzsäure wird das Pulver mit Ausscheidung von Chlorblei gelöst. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Bleioryd.. 41,8

Thonerde.. 38,1

Wasser.... 20,1

100,0

Findet sich in den Bleigruben von Huelgöot bei Poullaouen in Bretagne.

215. Scheelsaures Bleioryd.

Syn. Scheelsaures Blei. Bleischeelat. Tungstate de plomb. Tungstate of Lead.

Kernform: quadratisches Octaeder. $P \parallel P = 99^{\circ} 43'$ über den Scheitellanten; $= 131^{\circ} 30'$ über den Rand (Levy). Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entscheidet; 3) beßgl. und entrandet; 4) entscheidet und entrandet zum Verschw. der Kernflächen; 5) dreifach entrandet und entscheidetkantet.

Krytalle, meist klein, mit glatter, häufiger mit drusiger Oberfläche, spießig, auf- und durcheinander gewachsen, knospenförmig zusammengehäuft, wie in einander verflochten, daher bauchig gekrümmt und kegels oder spindelförmig.

Spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: muschelig. Härte = 3 — 3,5. Spröde. Spec. Gew. = 8,0 — 8,1. Durchscheinend bis an den Kanten. Fettglanz. Gelblichbraun, wachsgelb weißlich ins Graue, Braune oder Grüne. Strich: graulichweiß.

B. d. L. auf Kohle schmilzt es zu einer dunkeln, metallischglänzenden, krytallinischen Kugel, und gibt Bleirauch. Mit Borax in der äußeren Flamme zu farblosem Glase, in der innern, bei heftigem Feuer, zu einer Kugel, die abgekühlt klar und dunkelroth erscheint. Mit Soda erhält man Bleikugeln. Sal-

petersäure löst das Pulver mit Hinterlassung eines citronengelben Rückstandes auf. Chem. Zusamsf. nach L. Gmelin:

Bleioryd.... 48,28

Scheelsäure.. 51,72

100,00

Findet sich mit Quarz, Glimmer und Wolfram zu Stunwalb in Böhmen.

216. Molybdänsaures Bleioryd.

Syn. Gelbleierz. Bleimolybdat. Pyramidaler Bleibaryt. Plomb molybdaté. Molybdate of Lead.

Kernform: quadratisches Oktaeder. $P||P = 99^{\circ} 40'$ über den Scheitellanten; $= 131^{\circ} 35'$ über den Rand. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entscheidet (a); 3) beßgl. und entrandet (m), Fig. 213.; 4) entscheidet und entrandet zum Verschw. der Kernflächen (quadratische Säule); 5) fünffach entscheidet, vier Flächen (b) in der Richtung von P; 6) beßgl. und entrandet m, Fig. 214.; 7) fünffach entscheidet und enteckt; 8) fünffach entscheidet (a und b) und zweifach enteckt (o) in der Richtung der Scheitellanten, Fig. 215.; 9) entscheidet, entrandet und zweifach enteckt in der Richtung des Randes z. Verschw. der Kernflächen (niedrige zwölfseitige Säule u. s. w.

Fig. 213.




Fig. 214.





Fig. 215.



Krystalle, meist klein, tafelartig durch Vorherrschen von a, seltner säulenartig oder pyramidal, Oberfläche theils glatt, theils rauh, zuweilen zugerundet, ausgehöhlt, oder zerfressen; einzeln aufgewachsen, häufiger treppenförmig und zellig gruppiert, oder zu Drusen verbunden; berbe Massen von körniger Zusammensetzung, eingesprngt.

Spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 3. Wenig spröde. Spec. Gew. = 6,6 — 6,8. Durchscheinend, häufig nur an den Ranten. Fettglanz, zuweilen

diamantartig. Wachs-, honig-, pomeranzen-, orange gelb; gelblichgrau; grünlich, braunlich; selten morgenroth. Strich: weiß.

B. d. L. stark zerknisternd, auf Kohle schmilzt es, geht zum Theil in die Kohle und gibt regulinisches Blei. Mit Borax leicht zu einem ungefärbten Glase schmelzend. Mit Soda erhält man reduziertes Blei. Das Pulver wird in concentrirter Salzsäure, mit Ausscheidung von Chlorblei, zu einer grünlichen Flüssigkeit aufgelöst. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Bleioryd 60,87

Molybdänsäure. . 39,13

100,00

Findet sich im Uebergangsklasse, die Wände kleiner Drusenräume bekleidend und Gangtrümmer bildend: Windischkappel und Bleiberg in Kärnthen; Annaberg in Oesterreich; Rezbanya in Ungarn; Mauferoez in Tyrol; auf Erzlagerstätten: Badenweiler in Baden; Northampton in Massachusetts; Mazapil in Mexiko.

Wird zum Ausbringen des Bleies verwendet.

217. Chromsaures Bleioryd.


Syn. Rothbleierz. Chromsaures Blei. Bleichromat. Hemiprismatischer Bleibaryt. Plomb chromaté. Chromate of Lead.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 93^\circ 44'$ und $86^\circ 16'$; $P \parallel M = 99^\circ 35'$ und $80^\circ 25'$. Vorkommende Gestalten: 1) entspißect (l) z. Versch. von P, Fig. 216. 2) entstumpfrandet (t) z. Versch. von P; 3) beßgl. und entspißect (l), Fig. 217.; 4) entrandet z. Spizung über P.; 5) zweifach entnebenseitig, entspißect und entstumpfrandet z. Versch. von P; 6) beßgl. und zweifach entmittelseitig u. s. w.

Fig. 216.



Fig. 217.



Krystalle, meist säulenförmig, spießig, nadelförmig, mit vertikaler Streifung auf den Seiten-Flächen, selten einzeln auf, meist durcheinander gewachsen, stängelig zusammengehäuft und zu Drusen verbunden; verb, eingesprengt, angeflögen.

Deutlich spaltbar nach den M-Flächen, unvollkommen nach den Diagonalen von P. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 2,5 — 3. Milde. Spec. Gew. = 6,0 — 6,1. Halbdurchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Diamantglanz. Hyazint-, morgen-, bräunlichroth. Strich: pomeranzengelb.

B. d. L. decrepitirt es und springt der Länge der Krystalle nach auf; schmilzt leicht, breitet sich auf der Kohle aus und reducirt sich zum Theil. Mit Borax und Phosphorsalz gibt es, in geringer Menge zugesetzt, ein von Chrom schön grün gefärbtes Glas. Mit Soda erhält man Bleikörner. In Salpetersäure ist das Pulver zu einer gelbrothen Flüssigkeit auflöslich, aus welcher Zink metallisches Blei fällt. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Bleioryd.... 68,3

Chromsäure.. 31,7

100,0

Findet sich auf Quarzgängen in Talkschiefer begleitet von Braun-Eisenstein, Eisenkies, Gold und Bauquelinit zu Veresofsk in Sibirien; in körnigem Quarz mit Bleierde, Braun-Eisenstein und Eisenkies zu Concanhas do Campo in Brasilien. — Das von Ullmann als Mennig angeführte Mineral von Eschbach im Bergischen, ist chromsaures Bleioryd.

Das chromsaure Blei wird künstlich bereitet und in der Malerei und Ziß-Druckerei angewendet.

218. Jamesonit.

Syn. Xrotomer Antimonglanz.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M = 102^{\circ} 20'$ und $77^{\circ} 40'$. Entschärffet.

Krystalle; krystallinische Massen von dünnstängeliger Zusammensetzung.

Spaltbar parallel den Kernflächen, am deutlichsten nach P.

Härte = 2,5. Milde. Spec. Gew. = 5,56 — 5,8. Undurchsichtig. Metallglanz. Stahlgrau. Strich: unverändert.

B. d. L. verhält er sich wie Zinkenit, aber es bleibt, nach dem Fortblasen des Antimons und Bleis, eine Schlacke zurück, welche mit Flüssen die Reaktion von Eisenoryd mit Spuren von Kupferoryd gibt (Berzelius). Chem. Gehalt nach H. Rose:

Blei.....	40,75
Antimon..	34,40
Schwefel..	22,15
Eisen.....	2,30
Kupfer...	0,13
	<hr/> 99,73

Kommt zu Cornwall mit Bournonit und mit Kalkspath in Ungarn vor.

219. Zinkenit.

Kernform: sechsseitige Säule. Die beobachtete Gestalt ist entsetzt zur Spizung über P.

Krystalle, säulen- und nadelförmig, stängelig zusammengruppirt, mit starker vertikaler Streifung auf den Seitenflächen, die Endflächen unterbrochen und nicht glatt.

Nicht spaltbar. Bruch: uneben. Härte = 3,5. Spec. Gew. = 5,30 — 5,35. Undurchsichtig. Metallglanz. Stahlgrau. Strich: unverändert.

B. d. L. auf Kohle stark decrepitirend und leicht schmelzend; es bilden sich kleine Metallkugeln und die Kohle wird mit gelbem und weißem Rauch beschlagen. Mit Soda erhält man Bleikugeln. Chem. Gehalt nach H. Rose:

Blei.....	31,84
Antimon..	44,39
Schwefel..	22,58
Kupfer...	0,42
	<hr/> 99,23

Findet sich mit Quarz auf den Antimongruben zu Wolfsberg bei Stollberg am Vorharze.

Hierher vielleicht manches sogenannte Federerz.

220. Tellurblei.

Syn. Blätter-Tellur. Blättererz. Naggagererz. Prismatischer Tellurglanz. Tellure natif auro-plombifère. Black Tellurium.

Kernform: gerade quadratische Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseitet; 3) entrandet; 4) entseet und entrandet. γ . Verschw. der Seitenflächen u. s. w.

Kristalle, selten deutlich, dünn tafelförmig, in Blättern, glatt, zuweilen etwas gestreift, ein- und durcheinander gewachsen, zellig und zu Gruppen verbunden; krystallinische Massen in schaliger körniger Zusammensetzung, eingesprengt.

Spaltbar parallel den P-Flächen, sehr vollkommen. Bruch: nicht beobachtbar. Härte = 1, — 1,5. Milde; in dünnen Blättern biegsam. Spec. Gew. = 7,0 — 7,1. Undurchsichtig. Metallglanz. Schwärzlich bleigrau. Strich: unverändert.

B. d. L. auf Kohle schmilzt es leicht, färbt die Flamme etwas bläulich, raucht und gibt einen gelben Beschlag. Nach starkem Blasen bleibt ein geschmeidiges Goldkörnchen zurück. In der Glasröhre raucht es; riecht nach schwefelichter Säure und gibt ein weißes Sublimat, das dicht über der Probe grau ist. Das graue Sublimat wird beim Erhitzen weißlich, schmilzt aber nicht und ist tellurisches Bleioryd; das weiße schmilzt wie Tellurorhyd. In Königswasser wird es leicht mit Ausscheidung von krystallinischem Chlorblei aufgelöst. Chem. Zusammf. nach v. Kobell: (a) Analyse von Klaproth (b):

a		b	
Blei...	61,61		54,0
Tellur..	38,39		32,2
	100,00	Gold...	9,0
		Silber..	0,5
		Kupfer..	1,3
		Schwefel	3,0
			100,0

Gold, Silber, Kupfer und Schwefel sind zufällig.

Findet sich auf Gängen zu Naggag und Offenbanya in Siebenbürgen.

XXX. Gruppe. Eisen.

Es ist dasjenige schwere Metall, welches am häufigsten in der Natur vorkommt, jedoch selten gebiegen, meistens oxydirt oder geschwefelt, und in solchem Zustande, findet man es entweder rein, oder mit vielen anderen Stoffen zu den verschiedensten Mineralien verbunden.

Das specifische Gewicht der Mineralien dieser Gruppe übersteigt nicht 8,0, ihre Härte nicht die des Quarzes; sie sind meist undurchsichtig und gefärbt. Sie wirken entweder unmittelbar auf die Magnethadel, oder nachdem sie vor dem Löthrohre in der inneren Flamme geglüht, oder geschmolzen wurden. Mit Borax geben sie im Oxydationsfeuer ein dunkelrothes Glas, das beim Abkühlen heller, gelblich oder ganz farblos, im Reduktionsfeuer ein Bouteillen-grünes, das beim Abkühlen heller wird. In Salzsäure sind die meisten vollkommen oder doch theilweise lösbar.

221. Gebiegen-Eisen.

Syn. Meteoreisen. Octaedrisches Eisen. Eisenoxydorydul. Fer natif météorique. Native Iron.

Kernform: regelmäßiges Octaeder.

Ausgebildete Krystalle kennt man bis jetzt nicht, allein einzelne Krystallflächen, so wie die Struktur, welche man am deutlichsten erkennt, wenn polirte Flächen dieses Minerals mit Salpetersäure behandelt werden, wie das von Widmanstädten zuerst zeigte, deuten auf obige Form hin; krystallinische Massen, mannigfach gebogen, gewunden, ästig, zellig, durchlöchert, häufig Olivinkörner einschließend; eingewachsen und eingesprengt in den meisten Meteorsteinen.

Bruch: hackig. Härte = 5 — 6. Dehnbar und geschmeidig. Spec. Gew. = 7,5 — 7,8 (6,4 Körner aus dem Ural; 5,95 — 6,71 aus Canaan in Konnektikut). Undurchsichtig. Metallglanz. Lichte stahlgrau; braunlich und schwärzlich angelauten. Strich: erhöht den Glanz. Stark magnetisch.

B. d. L. unschmelzbar oder nur an den Kanten sehr dünner Blättchen sich rundend. Leicht auflöslich in Salzsäure. Im reinsten Zustande: Eisen; enthält aber gewöhnlich 1 — 3,5 p. c. Nickel, auch Spuren von Kobalt, Chrom, Mangan und Schwefel.

Es findet sich theils als tellurisches, theils als Meteor-Eisen. — 1826 wurde durch Barral im Canaan-Gebirge, bei South-Meetinghuse in Konnektikut, eine zwei Zoll mächtige Lage von tellurischem Eisen im Glimmerschiefer entdeckt; es enthält Quarz eingesprengt, hat krystallinische Textur, und sieht fast wie Graphit aus. In der Grafschaft Guildsford in Nord-Amerika soll Gediegen-Eisen in deutlichen Octaedern vorkommen. Hierher gehören auch wohl die Eisenkörner, welche mit Platin und Gold am Ural gefunden werden. Als Fundorte tellurischen Eisens werden noch genannt: Groß-Ramsdorf in Thüringen; Platten in Böhmen; Grenoble in Frankreich; Miedziana-Gora in Gallizien u. s. w. Das Niederfallen von Meteorereisen aus der Atmosphäre ist weit seltner, als das von Meteorsteinen. Zu den merkwürdigsten Meteorereisen-Massen gehören: die von Pallas bei Krasnojarsk am Jenisei aufgefundenen, 1680 Pfund schwer; jene von Olumba in Peru, 300 Centner an Gewicht; mehrere bei Villa nueva de Guaruquilla in Mexiko von 20 — 30 Centner; die im Distrikte Ehofo-Gualamba in Brasilien 300 Centner; jene am Flüsschen Bendego in Brasilien 14,000 Pfund schwer; die am Red-River 3000 Pfund schwer; angeblich eine bei Magdeburg 170 Centner an Gewicht; eine bei Bitburg 3,400 Pfund; außerdem sind kleinere Massen in der Atakama-Wüste (3 Ctr.), zu Brahın in Polen; zu Lenarto in Ungarn (194 Pfd.); am Vorgebirge der guten Hoffnung (171 Pfund) u. a. D. gefunden worden.

Anhang.

Meteorstein (Aerolith. Meteoric stone.) Rundliche Massen; bald mehr gleichartig und dicht, bald ein körniges Gemenge, in welchem man Gediegen-Eisen, Olivin, Labrador, Augit, Leberfles etc. erkannt hat. Spec. Gew. = 3,43 — 3,7; innen graulichweiß; aschgrau; stellenweise auch gelb gefleckt; außen mit schwarzer Rinde überzogen, die ein geflossenes Aussehen hat.

Die chemischen Zerlegungen ergaben eine Menge von Bestandtheilen, unter welchen Eisen, Nickel, Schwefel, Kieselerde, Talkerde, Manganoryd die ständigssten zu seyn scheinen. — Die Meteorsteine fallen mit einem Feuer-Meteor, unter heftigem Getöse, meist erhitzt, einzeln, in größerer oder geringerer Menge (Steinregen) aus der höheren Atmosphäre nieder.

Von allen Metallen ist das Eisen das nützlichste und wichtigste; es wird zu den mannigfachsten Zwecken gebraucht, und seine Anwendung hat in neuerer Zeit eine unglaubliche Ausdehnung erhalten; es werden die verschiedensten Maschinen, ferner Straßenbahnen, Pfeiler, Säulen, Brücken, ja ganze Gebäude aus ihm gearbeitet. — Es wird durch mannigfache Schmelzprozesse aus den verschiedenen Eisenerzen gewonnen.

222. Magneteisen.

Syn. Magnet-Eisenstein. Oktaedrisches Eisenerz. Fer oxydulé. Oxydulated Iron. Magnetic Iron-ore.

Kernform: regelmäßiges Oktaeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entkantet; 3) beßgl. zum Verschw. der Kernflächen (Rauten-Dodekaeder); 4) enteckt; beßgl. 3. Verschw. der Kernflächen (Würfel); 6) entkantet und enteckt zum Verschw. der Kernflächen (Cubo-Oktaeder); 7) vierfach enteckt in der Richtung der Flächen; 8) Zwillinge.

Krystalle, glatt, selten drusig, die Entkantungsflächen der größeren Diagonale nach mehr oder minder stark gestreift; oft mit Talk oder Chlorit überzogen, einzeln ein- oder zu mehreren durcheinander gewachsen, auch zu Drusen verbunden; krystallinisch-blätterige Massen (späthiges Magneteisen), verb. von körniger (körniges Magneteisen) bis dichter (dichtes Magneteisen) Zusammensetzung, eingesprengt, eckige oder rundliche Körner; auch erdige Massen, die einzelnen Theilchen mehr oder minder fest miteinander verbunden (erdiges Magneteisen).

Spaltbar parallel den Kernflächen, in sehr verschiedener Vollkommenheit. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 5,5 — 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,9 — 5,2. Undurchsichtig. Metallglanz. Eisenschwarz, zuweilen braunlich, graulich, blaulichschwarz. Strich: schwarz. Stark magnetisch, öfters polarisch.

B. d. L. unveränderlich. Von Borax und Phosphorsalz wird es aufgelöst und gibt in der äußeren Flamme ein dunkelrothes Glas, das beim Abkühlen gelb wird, in der inneren ein grünes, das beim Abkühlen bleicht. In Salzsäure auflöslich. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Eisen 71,68 oder Eisenoryd . . 69,03

Sauerstoff . . 28,32 Eisenorydul 30,97

100,00

100,00

Ist sehr allgemein verbreitet und findet sich theils als wesentlich, theils als bezeichnender und zufälliger Gemengtheil vieler Felsarten, bildet ganze Lager, stehende und liegende Stöcke. Die ausgezeichneten Krystalle finden sich meist in Chloritschiefer, Serpentin u. s. w. eingewachsen. Grainer und Pfitsch in Tyrol; Zillerthal; Traversella, St. Marcel u. a. D. in Piemont; St. Gotthard; Dannemora, Taberg, Årendal, Egersund u. v. a. D. in Scandinavien; Berggießhübel und Schwarzenberg in Sachsen u. s. w. Das erdige Magneteisen kommt auf der Grube alte Birke im Siegenischen (als Contact-Produkt des Basaltes), so wie zu Ehrenfriedersdorf und Johann-Georgenstadt in Sachsen vor.

Das Magneteisen ist ein sehr reiches Eisenerz und liefert ein vortreffliches Eisen, das vorzüglich zur Fertigung von Stabeisen und von Stahlwaaren verwendet wird.

223. Eisenoxyd.




Syn. Rhomboedrisches Eisenerz. Rotheisenerz. Fer oligiste.

Kernform: Rhomboeder. $P \parallel P = 85^{\circ} 58'$ über den Scheitellanten; $94^{\circ} 2'$ über den Randkanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseittelt (o) häufig z. Verschw. der Scheitellanten, Fig. 218.; 3) dëßgl. und entrandect; 4) entseittelt und zweifach entrandect (n), Fig. 219.; 5) dëßgl. z. Verschw. der Kernflächen (entseitteltës Bipyramidal-Dodekaeder); 6) dreifach entseittelt in der Richtung der Flächen (s); 7) dëßgl. und zweifach entect, Fig. 220.; 8) verschiedene andere Combinationen, so wie auch Zwillinge.

Fig. 218.

Fig. 219.

Fig. 220.



Krystalle, krystallinische Massen, darb mit strahliger, faseriger bis dichter Zusammensetzung, auch schuppig und erdig.

Spaltbar parallel den P- und o-Flächen, selten deutlich. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 5,5 — 6,5. Spröde.

Spec. Gew. = 4,8 — 5,3. Undurchsichtig. Metallglanz. Eisenschwarz, stahlgrau, bräunlichroth; häufig bunt angelauten. Strich: kirschroth bis röthlichbraun. Zuweilen schwach magnetisch.

B. d. L. unschmelzbar; in der innern Flamme schwarz und magnetisch werdend. Mit Borax und Phosphorsalz wie das Magnet Eisen sich verhaltend, lösbar in Salzsäure. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Eisen 69,23

Sauerstoff.. 30,77

100,00

Flüßig mit Kiesel- und Thonerde verunreinigt.

Arten:

1) Eisenglanz.

a) Späthiger Eisenglanz.

Syn. Glanzesenerz. Fer oligiste metalloide. Specular-Iron.

Krysalle, theils rhomboedrisch, theils tafelartig, durch Vorherrschcn von o; glatt, einzelne Flächen, besonders P und a, horizontal gestreift, auch uneben oder gekrümmt, selten einzeln aufgewachsen, meist zu Drusen verbunden, zuweilen rosenförmig gruppiert (Eisenrosen), derbe Massen von schaliger und körniger Zusammensetzung, eingesprengt.

Findet sich auf Gängen und Lagern, auch auf Drusenräumen oder eingemengt in verschiedenen Gebirgsarten. Insel Elba; St. Gothard; Disans in der Dauphinée; Framont in Lothringen; Altenberg in Sachsen; Salzburg; Pötsch in Tyrol; Steyermark; Kärnten; Predais in Böhmen; Zerge und Jicfeld am Harz; Gernau, Langhansbrunn in Schweden; Nord-America; Brasilien u. s. w. In neueren und älteren Zeiten: Brian; Stromboli; Aetna; Mons-Dore, Fay de la Roche, Fay de Dome in Auvergne.

b) Eisenglimmer.

Syn. Schieferter Eisenglanz. Fer oligiste micacé. Microns specularium.

Erzart. Wie oben richtig. Derbe Massen von bläulich-schwarzer oder schiefer Zusammensetzung, eingesprengt. Kleine Blättchen zwischen Fingern streich und durchscheinend.

Bildet eine eigenenthümliche Feisart. des Eisenglimmerschiefer. zu Monte Genes in Brasilien; zwischen den Glim-

mer vertreten, z. B. im Granit am Gleissingerberg im Fichtelgebirge; im Gneiß zu Alpiersbach 2c. Findet sich ferner noch außer den meisten oben beim späthigen Eisenglanze angeführten Orten, ausgezeichnet zu Siegen; Amberg in Baiern; Schwarzenberg in Sachsen; Tavistock in Devonshire; Estremadura; Hawley in Massachusetts u. s. w.

c) Strahliger Eisenglanz.

Syn. Glanzeisenstein.

Derbe Massen, nierenförmig, von schuppig-strahlig bis faseriger Zusammensetzung, entweder parallel oder büschelweise auseinander laufend.

Mit anderen Eisenerzen: Siegen; Thalitter in Hessen; Munsig in Sachsen; Tilkrode am Harz; Schönbau in Böhmen u. s. w.

2. Roth-Eisenstein.

a) Faseriger Roth-Eisenstein.

Syn. Rother Glaskopf. Blutstein. Fer oligiste rouge fibreux. Fibrous red Iron-ore.

Umhüllungs-Pseudomorphosen nach Kalkspath-Formen; traubige, nierenförmige, tropffleinartige Gestalten von faseriger bis stängeliger, auch schaliger Zusammensetzung. Stahlgrau bis bräunlichroth.

Auf Gängen, meist im älteren Gebirge: Eisenbach im Schwarzwalde; Zorge, Lauterberg, Andreasberg, Ilesfeld u. a. D. am Harz: Johann-Georgenstadt, Eibenstock, Schneeberg in Sachsen; Platten in Böhmen; Graubünden; Lothringen; Cumberland; Devonshire n. s. w.

b) Dichter Roth-Eisenstein.

Syn. Fer oligiste rouge compacte. Compact red Iron-ore.

Pseudomorphosen nach Kalk- und Flußspath-Formen; derbe Massen, eingesprengt; spiegelig. Stahlgrau ins Blutrothe.

Auf Gängen: Dillenburg in Nassau; Siegen; Freiberg, Schellerhau bei Altenberg in Sachsen; Steyermark; Lancashire u. s. w.

c) Roth-Eisenrahm.

Syn. Schuppiger Roth-Eisenstein. Fer oxydé rouge luisant. Scaly red Iron-ore.

Schuppige oder schaumige Theilchen, meist schwach mit einander verbunden; als Ueberzug. Zerreiblich; stark abfärbend. Braunlichroth ins Stahlgrau.

Findet sich mit anderen Eisenerzen vorzüglich zu Siegen; Wittichen und Schriesheim in Baden, Johann-Georgenstadt und Freiberg in Sachsen; Schmalkalden in Hessen; Schönaun in Böhmen; Schemnitz in Ungarn; Alverstone in Lancashire u. s. w.

d) Roth-Eisenoxyd.

Syn. Ockeriger Roth-Eisenstein. Fer oligiste rouge terreux. Red Ochre.

Als Ueberzug oder Verb. von erdiger Zusammensetzung. Zerreiblich und stark abfärbend. Bräunlichroth ins Blutrothe.

Findet sich mit anderen Roth-Eisenstein-Erzen.

Der rothe Kiesel-Eisenstein ist ein inniges Gemenge aus Roth-Eisenoxyd und Kiesel. Lehrbach und Ilesfeld am Harz. — Alle rothe Thon-Eisensteine so wie der Röthel sind innige Gemenge aus Roth-Eisenoxyd und Thon; sie sind dicht, zuweilen auch linsenförmig körnig zusammengesetzt, oder durch Einwirkung von Kohlenbränden, stängelig abgesondert. Andreasberg, Lauterberg u. a. D. am Harz; Wasseralfingen und Alen in Württemberg; England; Schottland &c. Der jaspisartige Thon-Eisenstein kommt zu Fischau in Oesterreich vor; der stängelige Thoneisenstein a. v. D. in Böhmen, zu Duttweiler &c., der Röthel zu Saalfeld in Thüringen; Amberg in Bayern; Bozen in Tyrol u. s. w.

Die verschiedenen Eisenoxyd-Erze werden zum Ausbringen des Eisens benutzt. Der Eisenglanz gibt ein vorzügliches Stabeisen; der Roth-Eisenstein gutes Roh- und Stabeisen. Man verwendet ferner den faserigen Roth-Eisenstein zum Poliren anderer Metalle und zur Bereitung einer rothen Farbe. Der Röthel dient zum Schreiben und für gröbere Zeichnungen.

224. Eisenoxyd-Hydrat.

Syn. Prismatisches Eisenerz. Braun-Eisenerz. Fer oxyde hydraté Brown Iron-ore.

Krystallsystem wahrscheinlich rhombisch und die Kernform eine rhombische Säule von $117^{\circ} 30'$. Bis jetzt sind jedoch

die Krystalle nur in feinen Nadeln und Blättchen beobachtet; schuppigfaserige, faserige, dichte und erdige Massen.

Spaltbar parallel der P-Fläche. Bruch: meist nicht wahrnehmbar, muschelig bis uneben bei dichten Varietäten. Härte = 5 — 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 3,6 — 4,2. Halbdurchsichtig bis undurchsichtig. Diamantglanz auf Krystallflächen. Schwärzlichbraun, braun bis ockergelb. Strich: gelblichbraun.

B. d. L. runden sich feine Splitter zu einer schwarzen magnetischen Metallkugel. Im Kolben gibt es Wasser und hinterläßt rothes Eisenoryd. Zu den Flüssen verhält es sich wie Eisenoryd. In Salzsäure leicht auflöslich. Chem. Zusammens. nach L. Gmelin:

Eisenoryd 81,3

Wasser... 18,7

100,0

Häufig mit etwas Manganoryd und Kieselersde verunreinigt.

Arten:

1. Braun-Eisenstein.

a) Rubinlimmer.

Syn. Pyrosiderit. Göthit. Fer pourpre. Crystallized Iron-ore.

Krystalle, lamellar und nadel förmig zu Drusen und aufgewachsenen Gruppen verbunden. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Röthlichbraun ins Schwarze; hyazinthroth bei durchfallendem Lichte.

Auf Eisenerz-Gängen: Eisenzeche bei Eisfeld, Rehmel und Hollerterzug auf dem Westerwald; Nadabula in Ungarn.

b) Lepidokrokit.

Syn. Schuppig-faseriger Braun-Eisenstein.

Kugelige, nierenförmige, traubige und tropfsteinartige Gestalten mit schuppig-faseriger Textur. Röthlich-, nelfenbraun; graulich.

Mit faserigem Braun-Eisenstein; Vieber in Hessen; Eisfeld; Hollerterzug; Iberg und Clausthal am Harz; Eifel; Nadabula; Niedziana-Gora in Gallizien.

c) Faseriger Braun-Eisenstein.

Syn. Brauner Glaszopf. Fer oxyde hematite brun fibreux. Fibrous brown Iron-ore.

Nadel- und haarförmige Krystalle. büschelförmig auseinander laufend (haarförmiger Braun-Eisenstein), meist aber kugelige, traubige, nierenförmige und tropfsteinartige Gestalten von faseriger Zusammensetzung; Umhüllungs-Pseudomorphosen nach Kalk- und Flußspath-Formen. Nelfenbraun ins Schwärzlichbraune.

Findet sich auf Gängen im älteren Gebirge, häufiger auf liegenden Stöcken in jüngeren Felsarten: Siegen; Bieber und Schmalkalden in Hessen; Schneeberg und Geyer im Erzgebirge; Ramsdorf und Saalfeld in Thüringen; Iberg und Clausthal am Harz; Amberg in Baiern; Eisenerz in Steyermark; Hüttenberg in Kärnthen; Nadabula und Berler in Ungarn; Niedziana-Gora in Gallizien; Redruth in Cornwall; Guipuzgoa und Balbao in Spanien u. s. w. Haarförmiger Braun-Eisenstein zu Przibram in Böhmen; Hüttenberg; Ulefos in Norwegen; Orijervi in Finland.

d) Dichter Braun-Eisenstein.

Syn. Stilpnothidit. Pecheisenerz. Fer oxydé noir vitreux. Compact brown Iron-Ore.

Umhüllungs-Pseudomorphosen nach Kalk- und Flußspath; Umbildungen nach Eisenspath-, Eisen- und Strahlkies. Verb, eingesprengt. Bruch: eben ins Unebene und Muschelige. Glänzend bis matt. Braunschwarz; gelblich, nelfenbraun.

Ist sehr verbreitet und kommt mit den angeführten Varietäten vor. Pseudomorphosen finden sich sehr ausgezeichnet zu Beresofsk in Sibirien; Minden; Geyer in Sachsen; Helgoland; Saska und Egetnek in Ungarn.

e) Braun-Eisenerz.

Syn. Ockeriger Braun-Eisenstein. Fer oxydé terreux. Ochry brown Iron-ore.

Erdbige Theile mehr oder minder fest zu dichten Massen verbunden; eingesprengt, als Ueberzug. Matt. Gelblichbraun. Abfärbend.

Begleitet die vorhergehenden Abänderungen.

Der braune Thon-Eisenstein ist ein Gemenge aus Eisenorydhydrat mit Kiesel- und Thonerde. Man findet ihn verb, kugelig, tropfsteinartig, nierenförmig; zuweilen krummschalig

abgesondert. Braun, leberbraun; rauchgrau. — Baireuth; Frankreich u. s. w. — Umbra. Verb; Bruch: muschelrig; weich; matt; leber-, kastanienbraun; Strich: glänzend; hängt stark an der feuchten Lippe. Nach Klaproth aus 48 Eisenerz, 20 Maganerz, 15 Kiesel, 5 Thon und 14 Wasser bestehend. — Findet sich auf Lagen mit Zaspis auf der Insel Cypern.

2. Gelb-Eisenstein.

Ockergelb. Die Varietäten: faseriger und dichter Gelb-Eisenstein, so wie der Gelb-Eisenerz unterscheiden sich wie beim Braun-Eisenstein.

Kommt auf die nämliche Weise wie der Braun-Eisenstein vor und begleitet denselben: Nassau; Elbingerode am Harz; Amberg in Baiern u. s. w.

Die gelben Thon-Eisensteine sind mehr oder weniger innige Gemenge von Gelb-Eisenerz und Thon, häufig auch mit Kieselerde. Man unterscheidet folgende Abänderungen:

a) Schaliger gelber Thon-Eisenstein (Eisenerz. Adler- oder Klapperstein. Fer oxyde geodique); kugelige, nierenförmige knollige Massen von gebogenschaliger Absonderung; innen häufig hohl oder mit losem Kern. Bruch: erdig. Matt. Ockergelb, gelblichbraun. — In Lehm- und Thonlagen, zuweilen mit Petrefakten: Bilin und Tepliz in Böhmen; Tarnowitz in Schlesien; Braunschweig; Goslar am Harz; Bettola und Torrita in Siena u. s. w.

b) Bohnerz (körniger gelber Thon-Eisenstein. Fer oxyde globuliforme); kugelige und sphäroidische Körner mit oder ohne concentrisch schaliger Absonderung, einzeln oder zu größeren Massen verbunden. Bruch: eben bis erdig. Schimmernd, matt. Gelblich-, röthlich-, schwärzlichbraun. — In Stöcken, Buzen und Lagern in verschiedenen Fels-Gebilden: Alsen, Bopfingen u. a. D. in Württemberg; Randern in Baden; Mardorf in Hessen; Böhmen; Lausitz; Elsaß; Marau u. s. w.

Der Rasen-Eisenstein in seinen Abänderungen als Wiesen-, Sumpf- und Morasterz ist ein ganz eigenthümliches Erzeugniß, dessen Bildung immer noch fortgeht. Er bildet zuweilen ausgebreitete, jedoch unterbrochene Lagen im Alluvium, und zeichnet sich durch seinen Gehalt an Phosphorsäure aus. —

Württemberg; Hessen; Sachsen; Schlesien; Lausitz; Mecklenburg u. s. w.

Die Braun-Eisensteine liefern ein sehr gutes Eisen, was vorzüglich zur Bereitung von Stabeisen und von Stahl geeignet ist. Auch die Thon-Eisensteine, namentlich das Bohnerz, geben gutes Eisen. Das Umbra wird als Malerfarbe angewendet.

225. Magnetkies.

Syn. Lebertkies. Rhomboedrischer und hexagonaler Eisenties. Fer sulfuré magnetique. Magnetic Iron-Pyrites.

Kernform: sechsseitige Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entrandet; 3) dergl. z. Verschw. der Seitenflächen; 4) entrandet, enteckt und entseitet; 5) zweifach entrandet, enteckt und entseitet (v. G. Rose im Meteorstein von Juveras beobachtet).

Krystalle, säulenförmig, häufiger tafelförmig, rauch oder gestreift, einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden; krystallinische Massen mit blätteriger Textur; kugelig, nierenförmig, verb von körniger Zusammensetzung; eingesprengt.

Spaltbar parallel den P-Flächen, Spuren nach M. Bruch: muschelg bis uneben. Härte = 4. Spröde. Spec. Gew. = 4,5 — 4,7. Undurchsichtig. Metallglanz. Bronze- oder Kupfergelb ins Eisenrothe; meist tombakbraun angeläufen. Magnetisch.

B. d. L. im Kolben erleidet er keine Veränderung; auf Kohle wird er in der äußeren Flamme roth, zu Eisenoxyd geröstet und riecht nach schwefelichter Säure; in der innern schmilzt er leicht zu einer schwärzlichen magnetischen Kugel. Auflöslich in Salzsäure unter Entwicklung von Schwefel-Wasserstoffgas. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Eisen 59,62

Schwefel . . 40,38

100,00

Findet sich auf Lagern und Gängen im älteren Gebirge, auch eingesprengt in Gebirgssteinen: Auerbach an der Bergstraße; Bodenmais in Bayern; Balsugana in Tyrol; Andreasberg und Treßeburg am Harz; Breitenbrunn, Freiberg und Geyer

in Sachsen; Querbach in Schlessen; Bardes, Port de Clarabide u. a. D. in den Pyrenäen; Caernarvonshire in England; Kongsberg in Norwegen; Schweden; Nord-Amerika u. s. w.

Der Magnetkies wird, wie der Eisentles, zur Bereitung von Eisenvitriol und Schwefelsäure benutzt.

226. Eisenkies.

Syn. Schwefelkies. Markasit. Hexaedrischer Eisenkies. Fer sulfuré. Iron-pyrites.

Kernform: Pentagon-Dodekaeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entgipfeltantet (e), Fig. 221.; 3) dergleichen zum Verschw. der Kernflächen (Würfel); 4) entscheidet (Fig. 222. ohne e), oft zum Verschw. der Scheitellanten (Kuboktaeder (s. Fig. 196. pg. 305.)); 5) dergl. zum Verschw. der Kernflächen. regelmäßiges Oktaeder; 6) entscheidet (d) und entgipfeltantet, Fig. 222., oft z. Verschw. der Scheitellanten (Cubooctaeder); 7) dergl. z. Verschw. der Kernflächen (Cubooctaeder); 8) dreifach entscheidet in der Richtung der Scheitellanten; 9) dreifach entscheidet in der Richtung der Flächen, oft z. Verschw. der Scheitellanten (Fig. 223. ohne d); 10) dergl. und entgipfeltantet z. Verschw. der Kernflächen; 11) entscheidetantet; 12) vierfach entscheidet, oft z. Verschw. der Scheitellanten (f und d); Fig. 223. 13) dergl. und entgipfeltantet z. Verschw. der Kernflächen (Würfel vierfach enteckt); 14) dreifach entscheidet zum Verschw. der Kernflächen (Trapezoeber); 15) Zwillinge verschiedener der angeführten Combinationen, besonders von 1, 2, 9 und 12.

Fig. 221.




Fig. 222.





Fig. 223.



Krystalle, einzelne Flächen oft unverhältnißmäßig ausgedehnt, kleinere zuweilen zugerundet, Oberfläche meist gestreift parallel den Gipfeltanten, auch glatt, einzeln ein- oder zu mehreren zu-

sammengewachsen, zu kugelförmigen und traubenförmigen Gruppen so wie zu Drusen verbunden; Umhüllungs-Pseudomorphosen von Quarz, Baryt und Kalkspath; derbe Massen von körniger bis dichter Zusammensetzung, zellig, nierenförmig, knollig, eingesprengt; als Versteinerungs-Mittel von Schalthieren und Pflanzentheilen.

Spaltbar in der Richtung der o und d-Flächen, in sehr verschiedener Vollkommenheit. Bruch: muscheliger bis uneben. Härte = 6 — 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,9 — 5,1. Undurchsichtig. Metallglanz. Speisgelb, zuweilen ins Gold- oder Messinggelbe, manchmal braun oder bunt angelaufen. Strich: grau ins Braunschwarze.

B. d. L. entwickelt er einen starken Geruch nach schweflichter Säure, und schmilzt in der innern Flamme zu einer schwarzen magnetischen Kugel. Im Kolben gibt er Schwefel unter Entwicklung von Geruch nach Schwefelwasserstoff. Das Pulver wird von Salpetersäure unter Entwicklung von Salpetergas und mit Ausscheidung von Schwefel zur gelblichrothen Flüssigkeit aufgelöst. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Eisen.... 45,76

Schwefel. . 54,24

100,00

Allgemein verbreitet; er findet sich sowohl eingewachsen, als auf Lagern und Gängen in Felsarten der verschiedensten Perioden. Fundorte ausgezeichnete Krystalle sind: Gosensbach, Littenfeld, Dillenburg, Kirchen u. a. D. auf dem Westerwalde; Dresden, Freiberg und Schneeberg in Sachsen; Tiefenlaxen in Graubünden; Monte Ghiedo im Val de Bagne; Schipfius, Campolongo u. a. D. am St. Gotthard; Pfitsch und Klausen in Tyrol; Traversella und Brozzo in Piemont; Sardinien; Elba; Schemnitz und Kremnitz in Ungarn; Arendal und Årås in Norwegen; Adelfors und Fahlun in Schweden; Veresowsk in Sibirien; England; Schottland; Brasilien u. s. w.

Der Eisenkies wird vorzüglich zur Darstellung des Schwefels, des Eisenbitriols und der Schwefelsäure verwendet; auch fertigt man mancherlei Galanterie-Waaren, Knöpfe, Dosen u. s. w. aus ihm.

227. Strahlkies.

Syn. Wasser-, Kamm- und Speerkies. Prismatischer und rhombischer Eisenkies. Fer sulfuré blanc. White Iron-ore.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M \parallel M = 106^\circ 2'$ und $73^\circ 58'$. Vorkommende Gestalten: 1) entspißect (r); 2) beßgl. zur Schärfung über P und häufig auch über den scharfen Seiten, Fig. 224.; 3) zweifach entspißect (r und l) zur Schärfung über den scharfen Seiten, Fig. 225.; 4) beßgl. und entstumpfeckt (g), zur Schärfung über den stumpfen Seiten, Fig. 226.; 5) enteck zur Schärfung über den Seiten und entrandet; 6) entrandet z. Verschw. der Kernflächen (rhombisches Octaeder); Zwillinge, Drillinge, Vier- und Fünflinge, und zwar sehr häufig, besonders von Nr. 4.

Fig. 224.





Fig. 225.



Fig. 226.



Krystalle, glatt, die P- und r-Flächen meist parallel der kleinen Diagonale gestreift, einzeln aufgewachsen, häufiger zu Gruppen und Drusen verbunden oder speerspitzen-ähnlich und hahnenkammförmig zusammengeläuft, selten haar- oder nadelförmig; Pseudomorphosen; kugelige, traubige, nierenförmige, stalaktitische, knollige, röhrenförmige Gestalten, mit drüsiger Oberfläche und von strahliger bis faseriger Zusammensetzung; verb.

Spaltbar parallel den M-Flächen. Bruch: uneben. Härte = 6 — 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,69 — 4,9. Undurchsichtig. Metallglanz. Speisgelb, graulich- oder grünlich-speisgelb.

B. d. L. verhält er sich wie Eisenkies; gibt jedoch schon in der Lichtflamme einen dichten nach Schwefel riechenden Rauch. Verwittert sehr leicht. Chem. Zusammf. ist dieselbe wie beim Eisenkies.

Findet sich meist in neueren Felsarten: Almerode in Hessen; Freiberg, Memmenhof und Johann-Georgenstadt im Erzgebirge; Joachimsthal, Liebschitz, Altsattel und Tepliz in Böhmen; An-


breasberg, Zellerfeld und Clausthal am Harz; Bretagne; Cornwall; Derbyshire u. s. w.

Man verwendet ihn zur Bereitung von Eisen-Vitriol und Schwefelsäure.

228. Eisen-Vitriol.

Syn. Grüner Eisen-Vitriol. Grüner Vitriol. Hemiprismatisches Bitriolsalz. Fer sulfate. Sulphate of Iron.

Fig. 227.



Kernform; schiefe rhombische Säule. $M||M = 82^\circ 21'$ und $97^\circ 39'$; $P||M = 99^\circ 22' 48''$ und $80^\circ 37' 12''$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entspißect; 3) beßgl. und entstumpft; 4) entspißect (t), entseitenect (o), entstumpfrandet (b) und entstumpft (n); 5) beßgl. und entstumpft (x), Fig. 227.

Kristalle, kurz, säulenartig, haarförmig, einzeln auf- oder durcheinander gewachsen, zu Drusen und Büscheln gruppiert; tropfsteinartige, nierenförmige, traubige Massen, herb, als krustenartiger Ueberzug und mehlig, erdiger Beschlag.

Spaltbar nach den Kernflächen, jedoch nur parallel, P vollkommen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 4,8 — 4,9. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Span-, berg-, apfel-, lauchgrün; an der Luft sich gelb beschlagend. Strich: grünlich-weiß. Geschmack herb zusammenziehend.

B. d. L. gibt es im Kolben viel Wasser, entwickelt beim Glühen schwefelichte Säure und wird bräunlichroth. Der Rückstand verhält sich wie Eisenoryd; in der inneren Flamme gibt er auf Kohle eine schwarze magnetische Kugel. Leicht auflöslich in Wasser. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Eisenorydul. . . 27,13

Schwefelsäure. 31,01

Wasser 41,86

100,00

Er ist ein sekundäres Erzeugniß, entsteht durch Zerstörung

von Eisenkiesen und findet sich theils auf alten Grubengebäuden, theils auf Klüften, besonders in Thon- und Kohlenschiefer und in Höhlen. Grube Gießhabel bei Bodenmais in Baiern; Rammelsberg am Harz; Häring und Sterzing in Tyrol; England; Schottland; Bilbao in Spanien. — Aufgelöst in vielen Grubenwässern.

Man verwendet ihn, wo er in größerer Menge vorkommt, wie den künstlichen Vitriol in der Pharmacie, in der Färberei, zur Bereitung von Tinte, von Berlinerblau u. s. w.

229. Grün-Eisenstein.

Kugelige, traubige, nierenförmige Gestalten mit strahliger faseriger Textur (faseriger Grün-Eisenstein), verb, gt, erdig als Ueberzug.

h: wiehen. Härte = 3. Spröde. Spec. Gew. = 3,4

Undurchsichtig bis an den Ranten schwach durchscheinend. wenig glänzend bis schimmernd, Seidenglanz. Schwärzlichgrün ins Schwarze und Leberbraune; lauch-, oliven-, zeisiggrün ins Gelbe. Strich: gelblichgrau.

B. d. L. im Kolben gibt es Wasser; schmilzt leicht zu einer porösen, schlackigen, schwarzen Kugel. Unlöslich in Salzsäure. Chem. Gehalt nach Karsten:

Eisenoxyd. 63,450

Phosphorsäure. 27,717

Wasser..... 8,560

99,727

Mit Braun-Eisenstein: Hollerter Zug im Saynischen; Grube Kalteborn bei Siegen; Schneeberg und Johann-Georgenstadt in Sachsen; Wiber in Hessen; Elbingerode am Harz; Badin in Ungarn; Dalarne.

230. Eisenblau.

Syn. Phosphorsaures Eisen. Prismatischer Eisenglimmer. Ferrophosphate. Phosphate of Iron.

Blum, Dryftognose.

Fig. 228.



Kernform: schiefe rektanguläre Säule. $P \parallel M = 125^\circ 18'$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entnebenrandet; 3) beßgl. zur Schär-
fung über P; 4) entschärfrandet; 5) entnebenrandet
(r) und entseitet (l), Fig. 228.; 6) beßgl. zu Kern-
schwinden von P und M (ähnlich Fig. 50. pg. 109.);
7) entseitet z. Versch. von M und entschärfrandet; 8) entseitet,
entnebenrandet, entschärfrandet und entspißect.

Krystalle; mehligte Massen.

Spaltbar parallel den Kernflächen, nach M höchst vollkommen.
Härte = 1,5 — 2. Milde; in dünnen Blättchen biegsam. Spec.
Gew. = 2,6 — 2,7. Durchsichtig bis an den Ranten durchschei-
nend. Glas-, auch Perlmutterglanz. Wasserhell, blau. Strich:
weiß bis lichte smalteblau.

B. d. L. auf Kohle schmilzt es auf, und
schmilzt leicht zu einem stahlgrauen metallisch-glänzenden Körne;
mit Soda gibt es im Reduktionsfeuer magnetische Eisenkörner.
Im Kolben Wasser gebend. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin

Eisenorydul ...	45,4
Phosphorsäure. 27,4	
Wasser.....	27,5
	100,0

Arten:

1. Späth:

Syn. Blätterige Eisenblau.

Krystalle, meist säulenartig, an
gestreiften Seitenflächen, oft in
sen, seltner zu Drüsen und
gelblich-, graulichweiß; indigbla-
Farben nach bestimmten R-
smalteblau; blaulichgrau.

Auf Kupfererz-Gruben mit Eisenkies, in
denmais in Baiern; St. Agnes in
zu Bördspataf in Siebenbürgen; Braun-Eisenstein zu Am-
berg in Baiern u. f. w.

2. Erdiges Eisenblau.

Syn. Blau-Eisenerde. Fer phosphaté terreux. Earthy Phosphate of Iron.

Staubartige locker verbundene Theile; herb, eingesprengt, als Ueberzug und Anflug. Matt. Smalte- bis indigblau. Abfärbend.

Ein sehr jugendliches Erzeugniß, das sich an vielen Orten in Thon, Lehm, Kiesen-Eisenstein und Torf findet. Fluorn unfern Gels in Württemberg; Niedereßbach bei Frankfurt a. M.; Eckartsberg in Thüringen; Peitz in der Niederlausitz; Ligitz in Steyermark; Spandau in Preußen; Schonen; Norwegen; Hula Kirchspiel in Schweden; Frankreich u. s. w.

Das erdige Eisenblau wird in der Wasser- und Oelmalerei angewendet.

Nach H. v. S. 100

251. Karphosiderit.

Derbe, nierenförmige, zerborstene, rindenartige Massen.

Bruch: uneben. Härte = 4,5. Spec. Gew. = 2,50. Wenig glänzend. Schimmernd. Strohgelb. Strich: unverändert.

Eisenoxyd; auf Kohle, bei starker Erhitzung in magnetischen Kugel schmelzbar. Im Kolbe. Zusamm. unbekannt.

Wahrscheinlich phosphorsaures Eisenoxyd. Glimmerschiefer an der

Küste

192 111 111 111 111 111

192 111 111 111 111 111

192 111 111 111 111 111

26' und 57' 34". Welche beobachtet wurde, ist: entstumpft über P.

Kristalle, m. Nadeln, glatt oder gestreift, einzeln ein-, häufiger zusammengewachsen; kleine Massen von stängeliger, körniger bis dichter Zusammensetzung, eingesprengt.

Spaltbar parallel F vollkommen, nach M und den Entspitzungs-Flächen undeutlich. Bruch: uneben. Härte = 5 — 5,5.

Sprrbde. Spec. Gew. = 7,2 — 7,3. Undurchsichtig. Metallglanz. Silberweiß bis stahlgrau.

B. d. L. auf Kohle entwickelt er einen starken Arsenikgeruch, und wird zur schwarzen magnetischen Masse. Im Kolben sublimiert sich graues, metallisch-glänzendes krystallinisches Arsenik.

Chem. Gehalt nach E. Hoffmann:

Eisen ... 28,06

Arsenik.. 65,99

Schwefel. 1,94


Bergart . 2,17

98,16

Auf Eisenspath-Lagern zu Hüttenberg in Kärnthen; Schladming in Steyermark; auf dem Serpentin-Lager zu Reichenstein in Schlesien.

Das Reichensteiner Arsenik Eisen wird zur Bereitung der arsenichten Säure verwendet.

Fig. 229.



233. Skorodit.

Kernform: rhombisches Oktaeder. $P||P = 115^{\circ} 6'$ über den stumpfen Scheitellanten; $= 102^{\circ} 1'$ über den scharfen Scheitellanten; $111^{\circ} 34'$ über den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1) enteckt z. Versch. des Randes; 2) entspizect und zweifach entstumpfect in der Richtung und z. Versch. des Randes; 3) dreifach entstumpfect (r und d letztere Flächen in

der Richtung des Randes) und zweifach entspizect (m) in der Richtung der Scheitellanten und entseitelt (k), Fig. 229.; 4) dreifach entstumpfect (r und d) und dreifach entspizect (zwei Flächen (m) in der Richtung der Scheitellanten) zum Versch. des Randes.

Krystalle, klein, pyramidal, auch säulenartig durch Vorherrschen der Entdeckungs-Flächen, aufgewachsen und zu Drusen verbunden; krystallinische Massen, verb. traubig, nierenförmig, eingesprengt.

Spaltbar parallel der kleineren Diagonale und nach d.

Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 3,5. Wenig spröde. Spec. Gew. = 3,1 — 3,3. Durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Rauch-, seladon-, öl-, schwärzlichgrün; braun. Strich: grünlichweiß.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er leicht, unter Entwicklung von Arsenik-Dämpfen, zu einer grauen Schlacke, die vom Magnete angezogen und von den Flüssen gelöst wird, denen sie die Reaktion des Eisens ertheilt. Im Kolben Wasser gebend und bei größerer Hitze weißes Arsenik sublimirend. Auflöslich in Salzsäure. Chem. Gehalt nach Ficinus:

Eisenoxydul.....	47,5
mit Spur von Kalk und Mang.	
Arsenikte Säure..	31,4
Schwefelsäure....	1,5
Wasser.....	18,0
	<hr/> 98,4

Auf einem Quarz- und Hornstein-Lager zu Grauel bei Schneeberg; Raschauer Knochen bei Schwarzenberg in Sachsen; auf quarzigem dichtem Braun-Eisenstein zu Johann-Georgenstadt in Sachsen; auf Eisenspath-Lagern zu Hüttenberg in Kärnthén; St. Austle in Cornwall. Villa ricca in Brasilien.

234. Eisensinter.

Syn. Eisen-Pecherz ꝛ. Th. Fer oxyde résinite.

Derbe, opalartige Massen, traubig, nierenförmig, tropfsteinartig, als Ueberzug.

Bruch: muschelig. Härte = 2,5. Wenig spröde. Spec. Gew. = 2,4. Halbdurchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glasglanz, häufig fettartig. Gelblich-, röthlich-, schwärzlichbraun; braunlichgelb; gelblichgrau. Strich: ockergelb, gelblichweiß.

B. d. L. auf Kohle, unter Entwicklung arsenikalischer Dämpfe, zu einer eisenschwarzen Kugel, die vom Magnete angezogen wird. Im Kolben viel Wasser gebend. In Wasser wird er roth, durchsichtig, glasglänzend und zerfällt. Das Pulver in Salzsäure leicht auflöslich. Chem. Gehalt nach Stromeyer (a) und nach Kersten (b):

	a	b
Eisenoxyd.....	33,10	40,45
Arseniksfäure...	26,06	30,25
Schwefelsäure..	10,04	
Manganoxyd..	0,64	
Wasser.....	29,26	28,50
	<u>99,10</u>	<u>99,20</u>

In alten Gruben-Gebäuden zu Freiberg und Schneeberg in Sachsen; auf Steinkohlen-Lagern zu Nieder-Lazise in Schlesien.

235. Würfelerz.

Syn. Pharmakosiderit. Hexaedrischer Eirokon-Malachit. Fer arseniate. Arseniate of Iron.

Kernform: Würfel; außer diesem, der am häufigsten erscheint, kommen noch folgende Gestalten vor: 1) enteckt; 2) entkantet; 3) enteckt und entkantet; 4) vierfach enteckt u. s. w.

Krystalle, meist sehr klein, glatt, aufgewachsen und zu Drusen verbunden; derb von körniger Zusammensetzung.

Spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: uneben ins Muschelige. Härte = 2,5. Wenig spröde. Spec. Gew. = 2,9 — 3,0. Durchscheinend, meist nur an den Kanten, zuweilen Diamantartig. Gras-, oliven-, pyritgrün-, schwärzlichgrün; leberbraun. Strich: lichte olivengrün ins Strohgelbe.

B. d. L. auf Kohle schmilzt es leicht, unter Entwicklung von Arsenik-Geruch zu einer schwarzen magnetischen Kugel. Im Kolben gibt es Wasser und wird roth; bei stärkerer Hitze Spuren von arsenichter Säure gebend und sich etwas ausblähend. In Salzsäure leicht auflöslich. Chem. Zusammf. nach v. Kobell:

Eisenoxyd.....	27,67
Eisenoxydul....	12,43
Arseniksfäure...	40,76
Wasser.....	19,14
	<u>100,00</u>


Auf Kupfererz-Gängen bei Redruth in Cornwall: St. Leonard im Depart. der hohen Vienne; auf Braun-Eisenstein zu Langenborn im Speßart; auf einem Rieslager im Glimmerschiefer am Grauel bei Schwarzenberg in Sachsen.

236. Arsenikkies.

Syn. Prismatischer Arsenikkies, Mispickel. Fer arsenical. Arsenical Iron.

Fig. 230.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M||M = 111^{\circ} 53'$ und $68^{\circ} 7'$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entspißect (r) z. Versch. von P, Fig. 230.; 3) beßgl. und entstumpfect; 4) zweifach entspißect und entstumpfect z. Versch. der Kernflächen; 5) Zwillinge von No. 2. u. s. w.



Krystalle, tafelartig durch Vorherrschen von r, niedrig säulenartig, nadelförmig, die Oberfläche glatt, nur die Entspießungs-Flächen stark parallel der kleinen Diagonale gestreift, so wie die P-Flächen zuweilen drusig und rauh, einzeln auf- oder ein-, auch zu mehreren zusammengewachsen und zu Drusen verbunden; verb, eingesprengt, von stängeliger oder körniger bis dichter Zusammensetzung.

Spaltbar parallel den Seitenflächen; nach P nur Spuren. Bruch: uneben. Härte = 5,5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 6,0 — 6,2. Undurchsichtig. Metallglanz. Silberweiß ins Zinnweiße und Stahlgrau; zuweilen gelblich oder grau angelauten, Strich: granlichschwarz.

B. d. L. die Kohle beschlagend und starken Arsenikgeruch gebend. Im Kolben gibt er zuerst ein braunes oder schwärzliches Sublimat, sodann metallisches, krystallinisches Arsenik. Auf Kohle riecht er nach dem Glähen nicht mehr nach Arsenik und schmilzt leicht zu einer schwarzen magnetischen Kugel. Auflöslich in Salpetersäure mit Ausscheidung von Schwefel und arsenichter Säure. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Eisen.... 33,3

Arsenik... 46,9

Schwefel. 19,8

100,0

Zuweilen silberhaltig, sogenanntes Weißerz.

Auf Gängen und Lagern, oder eingesprengt in verschiedenen Gebirgsarten: Freiberg, Bräunsdorf, Muzig, Altenberg, Ehren-

friedersdorf und Geyer in Sachsen; Joachimsthal, Binnwald und Schlaggenwald in Böhmen; Andreasberg am Harz; Schladming in Steyermark; Golnik in Ungarn; Salathna in Siebenbürgen; Cornwall; Baryberg, Salberg u. a. D. in Schweden; Sibirien u. s. w.

Der Arsenikkies wird auf Arsenik, das Weißerz auf Silber benutzt.

237. Kohlen saures Eisenorydul.

Syn. Kohlen saures Eisen. Fer oxydé carbonaté. Carbonate of Iron.

Kernform: Rhomb oder. $P||P = 107^\circ$ über den Scheitellanten; $= 73^\circ$ über den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entscheidet, zuweilen z. Verschwinden der Scheitellanten; 3) entscheidetlanten; 4) beßgl. z. Verschw. der P-Flächen; 5) entscheidetlanten und entscheidet zum Verschw. der P-Flächen; 6) entrandet in der Richtung der Scheitellanten; 7) beßgl. und vierfach entscheidet z. Verschw. von P; 8) entrandet zur Säule; 9) entrandet zur Säule.

Krystalle, krystallinische, strahlige, derbe Massen; dicht.

Spaltbar parallel den Kernflächen vollkommen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte $= 3,5 - 4,5$. Spröde. Spec. Gew. $= 3,6 - 3,9$. Durchscheinend bis undurchsichtig. Glasglanz, häufig perlmutterartig. Weiß, grau, gelb, braun. Strich: weiß, gelblichbraun.

B. d. L. decrepitirend, brennt sich schwarz und gibt Eisenorydul, das stark vom Magnete angezogen wird. Zu den Flüssigkeiten verhält es sich wie Eisenorydul. In Salz- und Salpetersäure ist das Pulver unter Brausen auflöslich. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin;

Eisenorydul.. 61,4

Kohlensäure.. 38,6

100,0

Häufig ist ein Theil des Eisenoryduls durch Manganoxydul, auch durch Kalk oder Talk vertreten.

Arten:

1. Eisenspath.

Syn. Spathisenstein. Prachtytyper Parachroßbaryt. Spathose Iron.

Krystalle, häufig rauh mit sattelartig gebogenen und gekrümmten Flächen, selten einzeln ein- oder auf-, meist treppenartig zusammengewachsen oder zu Drusen verbunden; derbe Massen von körniger bis dichter Zusammensetzung. Weiß, gelblich-, grünlich-, aschgrau; isabellgelb; gelblich-, röthlich-, nelfen- bis schwarzbraun; an der Luft dunkel werdend, zuweilen bunt angelauten.

Findet sich auf Gängen und Lagern im älteren Gebirge, auf liegenden Stöcken im Flözkalke. Allgemein verbreitet; besonders ausgezeichnet zu Neudorf im Bernburgischen; Iberg und Klausthal am Harz; Schmalkalben und Viber in Hessen; Müsen, Dillenburg und Siegen auf dem Westerwalde; Ehrenfriedersdorf und Altenberg in Sachsen; Eisenerz in Steyermark; Hüttenberg in Kärnthen; Piemont u. s. w.

Er wird verschmolzen, und gibt ein zur Stahlbereitung besonders dienliches Eisen.

2. Sphärosiderit.

Syn. Strahliger Spathseisenstein. Fer oxyde carbonaté concretionné. mameloné.

Krystalle der Form No. 7., sehr selten, meistens kugelige, traubige, nierenförmige Gestalten von auseinander laufend faseriger Textur, mit drüsiger Oberfläche, einzelne Krystall-Enden zeigend, eingesprengt. Weingelb, gelblich-, röthlich-, nelfenbraun ins Graue.

In Basalt und Dolerit: Steinheim und Wilhelmsbad bei Hanau; Oberkassel am Rhein; Lammerspiel in Hessen; Dransberg bei Göttingen u. s. w.

Anhang:

Thoniger Sphärosiderit.

Syn. Dichter Sphärosiderit.

Derbe, kugel-, nieren- und plattenförmige Massen, häufig zerborsten. Bruch; flach muschelig. Undurchsichtig. Matt. Grau und braun in verschiedenen Nüancen. Ein inniges Gemenge von kohlensaurem Eisenoxyde mit Kiesel-, Thon-, Kalk- und Talkerde.

Bildet ganze Lagen in der Braunkohlen-Formation des Nieder-Rheinischen Gebirges, s. u. a. im Geistinger Walde, nordöstlich vom Siebengebirge; im Kohlenschiefer: Essen an der Ruhr,

Bäschweiler am Hundsrücken; Altweltersdorf im Glazischen; Frankreich; England; u. s. w.; im Quadersandstein: Carlshütte im Braunschweigischen.

Wird auf Eisen benutzt.

238. Botryogen.

Syn. Rother Eisen-Bitriol. Rother Bitriol.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 119^\circ 56'$ und $60^\circ 4'$; $P \parallel M = 113^\circ 37'$ und $66^\circ 23'$. Vorkommende Gestalten: 1) entseiteneckt und zweifach entnebensseitig; 2) entseiteneckt, entspißteckt, entscharrandet und dreifach entnebensrandet.

Krystalle, klein, meist unvollkommen ausgebildet, vertikal gestreift auf den Seitenflächen, gewöhnlich zu traubigen, nierenförmigen oder kugeligen Gestalten gruppiert.

Spaltbar parallel den M-Flächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 2,5. Milde. Spec. Gew. = 2,039. Durchscheinend. Glasglanz. Dunkel hyazinthroth, ockergelb. Strich: ockergelb. Geschmack schwach zusammenziehend.

B. d. L. bläht er sich auf. Im Kolben Wasser gebend und entwickelt beim Glühen schweflichte Säure; der Rückstand verhält sich wie Eisenoryd zu den Flüssigkeiten. In Wasser langsam lösbar. Chem. Gehalt nach zwei Analysen von Berzelius:

Basisch-schwefelsaures Eisenoryd	6,77	—	6,85
Doppel-schwefelsaures Eisenorydul-Dryd	35,85	—	39,92
Schwefelsaure Kalkerde	26,88	—	17,10
Schwefelsaure Kalkerde	2,22	—	6,71
Wasser und Verlust	28,28	—	31,42
	100,00		102,00

Findet sich als Ueberzug auf Gyps und Eisenkies mit Bitersalz und Eisenvitriol zu Fahlun in Schweden.

239. Sifingerit.

Derbe, zuweilen schalige Massen.

Bruch: unvollkommen muschelig bis uneben. Härte = 3,5
— 3. Zerreiblich. Spec. Gew. = 3. Undurchsichtig. Fettglanz.
Schwarz, braunlichschwarz. Strich: bräunlichgelb.

B. d. L. zur matten schwarzen, schlackigen Kugel, welche dem Magnete folgt. Mit Borax zu einem von Eisen gefärbten Glase. Im Kolben Wasser gebend. Von Salzsäure wird er leicht mit kieseligem Rückstand gelöst. Chem. Gehalt nach Hisinger:

Eisenoxyd-Drydul 44,39

Kieselerde 36,30

Wasser 20,70

101,39

Findet sich mit Kalkspath auf der Gillinge-Grube im Svärta Kirchspiele in Südermanland.

Hierher scheint v. Kobell's Traulit von Bodenmais in Baiern zu gehören.


240. Levrit.

Syn. Diprismatisches Eisenerz: Jvait. Fer calcaréo-siliceux.

Kernform: rektanguläres Ditetraeder. $P||P=112^{\circ} 40'$; $M||M=111^{\circ} 12'$ und $68^{\circ} 48'$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform, diese, so wie alle andere Kombinationen, stets in der Richtung der Hauptaxe in die Länge gezogen; 2) zweifach entseitenect (o); 3) beßgl. z. Verschw. von P, Fig. 131.; 4) zweifach entseitenect und zweifach entseitert (s), Fig. 132.; 5) beßgl. z. Verschw. von M; 6) zweifach entseitenect, zweifach entseitert und entgipfelfantet u. s. w.

Fig. 131.

Fig. 132.



Kristalle, lang säulenartig durch Vorherrschen von M, zuweilen nadelförmig, die Seitenflächen stark vertikal gestreift; einzeln ein- und aufgewachsen, meist zu Drusen und Büscheln verbunden; verb von stängeliger oder körniger Zusammensetzung, eingesprenkt.

Spaltbar parallel den beiden Queraxen unvollkommen, undeutlich nach M. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 5,5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 5,9 — 4,2. Undurchsichtig. Metallartiger Fettglanz. Sammet-, pech-, graulich-, blaulich-, braunlichschwarz; kastanien-, nelfenbraun. Strich: schwarz.

B. d. L. schmilzt er leicht und ruhig zu einer eisen schwarzen magnetischen Kugel. Vorarglas ertheilt er die Eisenfarbe. Von Phosphorsalz wird er mit Ausscheidung der Kiesel-erde zerlegt. Das Pulver ist durch Salzsäure auflösbar und bildet eine Gallerte. Chem. Zusammens. nach L. Gmelin:

Eisenoxydul	56,5
Kiesel-erde..	32,2
Kalkerde...	11,3
	<hr/> 100,0

Häufig mit etwas Manganoxydul und Thonerde verunreinigt.

In augitischem Gestein mit Hornblende, Strahlstein, Quarz zc. bei Rio la Marina auf Elba; Kupferberg in Schlesien; mit Epidot und Malakolith bei Ischorlau in Sachsen; Nord-Amerika; Sibirien.

241. Sideroschistolith.

Kernform: Rhomboeder von unbekannten Winkel-Verhältnissen.

Krystalle, sehr klein und unvollkommen, krystallinische Massen.

Spaltbar parallel den Entscheidungsf lächen. Härte = 2. Spec. Gew. = 3,0. Auf den Spaltungsflächen stark glänzend. Sammet-schwarz. Strich: dunkellauchgrün.

In der Lichtflamme wird er eisen-schwarz und dem Magnete folgsam. B. d. L. auf Kohle zur eisen-schwarzen Kugel schmelzend. Gibt im Kolben Wasser. In Salzsäure auflöslich und gelatinirend. Chem. Gehalt nach Wernerkink:

Schwarzes Eisenoxyd	75,5
Kiesel-erde.....	16,3
Thonerde.....	4,1
Wasser.....	7,3
	<hr/> 103,2

Mit Leberkies und Eisenspath zu Conghonas do Campo in Brasilien.

242. Grünerde.

Syn. Talc chlorite zographique. Green Earth.

Umbildungs-Pseudomorphosen nach Augit-Gestalten; verb, kugelig, mandel- und plattenförmig, als Ueberzug.

Bruch: uneben, feinkörnig, erdig. Härte = 2. Spec. Gew. = 2,834. Undurchsichtig. Matt. Geladon-, schwärzlich-, oliven-grün. Strich: blaulichgrau oder graulichweiß.

B. d. L. leicht zu schwarzem magnetischem Glase schmelzbar. Säuren ohne Wirkung. Chem. Gehalt nach Klaproth:

Eisenoxyd 28

Kieselerde 53

Talkerde.. 2

Kalk..... 10

Wasser... 6

99

Nesterweise am Monte Baldo im Veronesischen; in den Blasenräumen vieler Mandelsteine und Augit-Porphyre: Fassathal in Tyrol; Garder; Island u. s. w. — Als bezeichnende Einmischung in manchen Felsarten: Grobkalk, Kreide, grüner Sandstein u.

Die Grünerde aus Verona, Veroneser Erde, wird in der Del- und Leinmalerei angewendet.

243. Krokydolith.

Syn. Blau-Eisenstein.

Plattenförmige Massen mit zartfaseriger Textur, verb, dicht.

Bruch: erdig. Härte = 4. In dünnen Fasern elastisch-biegsam. Spec. Gew. = 3,20. Undurchsichtig. Seidenglanz bis matt. Indig-, enten-, dunkel-, lavendelblau. Strich: lavendelblau.

B. d. L. leicht schmelzbar zu einem schwarzen, schlackigen, magnetischen Glase. Mit Borax zu einer grünen durchsichtigen Perle. Säuren ohne Wirkung. Chem. Gehalt des faserigen (a) und des dichten Krokydoliths (b), nach Stromeyer:

Im Sande mancher Bäche und Flüsse: Niedermendig unfern Andernach; Expailly bei Le Puy im Delav; Albano, Frascati, Rom; Ischia; Aetna; Capo de Gata; Schandau in Sachsen; Schima in Böhmen Rüste von Pommern; Siebengebirge u.; in Schottland und England manchen Trapp-Gesteinen beige-mengt; in glasigem Feldspath-Gestein am Laacher See; in Auswürflingen alter Eruptionen am Monte Somma; in basaltischer Lava bei Le Puy.

247. Iserin.

Syn. Magnetischer Eisenand z. Thl. Titansand z. Thl.

Kernform: regelmäßiges Oktaeder; nebst diesem ist noch die Entkantung beobachtet.

Krystalle, sehr selten, lose, meist zugerundet und undeutlich, häufiger eckige Körner und kleine rundliche Stücke.

Bruch: vollkommen muschelig. Härte = 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,7 — 4,8. Undurchsichtig. Metallglanz. Eisen-schwarz. Strich: schwarz. Magnetisch.

B. d. L. unschmelzbar und unveränderlich. Mit Borax schwärzlichbraunem Glase; im übrigen wie Titaneisen sich verhaltend. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Eisenoxyd-Drydul 72,2

Titansäure..... 27,8

100,0

Findet sich in einem, aus Granit hervorgegangenen Sande, auf der Iserwiese im Riesengebirge; am Ufer des Loch of Trista auf Fetlar; im Bette des Don in Aberdeenshire; am Ufer des Merses bei Seacombe Ferry.

248. Menakan.

Syn. Titansand z. Thl. Schwarz-Titanerz. Menakeisenstein. Titano oxyde ferrifere granuliforme.

Kernform: quadratische Säule?

Derbe Massen mit grobkörniger bis dichter Zusammen-
setzung, glatte und abgerundete Körner mit rauher Oberfläche,
Sand.

Spuren von Spaltbarkeit parallel *M*, und den beiden Diagonalen der Endflächen. Bruch: muschelig. Härte = 5,5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 4,5 — 4,7. Undurchsichtig. Metallglanz. Eisenschwarz; bräunlichschwarz; stahlgrau. Strich: schwarz. Magnetisch.

B. d. L. unschmelzbar und unveränderlich. Mit Phosphorsalz in der Reduktionsflamme ein blutrothes Glas gebend. In Salz- und Salpetersäure mit Ausscheidung von Titanoryd auflöslich. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Eisenoxyd-Drybul 56,5

Titansäure..... 43,5

100,0

Häufig mit etwas Kiesel-erde verunreinigt.

Im älteren Gebirge zu Egersund in Norwegen und zu Fens in Fyn; im Sande im Thale von Menaccan in Cornwall; Bay; Brasilien.

249. I m e n i t.

Titaneisen aus Gastein. Xrotomes Eisenerz.

Fig. 233.

Kernform: Rhomboeder. $P||P = 85^{\circ}$

58° über den Scheitellanten; $= 94^{\circ} 2'$ über

den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1)

entscheidet (o), entscheidellantet (v) und entrand-

et in der Richtung der Scheitellanten (u), Fig.

233.; 2) entscheidet und entscheidellantet, jedoch nach einer Seite

hin weiter ausgekehrt, so daß die Figur ein sehr unsymmetrisches

Ansehen erhält u. s. w.

Krystalle; glatt oder rauh, die Entscheidungsfächen ge-

stirkt, eingewachsen; Körner.

Spaltbar parallel o vollkommen, undeutlich nach P. Bruch:

muschelig. Härte = 5 — 6. Spröde. Spec. Gew. = 4,66 — 5,0.

Undurchsichtig. Metallglanz, meist unvollkommen. Eisen-, braun-

lichschwarz. Strich: schwarz. Schwach magnetisch.


B. d. L. unschmelzbar. Zu den Flüssigkeiten wie Manasse sich

verhaltend. In concentrirter Salzsäure auflöslich. Chem. Ge-

halt des Imenit von Mias nach Mosander (a) und des

Titaneisen von Gastein nach v. Kobell (b):

Stum, Drostognose.



— 3,4 — 3,7. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Fettglanz. Pechschwarz, nelfenbraun, selten grünlichgrau. Strich: grünlichgrau bis gelblichbraun.

B. d. L. auf der Kohle schmilzt er sehr leicht und mit starkem Brausen zu einer metallisch-glänzenden Kugel, die stark vom Magnete angezogen wird. Mit Borax leicht auflösbar zu einem Glase, das im Oxydationsfeuer violett, im Reduktionsfeuer von Eisen gefärbt erscheint. In Salzsäure ist das Pulver leicht und vollkommen auflöslich. Chem. Zusammf. nach L. Smelin:

Eisenoxydul . . . 32,8

Manganoxydul. 33,6

Phosphorsäure. 33,6

100,0

Findet sich nesterweise im Granit: Limoges im Départ. der hohen Vienne; Bodenmais in Baiern; Pensylvanien.

253. Hetepozit.

Derbe Massen mit blätteriger Textur.

Spaltbar nach den Flächen einer schiefen rhombischen Säule, deren Seiten unter einem Winkel von ungefähr $100 - 101^\circ$ zu einander geneigt sind. Bruch: muschelrig bis uneben. Härte = 6. Spröbde. Spec. Gew. = 3,524. Fettglanz. Grünlichgrau ins Blaue, auf der Oberfläche violett.

B. d. L. zu einem dunkelbraunen Email schmelzend. In Salpeter- und Salzsäure auflöslich. Chem. Zusammens. nach v. Kobell (a), Analyse von Düfrénoy (b):

a	b
Eisenoxydul . . . 34,88	34,89
Manganoxydul. 18,12	17,57
Phosphorsäure. 42,53	41,77
Wasser 4,47	4,40
	0,22 Kieselerde
100,00	98,85

Findet sich zu Limoges.

254. Huraulit.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M \parallel M = 62^{\circ} 30'$ und $117^{\circ} 30'$; $P \parallel M = 101^{\circ} 42' 24''$ und $78^{\circ} 47' 36''$ (Düfrénoy). Vorkommende Gestalten: 1) entseitenect zur Schärfung über P; 2) desgl. und entmittelseitet.

Krystalle, sehr klein, auf den Seitenflächen vertikal gestreift, aufgewachsen.

Bruch: muschelig. Härte = 4. Spec. Gew. = 2,27. Durchscheinend. Glasglanz. Gelblichroth, röthlichbraun.

B. d. L. leicht zur schwarzen Perle schmelzbar. Gibt im Kolben Wasser. In Salzsäure auflöslich. Chem. Zusamm. nach v. Kobell (a), Analyse von Düfrénoy (b):

	a	b
Eisenorydul . . .	11,24	11,10
Manganorydul . .	34,98	32,85
Phosphorsäure . .	36,52	38,00
Wasser	17,26	18,00
	<u>100,00</u>	<u>99,95</u>

In kleinen Adern im Granit: Hurcaur unfern Limoges.

255. Pyrosmalith.

Syn. Pyrosmalith. Salzsaures Eisen. Fer muriaté. Native Muriate of Iron.

Kernform: sechsseitige Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entrandet.

Krystalle, mit rauhen Seitenflächen; derbe blättrige Massen.

Spaltbar parallel P deutlich, unvollkommen nach M. Bruch: uneben ins Splitterige. Härte = 4. Spröde. Spec. Gew. = 2,95 — 3,083. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Glas-, auf Spaltungsflächen Perlmutterglanz. Leber-, gelblich-braun ins Graue und Grüne. Strich: lichtegrün.

B. d. L. auf Kohle gibt er bei gelinder Erhitzung einen sauren Geruch; schmilzt leicht zu einer stahlgrauen Kugel, die vom Magnete gezogen wird. Mit Borax zu einem von Eisen gefärbten Glase. Gibt im Kolben Wasser und färbt sich schwarz. Das Pulver wird von Salz- und Salpetersäure mit Ausscheidung von Kieselerde aufgelöst. Chem. Gehalt nach Hisinger:

Eisenoxydul	21,810
Basischsalzsaures Eisenoxydul	14,095
Manganoxydul	21,140
Kieselerde	35,850
Kalkerde	1,210
Wasser und Verlust	5,895

100,000

Findet sich auf Magneteisen-Lagern mit Hornblende und Kalkspath zu Philippsstadt in Nordmarken und im Nya-Kopparsbergs Kirchspiele in Westmanland in Schweden.

256. Cronstedtit.

Kernform: sechsseitige Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseitet.

Krystalle, sehr klein, mit vertikal gestreiften Seitenflächen, zum Theil nadelförmig, einzeln auf-, häufiger zu mehreren aneinander gewachsen; derbe Massen von stängeliger bis faseriger Zusammensetzung, nierenförmig, eingesprengt.

Vollkommen spaltbar parallel P, unvollkommen nach M. Härte = 2,5. In dünnen Blättchen etwas elastisch-biegsam. Spec. Gew. = 3,348. Durchscheinend bis undurchsichtig. Glasglanz. Rabenschwarz. Strich: dunkel lauchgrün.

B. d. L. auf der Kohle bläht er sich etwas auf und schmilzt langsam zu einer schwarzen Kugel, die vom Magnete angezogen wird. Mit Borax leicht auflöslich zu einem von Eisen gefärbten Glase. Im Kolben Wasser gebend. Mit Salzsäure gelatinirend. Chem. Gehalt nach Steinmann:

Eisenoxyd . . .	58,853
Manganoxyd	2,885
Kieselerde . . .	22,452
Kalkerde . . .	5,078
Wasser	10,700

99,968

Auf Gängen, mit Kalkspath, Eisenspath, Braun-Eisenstein und Eisengies zu Przibram in Böhmen; Wheal Maublin in Cornwall.

257. Nigrin.

Syn. Titane ferrugineux.

Kernform: quadratisches Oктаeder. Beobachtete Gestalten: 1) entkantet; 2) Zwillinge dieser Form; beide von Balenzia.

Krystalle, klein, glatt, zuweilen drüsig oder geborsten, einzeln auf-, ein- oder zusammengewachsen, berbe, körnig-blätterige Massen, eingesprengt, stumpfeckige und abgerundete Körner.

Spaltbar parallel den P- und den Entdeckungs-Flächen. Bruch: unvollkommen muschelig bis uneben. Härte = 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 4,4 — 4,5. Undurchsichtig. Metallglanz, zuweilen fettartig. Pechschwarz, dunkelröthlichschwarz. Strich: schwarz. Magnetisch.

B. d. L. unschmelzbar und unveränderlich. Mit Phosphorsalz im Reduktionsfeuer ein dunkelrothes, im Oxydationsfeuer ein von Eisen gefärbtes Glas gebend. Chem. Gehalt nach Klaproth:

Eisenoxyd... 14

Titanoxyd... 84

Manganoxyd. 2

100

Eingewachsen in Gyps: Balenzia in Spanien; in Diorit: Ronsberg in Böhmen; dann findet er sich in Körnern zu Ohlapian in Siebenbürgen; am Ural; Hof-Gastein in Salzburg; Bernau in Baiern.

258. Tantalit.

Syn. Prismatisches Tantalerg. Kolumbit. Tantale oxydè. Columbite.

Kernform: gerade rektanguläre Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entlängenrandet und zweifach entseitet; 3) entlängenrandet, entseitet und enteckt.

Krystalle, sehr selten, häufig tafelartig durch Vorherrschen von T, glatt, nur die T-Fläche stark vertikal gestreift, auf- oder eingewachsen; berbe, scharfeckige Stücke eingewachsen, eingesprengt.

Spaltbar parallel den Kernflächen, am deutlichsten mit T. Bruch: unvollkommen muschelig ins Uebene. Härte = 6. Spröde.

Spec. Gew. = 6,03. Undurchsichtig. Metallglanz, auf Bruchflächen fettartig. Eisen-, graulich-, braunlichschwarz. Strich: dunkel braunlichschwarz.

B. d. L. für sich unveränderlich. Mit Borax leicht zu einem dunkelgrünen Glase schmelzend, das nicht unklar geflattert werden kann, wenn es nicht eine so starke Eisensfarbe bekommen hat, daß es undurchsichtig ist; mit Phosphorsalz langsam zu einem stark von Eisen gefärbten Glase auflösbar; mit Soda gibt er auf Platinblech Mangan-Reaktion. Wird von Säuern nur wenig angegriffen. Chem. Gehalt nach Vogel:

Eisenoxyd... 17

Tantaloxyd.. 75

Manganoxyd 5

Zinnoxyd... 1

98

In Granit eingewachsen: Bodenmais in Baiern; New-London und Haddam in Konnektikut.

Anhang:

Die in Schweden und Finland vorkommenden Tantalite weichen sowohl unter sich, als von dem eben angeführten in manchen Stücken ab. Berzelius führt folgende Arten an:

1) *Kimito-Tantalit*. Spec. Gew. = 7,23. B. d. L. für sich unveränderlich. Von Borax wird er langsam, aber vollständig zu einem von Eisen gefärbten Glase aufgelöst, das bei einem gewissen Sättigungsgrade sich graulichweiß flattern läßt; bei größerer Sättigung wird es beim Abkühlen von selbst undurchsichtig. Von Phosphorsalz wird er langsam aufgelöst, und zeigt nur die Farbe des Eisens. Mit Soda auf Platinblech Mangan-Reaktion zeigend.

2) *Finbo-Tantalit*. B. d. L. verhält er sich wie der vorige, gibt aber im Reduktions-Versuche eine bedeutende Menge Zinn.

3) *Brodbo-Tantalit*. Spec. Gew. = 6,29. Undurchsichtig. Metallglänzend. Schwarz. B. d. L. unveränderlich; mit Borax verhält er sich wie der vorhergehende. Vom Phosphorsalze wird er langsam aufgelöst, im Oxydationsfeuer mit der Farbe des Eisens, im Reduktionsfeuer mit einer rothen Farbe, die bei der Abkühlung zunimmt und die Gegenwart des Wolframs anzeigt.

4) *Tantalit* mit zimmetbraunem Pulver von Kimito. Spec. Gew. = 7,9. B. d. L. für sich unveränderlich. Nur als sehr feines Pulver, und bei lang fortgesetztem Blasen, mit Borax auflösbar zu einem dunkelgrünen Glase; mit Phosphorsalz leichter aufzulösen.

Chem. Gehalt dieser vier Arten:

	1	2	3	4
Eisenoxydul...	7,2 Dryd	7,67	9,58 Drydul	14,41
Tantaloxyd...	83,2	66,99	68,22	82,56
Manganoxydul	7,4 Dryd	7,98	7,15 Drydul	1,79
Zinnoxyd.....	0,6	16,75	8,26	0,80
Wolframsäure.			6,19 Kieselerde	0,72
Kalkerde.....		2,40	1,19	0,56
	98,4	101,79	100,59	100,84

Alle diese Tantalite kommen in derben Massen oder in scharfeckigen Stücken eingewachsen und eingesprengt im Granite vor: Finbo und Broddbo unfern Fahlun in Schweden; Brofärns-Zinsgut in Abo-Landschaft und Skogsbole-Ländereien in Kimito in Finland.

259. Wolfram.

Syn. Prismatisches Scheelerz. Scheelin ferrugineux. Tungstate of Iron.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M||M = 101^{\circ} 5'$ und $78^{\circ} 55'$; $P||M = 110^{\circ} 45' 50''$ und $69^{\circ} 14' 10''$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) zweifach entmittelseitet (b), Fig. 235.; 3) entmittelseitet (r), entseiteneckt (u) und entspißect (n); 4) beßgl. und entnebenseitit; 5) entseitit, dreifach entseiteneckt (a und s in der Richtung des stumpfen, u in der des scharfen Randes) und entspißect; 6) dreifach entmittelseitet, entseiteneckt und entspißect; 7) beßgl. und entnebenseitit; 8) dreifach entmittelseitet und zweifach entseiteneckt (Fig. 236. ohne a und n); 9) dreifach entmittelseitet (b und r), dreifach entseiteneckt (a s u) und entspißect (n), Fig. 236.; 10) Zwillinge mehrerer der angeführten Combinationen.

Fig. 235.





Fig. 236.



Krystalle, kurz säulen-, auch tafelartig durch Vorherrsch-

von r, öfter groß und sodann meist aus schaligen Hütten zusammenge setzt, die Seitenflächen vertikal gestreift, ein- und aufgewachsen, selten Umbildungs- Pseudomorphosen nach Scheelit-Formen, häufig kry stallinische und derbe Massen mit blätteriger, schaliger oder strahliger Textur.

Spaltbar parallel der kleinen Diagonale der P-Fläche sehr vollkommen. Bruch: uneben. Härte = 5 — 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 7,0 — 7,2. Undurchsichtig. Metallähnlicher Diamantganz. Graulich-, braunlichschwarz. Strich: röthlichbraun, schwärzlichbraun.

B. d. L. schmilzt er schwer zu einer eisengrauen, auf der Oberfläche mit glänzenden prismatischen Kry stallen bedeckten, Kugel, die auf die Magnetrnadel wirkt. Mit Borax ziemlich leicht zu einem von Eisen gefärbten Glase; mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer ein eisen grünes, im Reduktionsfeuer ein dunkelrothes Glas gebend. Lösbar in erhitzter Salzsäure, mit Hinterlassung eines grünlichgelben Rückstandes (Scheelsäure). Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Eisenorydul . . . 16,9

Scheelsäure . . . 5,8

Manganorydul 77,3

100,0

Auf Zinnerz-Lagerstätten: Zinnwald, Schlaggenwald, Altenberg, Geier und Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge; Cornwall; auf Gängen in Grauwacke: Strassberg und Neudorf am Harz. Ferner findet er sich zu Turrach in Steyermark; St. Léonard im Depart. der hohen Vienne; Cumberland; Odon-Tschelon in Siberien; Huntington in Konnektikut u. s. w.

260. Franklinit.

Syn. Dodekaedrisches Eisenerz.

Kernform: regelmäßiges Oктаeder. Vorkommende Gestalten; 1) entrandet; 2) desgl. und enteckt.

Kry stallen, gewöhnlich zugerundet, zuweilen wie geflossen, selten auf-, meist eingewachsen, häufiger aber eingewachsene Körner.

Unvollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch:

muschelig. bis uneben. Härte = 6 — 6,5. Spröde. Spec. Gew. = 5 — 5,3. Undurchsichtig; Metallglanz. Eisenschwarz. Strich: röthlichbraun. Magnetisch.

B. d. L. für sich unveränderlich. Mit Borax leicht zu einem von Eisen gefärbten Glase schmelzend. Mit Soda auf Kohle im Reduktionsfeuer Zinkrauch, auf Platinblech im Drydationsfeuer Mangan-Reaktion gebend. Lösbar in erhitzter Salzsäure. Chem. Gehalt nach Berthier:

Eisenoxyd..... 66

Zinkoxyd..... 17

Rothes Manganoxyd. 16

99

Findet sich mit rothem Zinkoxyd und Kalkspath in den Franklin-Gruben in New-Yersey.

XXXI. Gruppe. Kobalt.

Findet sich nicht gebiegen in der Natur, sondern mit Arsenik und Schwefel rein, oder in gesäuertem Zustande verbunden, als arsenik- und schwefelsaures Kobaltoxyd, auch mit Manganoxyd vereinigt.

Die Härte der Mineralien dieser Gruppe übersteigt nicht 6; ihr specifisches Gewicht steht unter 6,6. Sie sind meist undurchsichtig und gefärbt. Vor dem Löthrohre geben sie mit Borax und Phosphorsalz schöne blaue Gläser. In Salpeter- oder Salzsäure sind sie entweder vollkommen oder theilweise auflöslich.

261. Kobaltkies.

Syn. Schwefel-Kobalt. Cobalt sulfuré. Sulphuret of Cobalt.

Kernform: regelmäßiges Octaeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform: 2) enteckt.

Kristalle glatt, einzeln eingewachsen, häufig zu Drusen verbunden, krystallinisch-körnige Massen.

Spuren von Spaltbarkeit nach den P- und den Entdeckungsflächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 5,5. Undurchsichtig. Metallglanz. Zwischen zinnweiß und lichte stahlgrau; zuweilen kupferroth oder gelblich angelauten. Strich: grau.

B. d. L. auf Kohle entwickelt er Schwefel-Geruch, und schmilzt zur grauen Metallkugel. Mit Borax und Phosphorsalz blaue Gläser gebend. Das Pulver. braust mit concentrirter Salpetersäure und entwickelt rothe Dämpfe, mit Beihülfe von Wärme leicht und vollkommen auflöslich. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Kobalt.. 64,4

Schwefel 35,6

100,0

Meist mit etwas Eisen und Kupfer verunreinigt.

Findet sich auf Lagern im Gneise mit Kupferkies und Strahlstein: Ridbarhyttan in Schweden; auf Gängen im Uebergangs-Gebirge mit Kupferkies, Eisenkies, Bleiglanz u.: Siegen.

262. Kobalt-Vitriol.

Syn. Cobalt sulfaté. Sulphate of Cobalt.

Derbe, tropffsteinartige, zackige Massen, als Ueberzug und Anflug.

Bruch: erdig. Zerreiblich. Durchscheinend bis undurchsichtig. Matt, seiden- und glasglänzend. Fleischroth ins Rosenrothe. Strich: röthlichweiß. Geschmack zusammenziehend.

B. d. L. im Kolben gibt er zuerst Wasser und dann bei starkem Glühen schweflichte Säure, besonders wenn etwas Kohlenpulver beigemengt wird. Mit Borax gibt er ein blaues Glas. Auflöslich in Wasser. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Kobaltoryd.... 28,2

Schwefelsäure .. 30,5

Wasser..... 41,3

100,0

Ein neues Erzeugniß; findet sich in alten Gruben mit Erzkobalt, Kobaltbeschlag, Arsenikblüthe und Barytspath zu Vieber im Hanauischen.

263. Speiskobalt.

Syn. Arsenik-Kobalt. Octaedrischer und Hexaedrischer Speiskobalt. Cobalt arsenical. Tin-white Cobalt.

Kerform: Würfel. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) enteckt, oft 3. Verschw. der Kanten; 3) desgl. 3. Verschw. der Kernflächen (Oktaeder); 4) entkantet; 5) desgl. und enteckt.

Krystalle, glatt, die P-Flächen häufig gebogen, auf-, selten eingewachsen, meist zu Drusen verbunden; baumsförmige, gestrickte Gestalten; Spiegel. Derbe Massen von körniger und dichter Zusammensetzung, eingesprengt.

Spaltbar parallel P, höchst unvollkommen, Spuren nach den Entdeckungs- und Entkantungs-Flächen. Bruch: uneben. Härte = 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 6,4 — 6,6. Undurchsichtig. Metallglanz. Zinnweiß bis lichte stahlgrau; zuweilen grau, gelb oder bunt angelassen. Strich: graulichschwarz.

B. d. L. auf Kohle entwickelt er starken Arsenikrauch und schmilzt zu einer graulichen Metallkugel. Mit Borax und Phosphorsalz gibt er blaue Gläser. Im Kolben gibt er arsenichte Säure. Auflöslich in erwärmter verdünnter Salpetersäure. Chem. Zusamm., nach L. Gmelin:

Kobalt. 27,6

Arsenik 72,4

100,0

Häufig mit etwas Eisen, Schwefel und Kupfer verunreinigt. Findet sich auf Gängen im älteren und neueren Gebirge, begleitet von Silber-, Kupfer-, Nickel- und anderen Erzen, von Quarz, Kalk- und Barytspath. Bieber und Riechelsdorf in Hessen; Schneeberg, Annaberg, Joachimsthal u. a. O. im Erzgebirge; Saalfeld und Glücksbrunn in Thüringen; Westerwald; Wittichen in Baden; Andreasberg am Harz; Drawicza und Dobschau in Ungarn; Dauphinée; Cornwall u. s. w.

Wird vorzüglich zur Smaltebereitung verwendet.

Anhang:

Faseriger Speiskobalt. Kugelige und nierenförmige Gestalten von dünnstängeliger bis faseriger Textur, derb von körniger Zusammensetzung. Spec. Gew. = 7,28. Zinnweiß ins Stahlgrau. Chem. Gehalt nach John: 28,00 Kobalt, 65,75 Arsenik, 6,25 Eisen- und Manganoxyd. Im Uebrigen stimmt er

mit dem Speiskobalt überein, dessen Vorkommen er auch theilt: Riechelsdorf, Bieber, Schneeberg u. s. w.

264. Kobaltblätthe.

nie-
phen

Syn. Arseniksaures Kobalt und Kobaltoryd. Prismatischer Kobalt-
Glimmer. Rother Erzkobalt. Cobalt arseniaté. Arseniate of Cobalt.

Kernform: schiefe rektanguläre Säule. $P||M = 124^{\circ} 51'$ und $55^{\circ} 9'$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseitet; 3) zweifach entseitet; 4) desgleichen und entzwey-
randet.

Krystalle, sehr klein, mit vertikaler Streifung auf den Seitenflächen, haar- oder nadelförmig; aufgewachsen, meist zu Drusen, oder stern- und büschelförmig gruppiert, traubige und nierenförmige Gestalten von strahliger bis faseriger Zusammensetzung; verb, traubig, als Ueberzug oder Anflug (Kobaltbeschlag).

Vollkommen spaltbar parallel den M-Flächen. Bruch: feinerdig bei manchen Varietäten. Härte = 2,5. Milde, in dünnen Blättchen etwas biegsam. Spec. Gew. = 2,9 — 3,1. Durchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Glas, auf den Spaltungsflächen Perlmutterglanz. Karmoisin-, karmin-, kochenill-, pfirsichblüthroth: rosenroth; röthlichweiß; grünlich. Strich: pfirsichblüthroth.

B. d. L. auf Kohle schmilzt sie unter Entwicklung von Arsenikdämpfen zu einer schwärzlichgrauen Metallkugel. Im Kolben gibt sie Wasser und färbt sich dunkler. Mit den Flüssen erhält man ein blaues Glas. Unlöslich in Salzsäure. Chem. Zusammf. nach v. Kobell:

Kobaltoryd... 39,97

Arseniksaure.. 40,84

Wasser... 19,19

100,00

Findet sich auf Lagerstätten von anderen Kobalterzen. Witten in Baden; Riechelsdorf und Bieber in Hessen; Annaberg und Schneeberg in Sachsen; Platten und Joachimsthal in Böhmen; Saalfeld und Glücksbrunn in Thüringen; Allemont in der Dauphinée; Cornwall; Concejo de Sabralas in Asturien u. s. w.

Wird, wosie in größerer Menge vorkommt, zur Fabrikation von Smalte erwendet.

haa

265. Glanzkobalt.

Syn. Kobaltglanz. Dodekaedrischer und hexaedrischer Kobaltkies, Cobalt gris. Bright white Cobalt.

Kernform: Pentagon-Dodekaeder. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entgipfelsantet (Fig. 221. pg. 345.); 3) dëßgl. z. Verschw. d. Kernflächen (Würfel); 4) entscheltelt z. Verschw. der Scheitellanten (Tetraeder); 5) dëßgl. z. Verschw. der Kernflächen; 6) entgipfelsantet und entteet (Fig. 222. pg. 345.); 7) dëßgl. z. Verschw. der Kernflächen (Cubo-Octaeder).

Krystalle, glatt, nur die Würfelflächen parallel den Gipfelsanten der Kernform gestreift, einzeln oder in kleinen Gruppen ein-, seltener aufgewachsen und zu Drusen verbunden; derb von körniger Zusammensetzung, eingesprengt.

Spaltbar parallel den Würfel-Flächen vollkommen. Bruch: unvollkommen muschelig bis uneben. Härte = 5,5. Spröde. Spec. Gew. = 6,1 — 6,3. Undurchsichtig. Metallglanz. Röthlich-, silberweiß; zuweilen röthlichgrau oder bunt angelausen, Strich: graulichschwarz.

B. d. L. auf Kohle gibt er einen starken arsenikalischen Rauch und schmilzt sodann zu einer grauen Kugel. In einer offenen Röhre gibt er arsenichte Säure und riecht nach schwefligter Säure. Mit Borax und Phosphorsalz erhält man blaue Gläser. In erwärmter Salpetersäure auflöslich. Chem. Zusammens. nach P. Smelin:

Kobalt .. 34,9

Arsenik. , 45,8

Schwefel. 19,3

100,0

Meißens mit etwas Eisen verunreinigt.

Auf Agern im älteren Gebirge; Tunaberg, Riddarhyttan und Håsanbo in Schweden; Skutterud in Norwegen; Querbach in Schlesien.

266. Erbkobalt.

Syn. Schwarzer und brauner Erbkobalt. Kobaltmalm. Kobalt oxyde. Earthy Cobalt.

Erdfige Massen von traubigen, kugeligen, röhren- und nierenförmigen Gestalten, verb., eingesprengt, als Ueberzug der Aufzug.

Bruch: erdig, zuweilen schmuschelig. Zerreiblich. Spec. Gew. = 2,0 — 2,24. Undurchsichtig. Matt. Blaulich, braunschwarz; auch leberbraun und gelb in unreinen Abänderungen. Strich: fettglänzend.

B. d. L. auf Kohle riecht er schwach nach Arsenik und schmilzt nicht. Mit Borax und Phosphorsalz wird er aufgelöst. und gibt blaue Gläser. Mit Soda auf Platinblech eine stark von Mangan gefärbte Masse hehend. Lösbar in Salpetersäure. Chem. Zusamm. nicht genau gekannt. Döbereiner's Analyse gab

Kobalt- und Mangan-Hyperoxyd 76,9

Wasser 23,1

100,0

Häufig mit Arsenik, Eisen, Kiesel- und Thonerde verunreinigt.

Findet sich unter denselben Verhältnissen, wie der Speiskobalt; zu Wittichen in Baden; Vieber und Nieldsdorf in Hessen; Saalfeld und Rammsdorf in Thüringen; Joachimsthal in Böhmen; Geyer in Tyrol; Kupferberg in Schlesien; Allemont in Frankreich; Spanien; England; Irland u. s. w.

XXXII. Gruppe. Nickel.

Kommt nicht rein und überhaupt selten in der Natur vor; mit Arsenik, Schwefel, Eisen, Antimon findet man es verbunden, auch als arseniksaures Oxyd und Hyperoxyd wird es getroffen.

Die hierher gehörigen Mineralien besitzen meistens eine Härte zwischen 3 und 5,5 und ihr spezifisches Gewicht übersteigt nicht 7,7. Undurchsichtig. Metallglanz. Gefärbt. Vor dem Löthrohre schmelzen die meisten; und sind in Salpetersäure oder Königswasser entweder vollkommen oder theilweise auflöslich zu einer lichte oder apfe. Flüssigkeit.

267. Schwefelnickel.

Syn. Haarkies. Gediegen-Nickel. Nickel natif. Native Nickel.

Krystallsystem wahrscheinlich rhomboedrisch. Krystalle, zart haarförmig, einzeln durcheinander oder zu nebartigen Geweben zusammengewachsen, auch zu D., wovon gruppirt.

Bruch: flachmuschelig. H. = 3,5; Spröde. Undurchsichtig. Metallglanz. Messing-, Stahlgelb, zuweilen graulich oder grünlichgrau, auch bunt angelauten.

B. d. L. auf Kohle gibt er ein zusammengefeuterte, geschmeidige und magnetische Masse, welche Nickel ist. Nach der Röhrung im offenen Feuer wird er vor Borax leicht zu einem dunkelgelben oder röthlichen Glase aufgelöst, das nach der Abkühlung lichte gelb oder beinahe farblos wird. In einer offenen Röhre riecht er nach schwefelichter Säure. In erwärmtem Königswasser zu einer grünlichen Flüssigkeit auflöslich. Chem. Zusammensetzung nach L. Gmelin:

Nickel... 64,4

Schwefel 35,6

100,0

Auf Gängen im älteren Gesteine mit Eisenkies, Kalkspath, Quarz, Hornstein u. Schutzbach im Sayn-Altenkirchischen; Grube Abendröthe zu Andreasberg am Harz; Johann-Georgenstadt in Sachsen; Joachimsthal in Böhmen; St. Austle in Cornwall.

268. Arseniknickel.

Syn. Kupfernickel. Nickelties. Prismatischer Nickelties. Nickel arsenical. Arsenical Nickel.

Kernform: angeblich gerade rhombische Säule.

Krystalle, höchst selten und sehr undeutlich; gewöhnlich verb oder eingesprengt, auch kugelige, traubige, nierenförmige, staudenförmige und gestrickte Gestalten, die selten Spuren von strahliger oder faseriger Textur zeigen. In.

Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 5 — 5,5. Spröde. Sp. Gew. = 7,5 — 7,7. Undurchsichtig. Metallglanz. Lichte kupferroth, häufig braun, grau oder schwärzlich angelauten. Strich: braunlichschwarz.

B. d. L. auf Kohle schmilzt es mit starkem Arsenikrauch zu einer spröden weißen Metallkugel. In einem offenen Röhre

geröstet gibt er viel weißes Arsenik und läßt eine gelblichgrüne Masse zurück. Nach der Röftung verhält er sich wie Nickeloryd, gibt aber zuweilen dem Glase blaue Färbung durch Kobalt. In concentrirter Säure beinahe vollkommen auflösbar zu einer apfelgrünen Flüssigkeit. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Nickel . . 43,3

Arsenik . 56,7

100,0

häufig mit etwas Kobalt, Eisen, Schwefel und Blei verunreinigt.

Findet sich auf Kobalt- und Silbererzgängen in älterem Gebirge: Schneeberg, Annaberg, Freiberg und Marienberg in Sachsen; Joachimsthal in Böhmen; Riechelsdorf und Bieber in Hessen; Wittichen und Wolfach in Baden; Saalfeld in Thüringen; Andreasberg am Harz; Schladming in Steyermark; Allemont in Frankreich; Cornwall; Sibirien u. s. w.

C. Hoffmann unterscheidet einen Arseniknickel von Schneeberg: derb; Bruch: uneben. Undurchsichtig. Metallglanz. Sinnweiß, häufig mit einem Ueberzug von arseniksaurem Nickel bedeckt. Die Analyse ergab:

Nickel . . . 28,14

Arsenik . . 71,30

Bismuth . 2,19

Kupfer . . 0,50

Schwefel . 0,14

102,27

269. Nickelocker.

Syn. Arseniksaures Nickel. Nickelblüthe. Nickel arséniate. Arseniate of Nickel.

Krystalle, haarförmig, derb, eingesprengt, als Ueberzug und Anflug.

Bruch: uneben, meist aber erdig. Weich; zerreiblich. Undurchsichtig. Matt. Apfel-, zeisiggrün; grünlichweiß. Strich: grünlichweiß.

B. d. L. auf Kohle riecht er stark nach ilzt
in der inneren Flamme zu einem arsenikhalt. Alforne.
Im Kolben gibt er Wasser und bekommt eine dunklere Farbe.
Auflöslich in Salpetersäure. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Nickeloryd . . .	37,1
Arsenikssäure .	38,8
Wasser	24,1
	<u>100,0.</u>

Durch Zersetzung aus Arsenik-Nickel hervorgegangen findet er sich auch meist mit diesem. Richelsdorf und Bieber in Hessen; Wittichen in Baden; Saalfeld in Thüringen; Schneeberg und Annaberg in Sachsen; Allevard in Frankreich; Cornwall; Schottland; Sibirien u. s. w.

270. Nickelglanz.

Syn. Weißes Nickelerz, Arsenik-Schwefelnickel

Kernform: Würfel. Außer diesem soll noch die Entdeckung vorkommen.

Kryrstalle, selten und meist undeutlich; häufiger derbe Massen mit blätteriger Textur.

Spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: uneben. Härte = 5,5. Spröde. Sp. Gew. = 6,09 — 6,13. Undurchsichtig. Metallglanz. Lichte bleigrau ins Zinnweiße, oft bunt angelauten. Strich: unverändert.

B. d. L. im Kolben decrepitirt er und gibt beim Glühen zuweilen viel Schwefelarsenik; die geglühte Perle hat das Ansehen von Arseniknickel und zeigt mit den Flüssigkeiten dieselbe Reaction. Löslich in Salpetersäure mit Hinterlassung eines Rückstandes. Chem. Zusamm. nach v. Kobell:

Nickel . . .	35,51
Arsenik . .	45,16
Schwefel	<u>19,33</u>
	100,00

Meist mit Eisen, auch mit Kobalt verunreinigt. Mit Nickelocker zu Loos in Helsingland in Schweden; angeblich auch auf der Grube Albertine bei Harzgerode am Harz vorkommend.

271. Nickel-Antimonglanz.

Syn. Nickel-Spießgläserz. Nickel-arsénical antimonifère. Nickel-Antimonial-Ore.

Kernform: Würfel; außer diesem sind neuerdings Cubo-Octaeder und Octaeder beobachtet worden.

Krystalle, sehr selten; gewöhnlich berbe Massen mit blätteriger Textur, eingesprengt.

Spaltbar parallel den Kernflächen vollkommen. Bruch: uneben. Härte = 5. Spröde. Sp. Gew. = 6,3 — 6,5. Undurchsichtig. Metallglanz. Bleigrau ins Stahlgraue, zuweilen schwarzlichbleigrau oder eisenschwarz angelaufen. Strich: graulichschwarz.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er und raucht sehr stark. In einer offenen Röhre gibt er starken Antimonrauch und einigen Geruch nach schweflichter Säure. Mit Borax zu einem dunkelolivengrünen Glase schmelzend, das häufig Reaction von Kobalt zeigt. Das Pulver wird von Salpetersäure unter Entwicklung rother Dämpfe und Ausscheidung von Schwefel, Antimonoryd und arsenichter Säure aufgelöst. Chem. Zusammf. nach L. Gmelin:

Nickel . . .	28,9
Antimon .	42,5
Schwefel	16,0
Arsenik . .	12,6
	<hr/> 100,0

Enthält häufig Spuren von Kobalt und Silber. Findet sich auf Eisenstein- und Bleierzgängen in mehreren Gruben, namentlich bei Gosensbach, Eisern, Willensdorf, auf dem Westerwalde; Haueisen im Reußischen.

XXXIII. Gruppe. Kupfer.

Kommt häufig in der Natur vor, und zwar theils gediegen, theils oxydirt, und in diesem Zustande mit verschiedenen anderen Stoffen verbunden, ferner findet man es oft als Schwefelkupfer, für sich oder mit andern Schwefelmetallen vereinigt u. s. w.

Das spezifische Gewicht der Mineralien dieser Gruppe übersteigt, mit Ausnahme das des gediegenen Kupfers, nicht 6,1; die Härte der meisten steht zwischen 2 und 4. Sie sind in der Regel gefärbt. Vor dem Löthrohre geben sie entweder für sich oder

nach dem Schmelzen mit Borax und Soda ein geschmeidiges Kupferhorn; in Salpetersäure sind sie entweder vollkommen oder theilweise auflöslich.

272. Gebiegen-Kupfer.

Syn. Octaedrisches Kupfer. Cuivre natif. Native Copper.

Kernform: Würfel. Vorkommende Gestalten; 1) Kernform. 2) enteckt (Cubo-Octaeder); 3) beßgl. 3. Verschw. der Kernflächen (Octaeder); 4) entkantet; 5) beßgl. 3. Verschw. der Kernflächen (Rautendodekaeder); 6) Zwillinge.

Krystalle, selten, meist undeutlich und sehr verzerrt, verzogen und verdrückt, durcheinandergewachsen und auf vielfache Weise gruppirt; ästig, zackig, baum-, stauden-, moos-, drahtförmig, in Platten, angeflogen, verb, eingesprengt in eckigen Stücken und Körnern.

Bruch: hackig. Härte = 2,5 — 3. Dehnbar und geschmeidig. Sp. Gew. = 8,4 — 8,9. Undurchsichtig. Metallglanz. Kupferroth, meist gelblich oder braunlich angelauten. Strich: Kupferroth mit erhöhtem Glanze.

B. d. L. auf Kohle zu einer Kugel schmelzbar, die sich beim Erkalten mit schwarzem Dryd überzieht. In concentrirter Salzsäure unter Brausen und Entwicklung rother Dämpfe zur blauen Flüssigkeit auflösbar. Im reinsten Zustande nur aus Kupfer bestehend.

Findet sich auf Gängen und Lagern in den Gebirgen fast aller Formationen, begleitet von anderen Kupfererzen, Brauneisenstein, Bleiglanz, Quarz, Kalkspath etc. Rheinbreitbach, unfern Neuwied; Siegen, Eisersfeld, Neunkirchen und Grube Käufersteimel auf dem Westerwald; Ramsdorf in Thüringen; Kupferberg in Schlesien; Libethen und Einsiedel in Ungarn; Schottische Inseln; Naalsöe, Sandöe u. a. Faröer; viele Kupfergruben in Norwegen und Schweden; St. Bel unfern Lyon; Spanien; Sibirien; China; Japan; New-Haven und Wallingsford in Connecticut; Hudsonsban; Kanada; in den zuletzt genannten Gegenden kommen zuweilen lose Blöcke Gebiegen-Kupfers bis zu 200 Pfund schwer und darüber vor.

Das Kupfer ist ein Metall, welches auf vielfache Weise

verwendet wird; selten kommt es jedoch in so großen Massen gebiegen vor, daß es sogleich durch bloßes Einschmelzen gutgemacht werden könnte; das meiste wird durch Rösten und mehrmaliges Schmelzen aus anderen Kupfererzen gewonnen. Der allgemeinste Gebrauch ist der zu Scheidemünzen; ferner benutzt man es zu Geschirren verschiedener Art, in Plattenform zum Beschlagen von Schiffen, zum Decken von Gebäuden, zum Kupferstechen u., zu Hochstempeln in Pulvermühlen und zahllosen andern Gegenständen. Das Kupfer bildet die Grundmasse mehrerer höchst wichtiger Metall-Lagerungen, wie z. B. mit Zinn das Stütz- und Glockengut, mit Zink das Messing und Prinzmetall; mit Messing und Zinn das Tombak, mit Arsenik das Weißkupfer u. s. w.

275. Roth-Kupfererz.

Syn. Kupferoxydul. Octaedrisches Kupfererz. Cuivre oxydulé. Oxydulated Copper.

Fig. 237.



Kernform: regelmäßiges Octaeder.

Vorkommende Gestalten: 1) Kernform: zuweilen tafelförmig verküßt, oder spitz rhomboedrisch verlängert; 2) enteckt; 3) beßgl. z. Versch. der Kernflächen (Würfel); 4) entkantet; 5) beßgl. zum Versch. der Kernflächen (Rauten-Dodekaeder); 6) entkantet und enteckt; 7) beßgl. z. Versch. der Kernflächen; 8) zweifach entkantet, Fig. 237; 9) vierfach entseittelt in der Richtung der Flächen u. s. w.

Kristalle, glatt und glänzend, zuweilen mit einem Ueberzug von Malachit (manchmal ganz in Malachit umgewandelt), selten einzeln ein- oder aufgewachsen, meist zu Drusen verbunden und treppenartig gruppiert; haarförmig (haarförmiges Roth-Kupfererz, Kupferblüthe); verb. nierenförmig, zerfressen, eingesprenkt, angeflogen (dichtes Roth-Kupfererz); erdig.

Spaltbar parallel den Kernflächen, ziemlich vollkommen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 3,5 — 4. Spröde. Sp. Gew. = 5,7 — 6,0. Halbdurchsichtig bis undurchsichtig. Metallähnlicher Diamantglanz. Cochenill-, auch karminroth, ins Graue und Braune geneigt. Strich: braunlichroth.

B. d. L. die Flamme schwach grün, mit Salzsäure befeuchtet schön blau färbend; auf Kohle erst schwarz werdend und dann zu einem Kupferkorne schmelzend. In Salpeter- und Salzsäure leicht auflöslich. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Kupfer 88,88

Sauerstoff . . 11,12

100,00

Findet sich auf Gängen, Lagern und liegenden Stöcken in älteren und neueren Gebirgen; begleitet von anderen Kupfererzen, Braun-Eisenstein, Quarz &c. Käuserjicimel und andere Gruben im Siegen- und Sayn'schen auf dem Westerwalde; Rheinbreitbach in Rhein-Preußen; Einsiedel, Dognaczka und Moldawa in Ungarn; Chessy bei Lyon; Cornwall; Ekatharinburg u. v. a. D. in Sibirien u. s. w.

Gibt ein Kupfer von vorzüglicher Güte.

Anhang:

Ziegelerz.

Syn. Kupfer-Neckerz. Cuivre oxyde ferrifère. Tile Ore.

Ein mehr oder minder inniges Gemenge aus erdigem Roth-Kupfererz und Eisenocker. Verb, eingesprengt, als Ueberzug und Anflug, erdig. Matt. Undurchsichtig. Ziegelroth; gelblich, röthlichbraun, ins Graue und Schwarze.

Kommt unter ähnlichen Verhältnissen wie Roth-Kupfererz und meist mit diesem vor. Ripoldsau in Baden; Dillenburg in Nassau; Falkenstein und Ringwechsel in Tyrol; Kammsdorf, Saalfeld und Sangershausen in Thüringen; Lauterberg am Harz; Steyermark; Ungarn; Sibirien u. s. w.

Wird zum Ausbringen des Kupfers benutzt.

274. Kupferschwarze.

Syn. Cuivre oxydé noir. Black oxide of Copper.

Erdige Massen, zuweilen mit nieren- und traubensförmiger Oberfläche, häufiger als Ueberzug oder Anflug.

Bruch: erdig. Undurchsichtig. Matt. Blaulich, braunlich-schwarz; braunlich. Strich: unverändert.

B. d. L. zu einem Kupferkorne reducirbar. In Salpeter- und in Salzsäure auflöslich. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Kupfer	80
Sauerstoff . .	20
	<hr/> 100

Ist selten rein, meist mit Eisen- und Manganoryd gemengt.

Findet sich mit anderen Kupfererzen, zumal mit Kupferkies, ferner mit Quarz, Barytspath etc. Schapbach in Baden; Rheinbreibach; Lauterberg am Harz; Saalfeld in Thüringen; Freiberg in Sachsen; Kupferberg- und Rudolstadt in Schlesien; Schwaz in Tyrol; Niedzianagora in Galizien; Schlangenbergr in Sibirien u. s. w.

275. Salzsaures Kupfer.

Syn. Atacamit. Salzkupfererz. Cuivre muriaté. Muriate of Copper.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M || M = 112^{\circ} 45'$ und $67^{\circ} 15'$. Vorkommende Gestalten: 1) enteckt; 2) beßgl. z. Verschw. der Kernflächen (Rektangulär-Oктаeder); 3) entspizect zur Schärfung über P und entschärffect; 4) entstumpffect, zweifach entstumpffect und entspizect z. Verschw. der scharfen Seiten u. s. w.

Krystalle, selten, die Seitenflächen vertikal gestreift, oft nadel- oder haarförmig, zu Drusen verbunden; gewöhnlich strahlig-blätterige Massen; auch derb, nierenförmig, traubig, tropfsteinartig; eingesprengt angeflögen.

Spaltbar parallel den Kernflächen, deutlicher in der Richtung der Entschärffectung. Bruch: uneben. Härte = 3 — 3,5. Wenig spröde. Sp. Gew. = 4,0 — 4,4. An den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Glasglanz, zuweilen fettartig. Gras-, smaragd-, lauch-, oliven-, schwärzlichgrün. Strich: apfelgrün.

B. d. L. färbt es die Flamme stark blau mit grünen Ranten; auf Kohle schmilzt es, wird reducirt und gibt ein von Schlacke umgebenes Kupferkorn. Im Kolben gibt es salzsaure Dämpfe und Wasser. Leicht auflöslieh in Salpetersäure. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:


Kupferoxyd .	71,62
Salzsäure . .	16,29
Wasser	12,09
	<hr/> 100,00

Auf Gängen mit Quarz, Chalkedon, anderen Kupfererzen u. zu Remolinos, Soledad u. a. D. in Chili; auf Silbererz-Gängen im Distrikte Tarapaka in Peru; Schwarzenberg in Sachsen. — Als Ueberzug und Anflug auf Wänden der Spalten vesuvischer Laven, besonders häufig bei den Strömen von 1804, 1805, 1820 und 1822; tropfsteinartig und traubig auf der Lava vom Monti Rossi bei Nicolosi am Aetna.

276. Kupferglanz.

Syn. Prismatischer oder rhombischer Kupferglanz. Kupferglas. Cuivre sulfuré. Sulphuret of Copper.

Fig. 238.



Kernform: gerade rhombische Säule. $M || M = 119^{\circ} 35'$ und $60^{\circ} 25'$. Vorkommende Gestalten: 1) entscharfseitig (n), Fig. 238. 2); desgl. ent-

randet und enteckt (ähnlich einer entrandeten sechsseitigen Säule); 3) entrandet und enteckt z. Versch. der Kernflächen (ähnlich einem Bipyramidal-Dodekaeder; 4) entscharrfseitig, entspißect und zweifach entrandet; 5) Zwillinge.

Krystalle, tafels oder kurz säulenartig, glatt; die P-Flächen häufig gestreift, einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden; derb, drahtförmig, ästig, knollig, in Platten, eingesprengt; selten als Vererzungs-Mittel von Pflanzentheilen.

Vollkommen spaltbar parallel den Seitenflächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 2,5 — 3. Sehr milde. Sp. Gew. = 5,5 — 5,7. Undurchsichtig. Metallglanz. Schwärzlich-bleigrau; stahlgrau ins Eisenschwarze; zuweilen blau oder grünlich angelauten. Strich: schwarz.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er in der äußern Flamme leicht mit Kochen und Spritzen, in der innern umgibt er sich mit einer Rinde und schmilzt nicht mehr. In der offenen Röhre gibt er schweflichte Säure und wird geröstet. Der Rückstand gibt mit Soda und Borax ein Kupferkorn. Lösbar in erwärmter Salpetersäure mit Hinterlassung von Schwefel. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kupfer ... 80

Schwefel .. 20

100

Häufig mit Eisen verunreinigt.

Findet sich auf Gängen und Lagern mit Kupfer- und Eisenerzen. Redruth in Cornwall; Siegen; Frankenberg in Hessen, hier als Vererzungs-Mittel; Freiberg und Gießhübel in Sachsen; Kupferberg und Rudolfsstadt in Schlessen; Saalfeld und Maassfeld in Thüringen; Kapnik und Szaska in Ungarn; Kongsberg und Arendal in Norwegen; Sibirien u. s. w.

Wird zum Ausbringen des Kupfers benutzt.

277. Kupferindig.

Syn. Covellit.

Derb, nierenförmig, kugelig, in Platten, als rindenartiger Ueberzug, in eingewachsenen rundlichen Stücken, eingesprengt.

Bruch: flachmuschelartig ins Unebene, auch erdig. Härte = 1,5. Milde. Sp. Gew. = 3,8. Undurchsichtig. Wenig und fettglänzend bis matt. Indigblau, schwärzlichblau, schwarz. Strich: unverändert.

B. d. L. auf Kohle brennt er mit blauer Flamme und verbreitet einen Geruch nach schweflichter Säure. Die geröstete Masse schmilzt unter Aufwallen und stößt glühende Tropfen aus; mit Soda gibt sie ein Kupferkorn. Lösbar in Salpetersäure. Chem. Zusams. nach v. Kobell:

Kupfer ... 66,3

Schwefel.. 33,7

100,0

Findet sich mit anderen Kupfererzen zu Sangershausen in Thüringen; Badenweiler und Schapbach in Baden; Langenau in Salzburg. — In manchen Lavaarten des Vesuv.

278. Brochantit.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M || M = 117^\circ$ und 63° . Die Gestalt, welche bis jetzt beobachtet wurde, ist enteckt zur Schärfung über den Seiten.

Krystalle, klein, glatt, aufgewachsen.

Spaltbar parallel den M-Flächen. Härte = 3,5. Sp. Gew. = 3,78 — 3,87. Durchsichtig. Glasglanz. Smaragdgrün.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er und reducirt sich zu einem Kupferkorne. Im Kolben gibt er Wasser. Unauflöslich in Wasser; lösbar in Säuren. Chem. Zusams. nach v. Kobell (a), Analyse von Magnus (b)

	a	b
Kupferoxyd ..	63,94	66,935
Schwefelsäure	21,55	17,426
Wasser	14,51	11,917
	100,00	Zinnoryd 3,145
		Bleioryd 1,048
		100,471

Mit Malachit und Roth-Kupfererz zu Ekatharinburg in Sibirien; mit Bleiglanz und Kupfererzen zu Rezbanya in Ungarn.

279. Kupfer-Vitriol.

Syn. Schwefelsaures Kupferoxyd. Blauer Vitriol. Tetartoprisma-
tisches Vitriolsalz. Cuivre sulfate. Sulphate of Copper.

Kernform: schiefe rhomboidische Säule. $M || T = 124^{\circ} 2'$ und $55^{\circ} 58'$; $P || M = 109^{\circ} 32'$ und $70^{\circ} 28'$; $P || T = 128^{\circ} 37'$ und $51^{\circ} 23'$. Die abgeleiteten Gestalten sind Erzeugnisse chemischer Kunst.

Tropfsteinartig, nierenförmig, zellig, zählig, als Ueberzug und Anflug, verb, eingesprengt.

Unvollkommen spaltbar nach den Seitenflächen. Bruch: muschelig. Härte = 2,5. Wenig spröde. Sp. Gew. = 2,19 — 2,3. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Dunkel himmelblau, berlinerblau, ins Spangrüne. Strich: blaulichweiß. Geschmack höchst widerlich zusammenziehend.

B. d. L. färbt er die Flamme grün, wird erst weiß, bläht sich etwas auf, schmilzt dann, wird schwarz und reducirt sich mit Geräusch zu einem Kupferkorn. Im Kolben gibt er Wasser. Auflöslich in Wasser. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Kupferoxyd ...	32
Schwefelsäure .	32
Wasser	36
	100

Kommt als secundäres Gebilde, entstanden durch Zersetzung von Kupferkies, in Höhlungen, Klüften und alten Grubenbauen vor. Rammelsberg bei Goslar am Harz; Grube alte Mahlscheid im Siegenschen; Herrngrund in Ungarn; Mählsbach in Salzburg; Klausen in Tyrol; Linzen in Graubünden; Insel Anglesia; Fahlun in Schweden; Gruben des Rio tinto in Spanien; Sibirien 2c. Auch aufgelöst in manchen Grubenwässern (Cämentwässern): Ungarn, Cornwall, Spanien u. s. w. Durch hineingebrachtes Eisen wird das Kupfer aus demselben gefällt.

Der im Handel vorkommende Kupfer-Bitriol ist meist künstlich bereitet und wird vorzüglich in der Färberei angewendet.

280. Selenkupfer.

Syn. Cuivre sélénié. Seleniuret of Copper.

Baumförmig und angeflogen, verb.

Weich, geschmeidig. Metallglanz. Silberweiß. Strich: glänzend.

B. d. L. auf Kohle, unter Entwicklung starken Selen-Geruchs, zu einer grauen, etwas geschmeidigen Kugel fließend. In der Röhre Selen und Selen Säure gebend. Nach langer Röstung erhält man hierauf mit Soda ein Kupferkorn. Chem. Zusamm. nach v. Kobell:

Kupfer 64,54

Selen. 38,46

100,00

Mit Kalkspath auf der Strickerums-Grube in Småland.

281. Rhombisches Phosphorkupfer.

Syn. Oktaedrisches phosphorsaures Kupfer. Diprismatischer Oliven-Malachit. Cuivre phosphaté z. Th. Phosphate of Copper.

Kernform: rektanguläres Oktaeder. $P || P = 95^{\circ} 2'$; $M || M = 111^{\circ} 58'$; $M || P = 112^{\circ} 12'$. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform, häufig verlängert in der Richtung des Längenrandes; 2) zweifach entrandet in der Richtung des Längenrandes; 3) beßgl. und entlängenrandet.

Krystalle, glatt, die P.-Flächen zuweilen gestreift, einzeln aufgewachsen, häufiger zu Drusen verbunden; kugelig, nierenförmig.

Spaltbar parallel dem Rande und der Entseitungsfläche, unvollkommen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 3,5 — 4. Spröde. Sp. Gew. = 3,6 — 3,8. Durchscheinend, häufig nur an den Ranten. Fett- oder Glasglanz. Olivengrün ins Schwärzliche; berg-, pistaziengrün. Strich: gelblichgrün.

B. d. L. auf Kohle leicht und mit Kochen zu einer stahlgrauen Kugel schmelzend, die ein Kupferkorn einschließt. Schmilzt man diese Kugel mit Blei zusammen, so bekommt man um das Kupferkorn beim Abkühlen krystallisiertes phosphorsaures Bleioxyd. Auflöslich in Salpetersäure. Chem. Gehalt nach Berthier:

Kupferoxyd ... 63,9

Phosphorsäure. 28,7

Wasser..... 7,4

100,0

Das berbe Phosphorkupfer enthält etwas Kohlensäure und Eisenoxyd.

Auf Quarz zu Libethen bei Neusohl in Ungarn; angeblich auch in Cornwall.

282. Klinorhombisches Phosphorkupfer.

Syn. Prismatisches phosphorsaures Kupfer. Prismatischer Habrohem-Malachit. Cuivre phosphaté z. Th. Hydrous phosphate of Copper.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M || M = 38^\circ 56'$ und $141^\circ 4'$; $P || M = 92^\circ$ und 88° ungefähr. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform (selten); 2) entmittelseitet; 3) desgl. und entspißect; 4) entmittelseitet, entspißect und entstumpfrandet; 5) entstumpfrandet z. Schärfung; u. s. w.

Krystalle, glatt, zuweilen auch drusig, rauh und uneben, die P.-Fläche häufig konver gebogen, selten einzeln aufgewachsen, meist zu Drusen gruppiert; traubige, nierenförmige und kugelige Gestalten, mit drusiger Oberfläche und blätteriger oder büschelförmig-strahliger bis faseriger Textur (blätteriges und faseriges phosphorsaures Kupfer); verb, eingesprengt, erdig, angeflogen (erdiges phosphors. Kupfer).

Spaltbar parallel P und den Entmittelseitungs-Flächen.

Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 4,5 — 5. Spröde. Sp. Gew. = 4,1 — 4,3. Durchscheinend bis undurchsichtig. Glasglanz, häufig fettartig. Dunkelspan-, schwärzlich-, pistazien-, smaragdgrün. Strich: spangrün.

B. d. L. und gegen Säuren verhält es sich wie die vorhergehende Species. Chem. Zusamsf. nach v. Kobell (a), Analyse von Lüne (b).

	a	b
Kupferoxyd . . .	63,01	62,847
Phosphorsäure	22,69	21,687
Wasser	14,30	15,454
	<u>100,00</u>	<u>99,988</u>

Findet sich mit Quarz, Chalcodon, Malachit und Roth-Kupfererz auf einem Lager im Grauwacke-Gebirge zu Birneberg bei Rheinbreitbach in Rhein-Preußen.

283. Erinit.

Derbe, concentrisch-schalige Ueberzüge, mit rauher, durch die Enden ungemein kleiner Krystalle gebildeter, Oberfläche.

Spuren von Theilbarkeit. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 4,5 — 5. Spröde. Sp. Gew. = 4,043. An den Kanten etwas durchscheinend. Matt, auf Bruchflächen Fettglanz. Smaragd-, grasgrün. Strich: apfelgrün.

Chem. Zusamsf. nach v. Kobell (a), Analyse von Turner (b).

	a	b
Kupferoxyd . . .	59,82	59,44
Arseniksfäure ..	34,75	33,78
Wasser	5,43	5,01
	<u>100,00</u>	<u>1,77 Thonerde</u>
		<u>100,00</u>

Mit Olivenit zu Limerick in Irland vorkommend.

284. Kupferglimmer.

Syn. Rhomboedrischer Euchlorglimmer. Cuivre arseniaté lammelliforme. Rhomboidal Arseniate of Copper.

Kernform: Rhomboeder. $P \parallel P = 68^\circ 41'$ über den Scheitellanten; $= 111^\circ 19'$ über den Randlanten. Vorkommende Gestalten: 1) entscheltelt z. Verschwinden der Scheitellanten; 2) beßgl. und entrandet; 3) dreifach entscheltelt.

Kryskalle, stets dünne tafellartig, einzeln aufgewachsen oder büschel- und garbenförmig gruppiert, auch zu Drusen verbunden; kryskallinische Massen mit kornigblättriger Textur.

Vollkommen spaltbar parallel den Entscheltelungsflächen; Spuren nach P. Härte = 2. Milde. Sp. Gew. = 2,5 — 2,6. Durchsichtig bis durchscheinend. Diamantartiger Glasglanz, auf den vollkommenen Spaltungsflächen Perlmutterglanz. Smaragd- bis spangrün.

B. d. L. heftig decrepitirend, und sich zu Pulver umwandelnd, das die Flamme grün färbt und unter Entwicklung von Arsenik-Geruch zu einer graulichen spröden Metallkugel, welche mit Soda ein Kupferkorn gibt. Leicht auflöslich in Salpetersäure; Eisen fällt aus der Flüssigkeit metallisches Kupfer. Ch. Zusams. nach L. Gmelin:

Kupferoxyd ...	58,8
Arseniksäure ...	21,3
Wasser	19,9
	<hr/> 100,0


Findet sich mit anderen Kupfererzen zu Redruth in Cornwall.

285. Linfenerz.

Syn. Prismatischer Sirokon-Malachit. Cuivre arseniaté en octaédres obtus. Octohedral Arseniate of Copper.

Fig. 239.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M \parallel M = 119^\circ 20'$ und $60^\circ 40'$. Eine der gewöhnlich vorkommenden Gestalten ist: entstumpft (o) z. Schärfung über P., Fig. 239.



Kryskalle, klein, glatt, die Seitenflächen vertikal gestreift, auf- und durcheinander gewachsen, auch zu Drusen verbunden; selten derb von korniger Zusammensetzung, eingesprengt.

Spaltbar parallel den M- und o-Flächen. Bruch: uneben.

Härte = 2,5. Wenig spröde. Sp. Gew. = 2,9 — 3,0. Halb durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Himmelblau bis spangrün. Strich: unverändert, aber lichte.


B. d. L. nicht verknüpfend; auf Kohle mit etwas Aufwallen und unter Entwicklung von Arsenik-Geruch zu einer braunlich-schwarzen Schlacke fließend. Mit Borax zu einer dunkel grasgrünen, gestreiften Glasperle, die im Innern Kupferförmer enthält. Im Kolben Wasser gebend. Auflöslich in Salpetersäure; Eisen fällt metallisches Kupfer. Chem. Zusamm. nach L. Smelin:

Kupferoxyd . . .	50,9
Arseniksäure . . .	14,8
Wasser	34,3
	<hr/> 100,0

Findet sich auf Kupfererz-Gängen mit Olivenit, Kupferies, Quarz u. zu Redruth in Cornwall und Herrengrund in Ungarn.

286. *E u c r o i t.*

Fig. 240.



Kernform: gerade rhombische Säule. $M || M = 117^{\circ} 20'$ und $62^{\circ} 40'$. Vorkommende Gestalten: 1) zweifach entschärft (l) und entspißet (n); 2) fünffach entschärft (s l k) und entspißet; Fig. 240.

Krystalle, die Seitenflächen vertikal gestreift, die P-Flächen häufig zugerundet, aufgewachsen.

Spaltbar parallel den P- und n-Flächen. Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 3,5 — 4. Wenig spröde. Sp. Gew. = 3,35 — 3,45. Halb durchsichtig bis durchscheinend. Glasglanz. Smaragdgrün; außen häufig lauchgrün. Strich: lichte apfelgrün.

B. d. L. auf Kohle wird er mit Detonation zu weißem Arsenikkupfer reducirt. Im Kolben Wasser gebend. Leicht auflöslich in Salpetersäure; Eisen fällt aus der Flüssigkeit metallisches Kupfer. Chem. Zusamm. nach v. Kobell:

Kupferoxyd	47,1
Arseniksäure . . .	34,2
Wasser	18,7
	<hr/> 100,0


In quarzigem Glimmerschiefer zu Eibethen in Ungarn.

287. Olivenit.

Syn. Prismatischer Oliven-Malachit. Cuivre arseniaté en octaédres aigus. Right prismatic Arseniate of Copper.

Fig. 241.

Kernform: gerade rhombische Säule.
 $M \parallel M = 110^{\circ} 50'$ und $69^{\circ} 10'$. Vorkommende
 Gestalten: 1) entstumpftseitig (n) und entspitzt
 (e) 3. Schärfung über P, Fig. 241; 2) enteckt
 und entschärfseitig.



Krysalte, klein, säulenartig, haar- und nabelförmig, häufig
 gekrümmt und uneben, die Seitenflächen vertikal gestreift, einzeln
 aufgewachsen oder zu Drusen, Büscheln und sammetartigen Ueber-
 zügen verbunden (Olivenitspath); kugelige, traubige und
 nierenförmige Gestalten mit drusiger Oberfläche und faseriger Tex-
 tur (Faser-Olivenit), selten derb, erdig, angeflögen, als
 Ueberzug (Olivenit-Erde).

Spaltbar parallel den M- und e-Flächen. Bruch: uneben bis
 muschelig. Härte = 3. Spröde. Sp. Gew. = 4,2 — 4,4. Durch-
 scheinend, häufig nur an den Kanten. Glasglanz, zuweilen seiden-
 oder fettartig. Oliven-, lauch-, pistazien-, zeisig-, schwärzlichgrün, ins
 Strohgelbe, Indigblaue und Braune. Strich: gleichfarbig, aber lichter.

B. d. L. leicht schmelzend und beim Abkühlen auf der Ober-
 fläche mit prismatischen Krysalten sich bedeckend. Auf Kohle mit
 Detonation und unter Entwicklung starken Arsenik-Geruchs zu
 einer bräunlichen Schlacke. Im Kolben Wasser gebend. Leicht
 auflöslich in Salpetersäure; Eisen fällt metallisches Kupfer. Ch.
 Gehalt nach v. Kobell:



Kupferoxyd ..	56,43
Phosphorsäure	3,36
Arseniksäure..	36,71
Wasser	3,50
	<hr/> 100,00

Auf Kupfererz-Gängen mit anderen Kupfererzen zu Redruth
 in Cornwall; Rheinbreitbach.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M || M = 99^{\circ} 32'$ und $80^{\circ} 28'$. $P || M = 91^{\circ} 47' 38''$ und $88^{\circ} 12' 22''$ (Mohs). Vorkommende Gestalten: 1) entstumpfrandet (k) (Fig. 242 ohne l); 2) beßgl. und entseitenect (l), Fig. 242; 3) entrandet (k und x), entmittelseitet (s) und entspißect (a), Fig. 243; 4) entrandet, entmittelseitet und dreifach entspißect; 5) entstumpfrandet, entmittelseitet, dreifach entspißect, entstumpfect und zweifach entseitenect u. s. w.

Fig. 242.

Fig. 243.



Krystalle, meist kurz säulen- oder dick tafelartig, selten kurz haarförmig und dann einen sammetartigen Ueberzug bildend (Kupfersammet erz), glatt, die P- und s-Flächen häufig gestreift, manche andere Flächen zuweilen rauh oder uneben, einzeln aufgewachsen, meist aber zu Drusen oder Gruppen verbunden, kugelige, traubige, nierenförmige und knollige Gestalten mit strahlig-blättriger Textur (strahlige und blättrige Kupferlasur), verb, eingesprengt; auch staubartige Theile, mehr oder minder fest verbunden, verb, kleintraubig, als Ueberzug oder Anflug.

Spaltbar parallel M, aber undeutlich, vollkommen nach der zweiten Entseitenectungs-Fläche. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 3,5 — 4. Spröde. Sp. Gew. = 3,7 — 3,9. Durchscheinend bis undurchsichtig. Glasglanz, zuweilen Diamantartig. Lasur-, berliner-, indig-, schwärzlich-, smalteblau. Strich: smalteblau.

W. d. L. und gegen Säuren verhält sie sich wie Malachit. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kupferoryd ... 69,4

Kohlensäure ... 25,4

Wasser 5,2

100,0

Auf Gängen und Lagern im älteren und neueren Gebirge mit anderen Kupfererzen, mit Eisen- und Bleierzen, Quarz etc.

Cheffy bei Lyon; Ripoldsau in Baden; Freudenstadt in Württemberg; Dillenburg; Thalitter; Gayer, Rogel, Sterzing, Ringenwechsel und Falkenstein in Tyrol; Beltsch in Steyermark; Saalfeld und Ramsdorf in Thüringen; Szaska, Schmölitz, Drawicza und Moldawa in Ungarn; Schlessen; Kolhwan und Ekatharinenburg in Sibirien; Schottland u. s. w.

Wird zum Ausbringen des Kupfers verwendet.

290. Kupferschaum.

Syn. Prismatischer Euklor-Glimmer.

Kernform: gerade rhombische Säule. Außer dieser soll auch die Entscharrseitung vorkommen.

Krytalle, sehr selten, glatt, auf den Seitenflächen häufig horizontal gestreift, krystallinische Massen, derb in nierenförmigen und traubigen Gestalten mit drusiger Oberfläche und von strahlig-blätteriger Zusammensetzung, angezogen, eingesprengt.

Vollkommen spaltbar parallel der P-Fläche. Härte = 1,5. Sehr milde; in dünnen Blättchen biegsam. Sp. Gew. = 3,098. Durchscheinend, häufig nur an den Kanten. Perlmutterglanz. Apfel-, spangrün, zuweilen ins lichte himmelblaue. Strich: lichte spangrün.

B. d. L. verknistert er stark, wird schwarz und schmilzt zu einer stahlgrauen Perle; auf Kohle unter Entwicklung von Arsenik-Geruch zur grauen Schlacke, aus welcher sich regulinische Kupferkörner ausscheiden. Im Kolben Wasser gebend. Leicht auflöslich mit Brausen in erhitzter Salpetersäure; Eisen fällt metallisches Kupfer aus der Auflösung. Chem. Gehalt nach v. Kobell:

Kupferoxyd 43,88

Arseniksäure 25,01

Kohlensaurer Kalk 17,46

Wasser 13,65

100,00

Auf Lagern und Gängen: Falkenstein, Schwab, Ringenwechsel, Rogel und Gayer in Tyrol; Saalfeld in Thüringen; Libethen in Ungarn; Campiglia unfern Piombino in Italien; Matlock in Derbyshire.

Bismuth und Kupferkies, auch auf Kobaltgängen: Gräben Neuglück bei Wittichen und Daniel im Gallenbach in Baden.

294. Zinnkies.

Syn. Schwefelkupferzinn. Etain sulfuré. Sulphuret of Tin.

Kernform: Würfel.

Krysalle, selten deutlich, aufgewachsen; verb, eingesprengt. Spuren von Spaltbarkeit parallel den Kern- und den Entkantungsf lächen. Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 4 — 4,5. Spröde. Sp. Gew. = 4,35. Undurchsichtig. Metallglanz. Stahlgrau ins Messinggelbe, außen gelb angelauten. Strich: schwarz.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er, setzt Zinnoryd als weißen Beschlag ab und gibt ein graues sprödes Metallkorn. In einer offenen Röhre riecht er nach schweflichter Säure und setzt einen dicken weißen Rauch ab. Die geröstete Probe mit einer Mischung von Soda und Borax im Oxydationsfeuer behandelt, gibt ein blaßes, nicht recht geschmeidiges Kupferkorn. Das Pulver ist auflöslich in Salpetersäure mit Ausscheidung von Zinnoryd und Schwefel; Eisen fällt metallisches Kupfer. Chem. Zusammf. nach v. Kobell:

Kupfer... 41,04

Zinn..... 38,11

Schwefel.. 20,85

100,00

Häufig mit Eisen verunreinigt.

Auf Gängen mit Kupferkies und Quarz zu St. Agnes u. a. D. in Cornwall.

295. Selen-Bleikupfer.

Derbe Massen von feinkörniger Zusammensetzung. Bruch: muschelig bis eben. Weich; sehr milde, geschmeidig. Sp. Gew. = 5,6? Undurchsichtig. Metallglanz. Bleigrau; blaulich, auch messinggelb angelauten. Strich: stahlgrau, glänzend.

B. d. L. sehr leicht schmelzbar, fließt auf Kohle und bildet eine graue, metallisch glänzende Masse, die nach vollkommener Röstung mit Soda und Borax ein Kupferkorn gibt. Chem. Zusammf. nach v. Kobell:

Kupfer 14,78

Blei.. 48,31

Selen. 36,91

100,00

Mit etwas Silber, Eisen- und Bleioryd.

Auf kleinen Kalkspath-Trümmern zu Tölkerode am Harz.

Anhang:

Selen-Kupferblei.

In den meisten Kennzeichen mit dem Selen-Bleikupfer übereinstimmend. Sp. Gew. = 7,0. Farbe bleigrau. B. d. L. verhält es sich wie Selenblei, schmilzt aber auf der Oberfläche; gibt bei fortgesetztem Rösten eine schwarze Schlacke, die mit Borax auf Kupfer reagiert und durch Zusatz von Soda ein Kupferhorn im Flusse abscheidet. Chem. Zusams. nach v. Kobell:

Kupfer 8,86

Blei.. 57,94

Selen. 33,20

100,00

Spuren von Eisen enthaltend.

Auf Kalk- und Bitterspath-Trümmern zu Tölkerode am Harz.

296. Bauquelinitt.

Syn. Plomb chromé. Chromate of Lead and Copper.

Kernform: schiefe rhombische Säule.

Kristalle, klein und undeutlich, meist nadelförmig und spießig, glatt, zuweilen etwas gekrümmt, aufgewachsen; traubige, stalaktische, nierenförmige Gestalten mit drüsiger und rauher Oberfläche, verb.

Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 2,5 — 3. Etwas spröde. Sp. Gew. = 5,9 — 6,0. Durchscheinend bis undurchsichtig. Diamantglanz, zuweilen fettartig. Schwärzlich-, oliven-, zeisiggrün, auch gelb oder leberbraun. Strich: zeisiggrün.

B. d. L. auf Kohle schwillt es ein wenig auf, und schmilzt nachher unter starkem Schäumen zu einer dunkelgrauen, metallisch-glänzenden Kugel, um welche man kleine reducirte Metallförner sieht. Von Borax wird es zu einem grünen Glase auf-

gelbst, das bei gutem Reduktionsfeuer, beim Abfählen nach ungleichen Zusätzen, roth, dunkelroth oder ganz schwarz erscheint. Die rothe Farbe rührt von Kupfer her. In Salpetersäure zum Theil lösbar. Chem. Gehalt nach Berzelius:

Kupferoxyd...	10,80
Bleioxyd	60,87
Chromsäure ..	28,33
	<u>100,00</u>

Mit phosphorsaurem und chromsaurem Bleioxyd zu Beresofsk in Sibirien; Pautgibaud im Depart. des Puy de Dôme; Brasilien.

297. Nadel erz.

Syn. Bismuth sulphurè plumbo-cuprifère.

Nadelförmige und schilfartige Krystalle, die wahrscheinlich dem rhombischen Systeme angehören, eingewachsen, berbe Massen, eingesprengt.

Spaltbar nach einer der Diagonalen. Bruch: uneben bis unvollkommen muschelig. Härte = 2. Milde. Sp. Gew. = 6,12. Undurchsichtig. Metallglanz. Stahl-, schwärzlichgrau; außen öfters lichte kupferroth oder gelblich angelaufen. Strich: schwärzlichgrau.

B. d. L. schmilzt es leicht, raucht, setzt einen weißen und gelblichen Beschlag auf der Kohle ab und gibt ein grauliches Metallkorn, das bei fortgesetztem Daraufblasen sich merklich vermindert und zuletzt mit Soda behandelt ein Kupferkorn zurückläßt. Aufslöslich in Salpetersäure. Chem. Zusamm. nach v. Kobell:

Kupfer...	16,96
Blei	27,74
Wismuth .	38,06
Schwefel..	17,24
	<u>100,00</u>


John's Analyse ergab noch etwas Nickel, Tellur und Gold. In Quarz zu Katharinenburg in Sibirien.

298. Bournonit.

Syn. Schwarz-Spießglanzerz. Spießglanz-Bleierz. Diprismatischer Kupferglanz. Plomb antimoiné sulfuré. Triple Sulphuret.

Fig. 245.

Kernform: gerade rektanguläre Säule. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseitet; 3) entlängenrandet (b) Fig. 245; 4) entrandet; 5) beßgl. u. entseitet; 6) entbreitenrandet und entseitet; 7) zweifach entseitet, zweifach enteck, entlängen- und dreifach entbreitenrandet; 8) noch viele andere verwickelte Combinationen, so wie auch sehr häufig Zwillinge, namentlich von No. 2.



Krystalle, kurz säulen- oder dick tafelartig, glatt, zuweilen gestreift, einzeln aufgewachsen, auch zu Drusen verbunden und manigfach gruppirt; verb, eingesprengt.

Unvollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 2,5 — 3. Spröde. Sp. Gew. = 5,75 — 5,85. Undurchsichtig. Metallglanz. Stahl-, schwärzlich-, bleigrau; eisenschwarz. Strich: graulichschwarz.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er leicht, rancht, beschlägt die Kohle weiß und gibt eine schlaefige Masse, aus der man mit Soda ein Kupferkorn erhält. Auflöslich in erwärmter Salpetersäure. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kupfer... 12,9

Blei..... 42,0

Antimon . 25,8

Schwefel.. 19,3

100,0

Findet sich auf Gängen mit Antimonglanz, Blende, Bleiglanz, Fahlerz, Eisenspath u. Redruth und Manslo in Cornwall; Clausthal, Andreasberg und Neudorf am Harz; Braunsdorf in Sachsen; Kapnik und Offenbanya in Siebenbürgen; Auvergne.

299. Prismatoidischer Kupferglanz.

Kernform: gerade rhombische Säule. Die einzige bis jetzt beobachtete Gestalt ist: entschärfseitet und entspißekt.

Krystalle, selten, mit rauher Oberfläche; häufiger derbe Massen.

Spaltbar parallel der kleinen Diagonale der Endflächen. Bruch: unvollkommen muschelig. Härte = 3. Spröde. Sp. Gew. = 5,782. Undurchsichtig. Metallglanz. Schwärzlichbleigrau. Strich: unverändert.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er unter Brausen und Absetzung von weißem und gelbem Beschlag zu einem bleigrauen Metallkorne, das weiter geröstet und zuletzt mit Soda behandelt ein Kupferkorn gibt. Im Kolben schmilzt er zur rothbraunen Schlacke unter Entwicklung von etwas Wasser, Schwefel und Schwefelarsenik. Unlöslich in erwärmter Salpetersäure. Chem. Gehalt nach Schrötter:

Kupfer...	17,352
Blei	29,902
Antimon .	16,647
Schwefel .	28,602
Arsenik...	6,036
Eisen....	1,404
	<hr/> 99,943

Auf Eisenspath-Lagern mit Eisenkies, Bleiglanz ic. zu St. Gertraud bei Wolfsberg im Lavant-Thale Kärnthens.

300. Bunt-Kupfererz.

Syn. Oktaedrisches Kupferkies. Cuivre pyriteux hépatique. Purble Copper.

Kernform: regelmäßiges Oktaeder. Vorkommende Gestalten: 1) enteckt, meist 3. Verschw. der Kanten; 2) Zwillinge.

Krystalle, selten, mit rauher, zuweilen gekrümmter Oberfläche, eingewachsen; gewöhnlich derb, in Platten und eingesprengt.

Unvollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 3. Wenig milde. Sp. Gew. = 4,9 — 5,1. Undurchsichtig. Metallglanz. Kupferroth ins Gelbe; gewöhnlich bunt-, vorzüglich kolombinroth, viol- und safrublau angelauten. Strich: schwarz.

B. d. L. schmilzt es zu einer stahlgrauen magnetischen Kugel.

Die geröstete Probe gibt mit Borax ein Kupferkorn. In Salpetersäure theilweise auflöslich zu einer grünlichen Flüssigkeit. Chem. Zusamsf. nach L. Gmelin:

Kupfer ... 63,0

Eisen..... 13,3

Schwefel.. 23,7

100,0

Auf Gängen und Lagern mit Kupferglanz, Kupferkies u. Siegen, Gosenbach, Eisfeld u. a. D. auf dem Westerwalde; Thalitter in Hessen; Annaberg und Freiberg in Sachsen, Saalfeld und Ramsdorf in Thüringen; Kupferberg in Schlesien; Leogang in Salzburg; Drawicza im Bannat; Redruth in Cornwall; Hitterdalen und Arendal in Norwegen; Fahlun in Schweden u. s. w.

Wird auf Kupfer verschmolzen.

301. Kupferkies.

Syn. Tetragonaler und pyramidaler Kupferkies. Cuivre pyriteux. Gopper-Pyrites.

Kernform: quadratisches Octaeder. $P || P = 109^{\circ} 53'$ über den Scheitellanten; $= 108^{\circ} 40'$ über den Randkanten.

Vorkommende Gestalten: 1) Kernform, Fig. 246, häufig tafelartig, verkürzt, auch säulenartig verlängert, zuweilen herrschen drei der Kernflächen vor, wodurch Formen wie Fig. 247, ähnlich einem enteckten Tetraeder, entstehen; dieß Verhältniß findet man auch bei einigen Kombinationen; 2) entrandeckt; 3) zweifach entrandeckt (c) in der Richtung der Scheitellanten, Fig. 248; 4) dergleichen und entscheidet (a Fig. 249 ohne b); 5) zweifach entrandeckt, entscheidet und entscheitellantet (b), Fig. 249; 6) zweifach entrandeckt und entrandet; 7) noch mehrere verwickelte Gestalten und sehr häufig Zwillinge, so daß einfache Krystalle selten sind; unter den angeführten Combinationen erscheinen besonders No. 1, 3 und 4 zu Zwillingen verbunden.

Fig. 246.




Fig. 247.




Fig. 248.





Fig. 249.



Krystalle, gewöhnlich pyramidal, jedoch meist klein, und, durch mancherlei Verzerrungen undeutlich, die P-Flächen häufig gestreift, die sekundären glatt, einzeln ausgewachsen oder zu Gruppen und Drusen verbunden; auch traubig, nierenförmig, stalaktitisch, knollig; am häufigsten verb. und eingesprengt.

Spaltbar parallel den c-Flächen, ziemlich deutlich, nach a unvollkommen. Härte = 3,5 — 4. Wenig spröde. Sp. Gew. = 4,1 — 4,3. Undurchsichtig. Metallglanz. Messinggelb, häufig bunt oder grau angelaufen. Strich: grünlichschwarz.

B. d. L. verknisternd und zu einer stahlgrauen magnetischen Kugel fließend unter Entwicklung von schweflichter Säure. Die gut geröstete Probe gibt mit Borax- und zuletzt mit Soda geschmolzen ein Kupferkorn. In erwärmter Salpetersäure zum Theil auflöslich. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Kupfer...	35,2
Eisen....	29,6
Schwefel.	35,2

100,0

Zuweilen mit Spuren von Gold und Silber.

Allgemein verbreitet; auf Gängen und Lagern mit anderen

Kupfererzen in Felsarten aller Perioden. Wolfach und Schapbach in Baden; Ems und Dillenburg in Nassau; Siegen; Freiberg in Sachsen; Mansfeld, Saalfeld und Ramsdorf in Thüringen; Lauterberg und Goslar am Harz; Røraas und Arendal in Norwegen; Fahlun in Schweden; Derbyshire; Anglesea; Cornwall; Frankreich; Sardinien u. s. w.

Er wird gewöhnlich zur Bereitung des Kupfer-Vitriols verwendet, doch auch häufig auf Kupfer verschmolzen.

302. Fahlerz.

Syn. Tetraedrischer Kupferglanz. Schwarzerz. Kupferfahlerz. Cuivre gris. Grey Copper.

Kernform: *Tetraeder*. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) enteckt; 3) dreifach enteckt (o) in der Richtung der Flächen, Fig. 250; 4) beßgl. in der Richtung der Kanten; 5) entkantet; 6) zweifach entkantet (l); 7) beßgl. z. Verschw. der Kernflächen Fig. 251; 8) dreifach enteckt (o) und zweifach entkantet (l Fig. 252 ohne e); 9) beßgl. z. Verschw. der Kernflächen; 10) vierfach entseittelt (o und e) und zweifach entkantet, Fig. 252; 11) siebenfach enteckt und dreifach entkantet; 12) Zwillinge u. s. w.

Fig. 250.




Fig. 251.





Fig. 252.



Kristalle, glatt auch gestreift, die sekundären Flächen oft rauh, häufig mit dünnem Ueberzug von Kupferkies, einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden; herb und eingesprengt.

Sehr unvollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Bruch: vollkommen muschelig bis uneben. Härte = 3,5. Wenig spröde. Sp. Gew. = 4,6 — 5,2. Undurchsichtig. Metallglanz. Stahlgrau, bleigrau, eisenschwarz (lichtes und dunkles Fahlerz). Strich: graulichschwarz.

B. d. L. verknüpfen einige Arten stark, andere wenig; auf Kohle schmelzen sie leicht mit Aufwallen zur stahlgrauen Schlacke,

welche mit Borax ein braunlich geflecktes, emailartiges oder auch grünlichgrünes Glas gibt, das ein Metallkorn einschließt, aus dem man, mit Soda eingeschmolzen, ein Kupferkorn erhält. Manche Fahlerze geben, gut geröstet, mit Soda einen weißen spröden Regulus, aus welchem man nach dem Umschmelzen mit Borax in der Drydationsflamme ein Silberkorn erhält. In der Glasröhre entwickelt sich Ammoniakrauch und Geruch nach schweflichter Säure, auch nach Arsenik. Das Pulver wird von concentrirter Salpetersäure, unter Entwicklung rother Dämpfe, größtentheils zu einer bräunlichen Flüssigkeit aufgelöst, aus welcher Eisen metallisches Kupfer niederschlägt. Chem. Gehalt, a einer Varietät von Markkirchen, b von Kapnik, c von Clausthal und d von Wolfach, nach H. Rose:

	a	b	c	d
Kupfer ..	40,60	37,98	34,48	25,23
Eisen....	4,66	0,86	2,27	3,72
Antimon.	12,46	23,94	28,24	26,63
Arsenik..	10,19	2,88		
Schwefel	26,83	25,77	24,73	23,52
Silber ..	0,60	0,62	4,97	17,71
Zink ...	3,69	7,29	5,55	3,10
Bergart .	0,41			
	99,44	99,34	100,24	99,91

Diese Verschiedenheit des Gehalts scheint auf eine demnächstige Trennung des Fahlerzes in mehrere Species hinzudeuten.

Findet sich auf Gängen, auch auf Lagern in verschiedenen Felsarten, begleitet von Kupferkies, Eiskies, Eisenspath, Bleiglanz, Blende, Quarz u. Wolfach in Baden; Siegen; Dillenburg in Nassau; Clausthal, Andreasberg und Neudorf am Harz; Freiberg in Sachsen; Mannsfeld, Saalfeld und Ramsdorf in Thüringen; Kapnik in Siebenbürgen; Schemnitz, Kremnitz und Schmölitz in Ungarn; Markkirchen im Elsaß; Graubündten; Falkenstein in Tyrol; Piemont; Spanien u. s. w.

Wird zum Ausbringen des Kupfers verwendet; häufig hat das Fahlerz einen größeren oder geringeren Silber-Gehalt, und dann benutzt man es auch auf dieses Metall.

XXXIV. Gruppe. Quecksilber.

Kommt gebiegen in der Natur vor, häufiger aber mit Schwefel verbunden, als Schwefelquecksilber; auch mit Chlor,

Selen und Silber findet es sich vereint, und neuerdings soll auch Jod-Quecksilber entdeckt worden seyn.

Die Mineralien dieser Gruppe besitzen ein spezifisches Gewicht zwischen 5,6 und 13,6; ihre Härte übersteigt nicht die des Kalkspaths. Sie sind meist undurchsichtig und gefärbt. Vor dem Löthrohre sind sie flüchtig; mit Soda geben sie im Kolben metallisches Quecksilber. Von Salpetersäure oder Königswasser werden sie entweder aufgelöst oder doch zersezt.

303. Gediegen-Quecksilber.

Syn. Mercure natif. Native Quicksilver.

Flüssig bei gewöhnlicher Temperatur und daher auch nur in Form von Tropfen vorkommend; nach Hutschins bei $-39,44^{\circ}$ C. erstarrend und dann in Oktaedern krystallisirend.

Sp. Gew. = 13,5 — 13,6. Starker Metallglanz. Zinnweiß. Nicht nehend. Kalt anzufühlen.

B. b. L. ohne Rückstand verflüchtigend. In erwärmter Salpetersäure auflöslich. Besteht im reinen Zustande nur aus Quecksilber.

Findet sich in Tropfen und eingesprengt, auch auf Höhlungen und Drusenräumen anderer Quecksilbererze, so wie auf Spalten und Klüften von Thonschiefer und Kohlsandstein. Marsfeld, Landsberg und Wolfstein in Zweibrücken; Idria in Krain; Delach in Kärnthen; Sterzing in Tyrol; Horzewitz in Böhmen; Almaden in Spanien; Huancavelica in Peru; China.

Das im Handel vorkommende Quecksilber wird meist erst aus Zinnober gewonnen; man wendet es vorzüglich zur Amalgamation des Goldes und Silbers an, zur Fertigung von Barometern und Thermometern, zur Spiegel-Fabrikation, zu Vergoldungen und Versilberungen im Feuer, als Heilmittel u. s. w.

304. Chlor-Quecksilber.

Syn. Quecksilber-Hornerz. Pyramidales Verklerat. Mercure muriaté. Muriate of Quicksilver or Mercury.

Kernform: gerade quadratische Säule. Vorkommende Gestalten: 1) enteckt zur Spizung über P; 2) beßgl. z. Verschw.

der Kernflächen; 3) enteckt z. Spizung und entseitet; 4) entrandet z. Spizung.

Krystalle, selten und meist sehr klein, glatt, zu zarten Drusenhäutchen verbunden; verb, eingesprengt, angeflogen.

Spuren von Spaltbarkeit parallel den Seitenflächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 1,5. Milde. Sp. Gew. = 6,4 — 6,5. Durchscheinend. Diamantglanz. Graulichweiß, asch-, gelblichgrau. Strich: weiß.

B. d. L. auf Kohle sich verflüchtigend. Im Kolben gibt es weißes Sublimat, mit Soda Quecksilberkugeln. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Quecksilber	84,9
Chlor	15,1
	<hr/> 100,0

Findet sich mit andern Quecksilbererzen am Landsberge bei Moschel; Idria in Krain; Horzewiz in Böhmen; Almaden in Spanien.

305. Zinnober.

Syn. Schwefel-Quecksilber. Peritome Rubinblende. Mercurblende. *Mercurus sulfuré. Cinnabar.*

Kernform: Rhomboeder. $P \parallel P = 71^\circ 48'$ über den Scheitellanten; $= 108^\circ 12'$ über den Randanten. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entseiteit; 3) vierfach entseiteit (o und k), drei Flächen (k) in der Richtung von P, und enteckt (l) Fig. 253; 4) siebenfach entseiteit (o u z), u und z in der Richtung der P-Flächen, Fig. 254; 5) dßgl. z. Versch. der Kernflächen; 6) Zwillinge.

Fig. 253.





Fig. 254.



Krystalle, rhomboedrisch, meist horizontal gestreift, einzeln auf-, meist aber, durcheinander gewachsen und zu Drusen verbun-

den; kugelige, traubenförmige und derbe Massen von körniger bis dichter (Zinnoberspath) oder faseriger und erdiger Zusammensetzung (Faser-Zinnober, Zinnobererde); angeflogen und dendritisch.

Vollkommen spaltbar parallel den L-Flächen. Bruch: uneben bis muschelig. Härte = 2,5. Milde. Sp. Gew. = 8,0 — 8,1. Halbdurchsichtig bis undurchsichtig. Diamantglanz. Cochenillroth ins Bleigraue, scharlach-, karminroth. Strich: scharlachroth.

B. d. L. auf Kohle verflüchtigt er sich und riecht nach schweflichter Säure. Im Kolben ein schwarzes Sublimat, mit Soda Quecksilber gebend. In einer offenen Röhre erhält man theils sublimirten Zinnober, theils Quecksilber. Das Pulver wird von Königswasser aufgelöst. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin;

Quecksilber 86,3

Schwefel . 13,7

100,0

Findet sich auf Lagern, seltener auf Gängen, begleitet von Gediegen-Quecksilber, Amalgam, Eisenspath, Quarz u. Wolfstein, Stahlberg, Landsberg in Zweibrücken; Almaden in Spanien; Litzfeld im Siegenischen; Hartenstein in Sachsen; Horzowitz in Böhmen; Primör in Tyrol; Idria in Krain; Neumärktel und Winklerschappel in Kärnten; Eisenerz in Steyermark; Kremnitz, Schemnitz, Szlana und Rosenau in Ungarn; China; Peru; Brasilien; Mexiko u. s. w.

Anhang:

Lebererz.

Syn. Quecksilber-Lebererz. Mercure sulfuré compact. Hepatik Cinnabar.

Ein Gemenge von Zinnober, Kohle und erdigen Theilen; derbe Massen, zuweilen mit schaligen Ablösungen (Korallen-erz). Bruch: eben bis muschelig. Sp. Gew. = 7,1 — 7,3. Undurchsichtig. Schimmernd, zwischen dunkel kochenschilblich und schwärzlich bleigrau.

Findet sich in einem bituminösen Schieferthon zu Idria in Krain.

Zinnober und Lebererz werden auf Quecksilber benutzt; ersteren gebraucht man außerdem noch als Maler-Farbe, zum Poliren von Stahlarbeiten u. s. w.

306. Selen-Quecksilber.

Derbe Parthieen, welche im Außern große Aehnlichkeit mit Fahlerz haben.

Milde. Metallglanz. Undurchsichtig. Zwischen stahlgrau und schwärzlich-bleigrau. Strich: glänzend.

B. d. L. auf Kohle schmilzt es sogleich unter Entwicklung weißer Dämpfe und beschlägt die Kohle blaulichweiß; zuerst bemerkt man Geruch nach schweflichter Säure und dann starken Selengeruch. Im Kolben sublimirt es als schwarzes Pulver; mit Soda gemengt gibt es viel Quecksilber. Königswasser zerlegt es schon in der Kälte. Chem. Zusamsf. noch nicht genau gekannt; nach K e r s t e n: Schwefel-Quecksilber und Selen-Quecksilber.

In einer Gangmasse, aus Kalkspath und Quarz bestehend, mit Gebiegen-Quecksilber und Schwefel. Mexiko. Auch am Harze soll es gefunden worden seyn.

307. Selen-Quecksilberblei.

Derbe Massen von körnig-blättriger Zusammensetzung.

Nach drei Richtungen rechtwinkeling spaltbar. Bruch: eben bis uneben. Weich. Sp. Gew. = 7,3. Undurchsichtig. Metallglanz. Bleigrau ins Blauliche und Eisenschwarze. Strich: schwarz.

B. d. L. verknistert es sehr stark. Im Kolben gibt es für sich ein glänzendes, krystallinisches, graues Sublimat von Selen-Quecksilber, mit Soda nur Quecksilber. Im Uebrigen verhält es sich wie Selenblei. Chem. Zusamsf. nach v. Kobell:

Quecksilber . 17,77

Blei 54,48

Selen 27,75

100,00

Findet sich zu Tiskerode am Harz unter denselben Verhältnissen wie Selenblei.

XXXV. Gruppe. Silber.

Findet sich ziemlich häufig und zwar theils gediegen, theils mit

Gold, Quecksilber, Antimon, Arsenik, Schwefel und einigen andern Stoffen verbunden.

Das spezifische Gewicht der hierher gehörigen Mineralien steht, mit Ausnahme das des Amalgams, zwischen 5,2 und 10,5; ihre Härte übersteigt selten die des Kalkspaths; sie sind meist geschmeidig und milde. Vor dem Löthrohre geben sie entweder für sich, oder mit Soda und Borax behandelt ein Silberkorn; die meisten werden von Salpetersäure aufgelöst oder zersetzt.

308. Gediegen-Silber.

Syn. Heraedrisches Silber. Argent natif. Native Silver.

Kernform: Würfel. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entedt; 3) beßgl. z. Verschw. der Kernflächen; 4) zweifach entkantet; 5) Zwillinge von No. 3.

Krystalle, meist klein, undeutlich und verzerrt, oft uneben, rauh oder gestreift, selten einzeln aufgewachsen, gewöhnlich zu den mannigfachen Formen gruppirt; zählig, Baum-, Draht- und haarförmig, moosartig, gestrickt, in Platten, Blechen, Blättchen, angeflogen; verb., eingesprengt, stumpfeckige Stücke und Körner.

Bruch: hackig. Härte = 2,5 — 3. Dehnbar und geschmeidig. Sp. Gew. = 10,3 — 10,5. Undurchsichtig. Metallglanz. Silberweiß; häufig gelblich, braunlich oder schwärzlich angelauten. Strich: glänzend.

B. d. L. schmilzt es leicht. In Salpetersäure leicht auflöslich; die Auflösung gibt mit Salzsäure einen starken Niederschlag von Chlorsilber. Besteht im reinen Zustande nur aus Silber; enthält aber häufig Spuren von Antimon, Arsenik, Kupfer u.

Findet sich vorzüglich auf Gängen im älteren Gebirge: Witten und Wolfach in Baden; Freiberg, Schneeberg, Johann-Georgenstadt, Annaberg, Marienberg in Sachsen; Joachimsthal und Przibram in Böhmen; Andreasberg am Harz; Klausen in Tyrol; Schemnitz in Ungarn; Felsőbanya und Kapnik in Siebenbürgen; Allemont und Markirchen in Frankreich; Rongsberg in Norwegen; Sala in Schweden; Schlangenberg in Sibirien; Spanien; Peru; Mexiko; Chili u. s. w.

Die wichtigste Benützung des Silbers ist die zu Münzen; selten wird es jedoch rein zu diesem Zwecke angewendet, sondern

immer mit Kupfer versezt. Ferner wird es zu verschiedenen Geräthschaften, Gegenständen des Luxus u. verarbeitet; das salpetersaure Silberoxyd, der sogenannte Höllenstein, wird in der Chirurgie angewendet.

309. Chlorsilber.

Syn. Silber-Hornerz. Hornsilber. Hexaedrisches Perlkerat. Argent muriaté. Muriate of Silver.

Kernform: Würfel. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entekt; 3) beßgl. z. Verschw. der Kernflächen (Oktader); 4) entfantet; 5) beßgl. z. Verschw. der Kernflächen (Rauten-Dodekaeder).

Krystalle, meist sehr klein, glatt, zuweilen gestreift oder trichterförmig ausgehöhlt, einzeln aufgewachsen, oder reihen- und treppenförmig, auch zu drüsigen Häutchen verbunden, als rindenartiger Ueberzug, verb und eingesprengt.

Bruch: flachmuschelig. Härte = 1 — 1,5. Geschmeidig. Sp. Gew. = 5,5 — 5,6. Durchscheinend. Fettglanz, häufig diamantartig. Perlgrau; viol-, lavendelblau; spargel-, pistazien-, lauchgrün; gelblichweiß; am Lichte allmählig braun werdend. Strich: weiß, glänzend.

Schmilzt schon in der Flamme des Kerzenlichtes. B. d. L. schmilzt es zu einer bräunlichen oder graulichen Perle, im Reduktionsfeuer wird es nach und nach reducirt und gibt endlich ein Silberkorn. Salpetersäure greift es nur wenig an. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Silber 75,314

Chlor . 24,686

100,000

Enthält zuweilen Eisenoxyd oder Thonerde beigemengt.

Findet sich auf Silbererzgängen, besonders in den oberen Teufen, mit Braun-Eisenocker, Gediengen-Silber, Silberschwärze u. Freiberg, Johann-Georgenstadt und Schneeberg in Sachsen; Joachimsthal in Böhmen; Kongsberg in Norwegen; Cornwall; Kolywan in Sibirien; Quantajayo in Peru; Catoroe, Fresnillo, Zacatecas u. a. D. in Mexiko.

310. Iod-Silber.

Wurde bis jetzt nur in dünnen Blättchen gefunden.

Härte: kaum die des Talls übersteigend. Geschmeidig und in dünnen Blättchen biegsam. Durchscheinend. Fettglanz; diamantartig. Perlgrau. Strich: glänzend.

B. d. L. schmilzt es leicht zu einem Silberkorne und färbt die Flamme purpurroth. Salzsäure wird in der Wärme röthlichbraun gefärbt, und entwickelt nach einiger Zeit violette Dämpfe von Iodgas. Chem. Gehalt nach Bauquelin:

Silber 81,5

Iod .. 18,5

100,0

Findet sich mit Gediegen-Silber und Bleiglanz zu Albarra-
don bei Mazapil in Mexiko.

311. Silberglanz.

Syn. Heraebrischer Silberglanz. Glaserz. Glanzerz. Argent sulfuré. Sulphuret of Silver.

Kernform: Würfel. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entect; 3) desgl. z. Verschw. der Kernflächen; 4) entantet; 5) desgl. und entect; 6) dreifach entect in der Richtung der Flächen; 7) desgl. z. Verschw. der Kernflächen (Trapezeder).

Krystalle, häufig sehr verzogen, oft uneben, auch gestreift, selten einzeln aufgewachsen, meist reihen- oder treppenförmig gruppiert; haar-, draht-, baumförmig, ästig, zählig, in Platten, als Ueberzug, angeflogen, verb, eingesprenkt; auch erdig (Silber-schwärze).

Spuren von Spaltbarkeit nach den P- und Entlantungs-
Flächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 2 — 2,5. Vollkommen Geschmeidig. Sp. Gew. = 6,9 — 7,2. Undurchsichtig. Metallglanz. Schwärzlichbleigrau, oft schwarz oder bräunlich, zuweilen bunt angelauten. Strich: glänzend.

B. d. L. auf Kohle schmilzt er leicht mit Schäumen und unter Entwicklung von Geruch nach schweflichter Säure zu einem mit Schlacke umgebenen Silberkorn. Mit Soda erhält man reducirtes Silber. Auflösbar in concentrirter Salpetersäure unter Anscheidung von Schwefel. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Silber .. 87,1

Schwefel 12,9

100,0

Findet sich auf Gängen, zumal im älteren Gebirge mit Gediengen-Silber, Rothgültigerz, Bleiglanz u. Wolsach in Baden; Andreasberg am Harz; Freiberg, Johann-Georgenstadt, Marienberg, Schneeberg u. a. D. in Sachsen; Joachimsthal in Böhmen; Schwarz in Tyrol; Schemnitz und Kremnitz in Ungarn; Rongberg in Schweden; Cornwall; Spanien; Guanarato und Zacatecas in Mexiko; Peru; Sibirien. — Die Silberschwärze besonders ausgezeichnet auf der Salairischen Grube am Altai, Gouvernement Tomsk; Schemnitz; Freiberg; Andreasberg; Mexiko; Peru.

Wird zur Darstellung des Silbers verwendet.

312. Selen Silber.

Kernform: Würfel.

Kleine krystallinische Platten.

Vollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. Härte = 2,5. Geschmeidig. Sp. Gew. = 8,0. Undurchsichtig. Metallglanz. Eisenschwarz. Strich: unverändert.

B. d. L. auf Kohle schmilzt es in der äußern Flamme ruhig, in der inneren mit Schäumen und glüht beim Erstarren wieder auf. Mit Soda und Borax erhält man ein glänzendes Silberkorn. Im Kolben schmilzt es und gibt ein geringes Sublimat. In rauchender Salpetersäure ziemlich leicht lösbar. Chem. Zusamm. nach v. Kobell: Analyse von G. Rose:

Silber 73,21 65,56

Selen 26,79 24,05

100,00

6,79

Selenblei mit etwas Eisen

96,40

Mit Selenblei zu Zinkrode am Harz.

313. Kohlen saures Silberoxyd.

Syn. Argent carbonaté. Carbonate of Silver.

Derbe Massen, eingesprengt.

Bruch: uneben, kleinörnig ins Erdige. **Härte** = 4,5. Undurchsichtig. Wenig glänzend bis matt. Aschgrau ins Schwarze. **Strich:** glänzend.

B. d. L. auf Kohle reducirbar. Mit Brausen in Salpetersäure auflöslich. Chem. Zusamm. nach v. Kobell, Analyse von Selb:

Silberoxyd ...	84	72,5
Kohlensäure...	16	12,0
	<u>100</u>	<u>15,5</u> Antimonoxyd
		100,0

Auf Kalkspathgängen zu Wolfach in Baden.

314. Antimon Silber.

Syn. Spießglanz-Silber. Prismatisches Antimon. Argent antimonial. Antimonial Silver.

Kernform: gerade rhombische Säule. $M || M = 118^\circ$ 4' 20" und $61^\circ 55' 40''$ (Hausmann). Vorkommende Gestalten: 1) entschärftseitig; 2) entspißect z. Schärfung über P und entschärftseitig; 3) beßgl. und entrandet; 4) Zwillinge.

Krysalte, säulenartig, vertikal gestreift auf den Seiten-Flächen, einzeln ein- und auf-, auch durcheinandergewachsen; knollig, kugelig, nierenförmig, in dünnen Platten und Blättchen; verb und eingesprengt von körniger und strahlig-blätteriger Zusammensetzung.

Spaltbar parallel den P- und Entspießungs-Flächen, deutlich, nach M unvollkommen. **Bruch:** uneben. **Härte** = 3,5. Wenig spröde. Sp. Gew. = 9,4 — 9,8. Undurchsichtig. Metallglanz. Silberweiß; häufig gelb, grau oder schwarz angelauten. **Strich:** glänzend.

B. d. L. leicht schmelzend, die Kohle mit Antimonrauch beschlagend und bei anhaltendem Blasen ein Silberhorn gebend. Auflösllich in Salpetersäure mit Hinterlassung eines gelblichen Rückstandes. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Silber ..	76,5
Antimon	<u>23,5</u>
	100,0

Auf Gängen im älteren Gebirge, Wolfach in Baden; Andreasberg am Harz; Quadalcanal in Spanien; Allemont und Markirchen in Frankreich.


Das Arsenik-Silber von Andreasberg und Quadalcanal scheint ein inniges Gemenge von Gebiegen-Arsenik oder Arseniks mit Antimon-Silber.

Man benutzt das Antimon-Silber zum Ausbringen des Silbers.

315. Schwarzgültigerz.

Syn. Sprödglasserz. Sprödglanzerz. Rhombischer Silberglanz. Prismatischer Meteorglanz. Argent antimoine sulfuré noir. Brittle Sulphuret of Silver.

Fig. 255.



Kernform: gerade rhombische Säule. $M || M = 115^{\circ} 39'$ und $64^{\circ} 21'$. Vorkommende Gestalten: 1) entscharrfeitet; 2) desgl. entspitzet und zweifach entrandet; 3) entspitzet (d) und entrandet (o) zum Versch. der Seitenflächen, Fig. 255; 4) Zwillinge.

Kryrstalle, tafelartig oder kurz säulenförmig, die Seitenflächen vertikal gestreift, aufgewachsen, zellig, treppen- oder rosenförmig gruppiert, auch zu Drusen verbunden; in Blättchen, derb und eingesprenzt.

Spaltbar parallel den d- und den Entscharrfeitungs-Flächen, unvollkommen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 2 — 2,3. Milde. Undurchsichtig. Metallglanz. Eisenschwarz, schwärzlichbleigrau, selten bunt angelauten. Strich: unverändert.

B. d. L. auf Kohle schmilzt es zu einem dunkelgrauen Metallkorn, ohne Beschlag anzulegen; riecht bei gutem Feuer nach Arsenik. Mit Soda im Drydationsfeuer ein Silberkorn gebend. Aufböslich in Salpetersäure unter Entwicklung rother Dämpfe und Ausscheidung von Schwefel. Chem. Zusamm. nach v. Kobell:

Silber .. 70,33

Antimon 13,98

Schwefel 15,69

100,00

Zuweilen etwas Arsenik, Kupfer oder Eisen enthaltend.

Auf Gängen im älteren Gebirge mit anderen Silbererzen, Bleiglanz, Blende, Quarz, Kalhsparth u. Freiberg, Annaberg, Schneeberg und Johann-Georgenstadt; Joachimsthal und Przibram in Böhmen; Schemnitz, Kremnitz und Hódvitzsch in Ungarn; Wolfach in Baden; Mexiko; Peru.

Wird zum Ausbringen des Silbers benützt.

316. Rothgültigerz.

Syn. Rhomboedrische Rubinblende. Argent antimoine sulfuré rouge. Red Silver.

Kernform: Rhomboeder. $P \parallel P = 108^{\circ} 20'$ über den Scheitellanten; $= 71^{\circ} 40'$ über den Randkanten. Vorkommende Gestalten: 1) entrandet (n) zur Säule (Fig. 256 ohne z); 2) desgl. und entscheitellantet (z), Fig. 256; 3) entrandet zur Säule und entscheitelt z. Verschw. der Kernflächen (sechseckige Säule); 4) zweifach entrandet (f) und entscheitellantet z. Verschw. der Kernflächen, Fig. 257; 5) dreifach entrandet, die mittlere Entrandungsfläche zur Säule und entscheitellantet; 6) zweifach entrandet und zweifach entscheitellantet z. Verschw. der Kernflächen; 7) Zwillinge u. s. w.

Fig. 256.




Fig. 257.



Krystalle, säulenartig oder prismatisch, glatt, zuweilen auch gestreift, rauh oder gekrümmt, einzeln aufgewachsen, häufiger zu Drusen verbunden, auch treppen- oder büschelförmig gruppiert; verb, eingesprengt, dendritisch, angeflogen.

Spaltbar parallel den Kernflächen; Bruch: muschelig bis uneben. Härte $= 2,5 - 3$. Wenig milde. Sp. Gew. $= 5,55 - 5,85$. Halbdurchsichtig bis undurchsichtig. Diamantglanz,

häufig metallähnlich. Roschenil-, karmesinroth bis schwärzlich bleigrau. Strich: karmesinroth, morgenroth.

B. d. L. auf Kohle verknüpfert es, brennt mit bläulicher Flamme und schmilzt unter Entwicklung von Geruch nach schweflichter Säure und starkem Antimonrauch zu einer schwärzlichen Metallkugel, aus welcher man bei fortgesetztem Blasen ein Silberkorn erhält. Unlöslich in Salpetersäure. Chem Gehalt nach

v. Bonsdorff: H. Rose:

Silber	58,949	64,67
Antimon	22,846	0,69
Arsenik		15,09
Schwefel	16,609	19,51
Erdige Stoffe	0,299	
	<u>98,703</u>	<u>99,96</u>

Nach diesen Analysen ist die Zusammensetzung des Rothgültigerzes verschieden, und es müßte eine Trennung desselben in zwei Arten stattfinden, wie dieß früher in dunkles und liches geschah, und durch Breithaupt jetzt wieder in Antimon-silberblende und Arseniksilberblende getheilt wird, allein nach Berzelius sind Antimon und Arsenik isomorph und substituiren sich ohne Formen-Änderung *), woraus folgt, daß sie in allen Verhältnissen mit einander gemengt vorkommen können, was sich auch schon durch die Uebergänge der Farbe zu bestätigen scheint, jedoch nur durch spätere Analysen mehrerer Varietäten der Art Gewißheit erhalten kann. Der Arsenik-Gehalt ergibt sich jedoch schon durch den Geruch vor dem Löthrohre zu erkennen.

Findet sich auf Gängen im älteren Gebirge, begleitet von Kalkspath, Bleiglanz, Silberglanz u. Wolfach in Baden; Andreasberg am Harz; Freiberg, Schneeberg, Johann-Georgenstadt u. a. O. in Sachsen; Joachimsthal und Ratiborzitz in Böhmen; Schemnitz und Kremnitz in Ungarn; Markirchen im Elsaß; Chalanche in der Dauphinée; Guadalcanal in Spanien; Cornwall; Mexiko; Peru.

Wird als reiches Silbererz auf Silber verschmolzen.

*) Die Differenz der Winkel der primitiven Rhomboeder beider Rothgültigerz-Arten beträgt nach Breithaupt 44".

317. Miargyrit.

Syn. Hemiprismatische Rubinblende.

Kernform: schiefe rhombische Säule. $M || M = 86^{\circ} 4'$ und $93^{\circ} 56'$; $P || M = 97^{\circ} 33'$ und $82^{\circ} 27'$. Bis jetzt nur die Entspitzung und einige andere, jedoch noch nicht genau bestimmte Kombinationen beobachtet.

Krystalle, säulenartig, die Kernflächen stark gestreift, die anderen rauh, auch glatt, einzeln ein- oder zu mehreren zusammengewachsen; verb.

Unvollkommen spaltbar parallel den Entmittelseitungs-Flächen. Bruch: unvollkommen muschelig. Härte = 2,5. Sehr milde. Sp. Gew. = 5,2 — 5,4. Undurchsichtig. Metallglanz, zuweilen diamantartig. Eisenschwarz, lichte stahlgrau. Strich: dunkel firschroth.

B. d. L. und gegen Säuren sich im Allgemeinen wie Rothgültigerz verhaltend. Chem. Zusamm. nach v. Kobell:

Silber .. 35,86

Schwefel 42,79

Antimon 21,35

100,00

Die Analyse von H. Rose ergab noch etwas Kupfer und Eisen.

Kommt auf der Grube neue Hoffnung Gottes zu Braunsdorf in Sachsen vor.

318. Wismuth-Silbererz.

Syn. Wismuth-Bleierz. Silber-Wismutherz.

Nadel- und haarförmige Krystalle, eingewachsen; verb und eingesprengt.

Bruch: uneben. Weich und milde. Undurchsichtig. Metallglanz. Lichte bleigrau, meist dunkel angelauten. Strich: schwarz.

B. d. L. auf Kohle leicht zu einem Silberkorne schmelzend, wobei die Kohle mit Blei- und Wismuthoxyd beschlagen wird und Schwefelgeruch sich verbreitet. Auflöslich in verdünnter Salpetersäure. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin (ungefähr):

Silber ...	18,6
Eisen	4,6
Blei	35,8
Wismuth .	24,5
Schwefel ..	16,5
	<hr/> 100,0

Auf Quarz-Gängen in kleinen Drüsenhöhlen, auch eingewachsen in Hornstein und Flußspath. Schapbach in Baden.

319. Silber-Kupferglanz.

Syn. Kupfer-Silberglanz. Argent et cuivre sulfuré.

Derbe Massen, dicht, eingesprengt.

Bruch: flachmuschelig bis eben. Härte = 2,5 — 3. Milde.

Sp. Gew. = 6,25. Undurchsichtig. Metallglanz. Schwärzlich bleigrau ins Eisenschwarze. Strich: unverändert.

B. d. L. schmilzt er leicht zu einer grauen metallischglänzenden Kugel und riecht nach schweflichter Säure. Mit Blei auf Knochenasche abgetrieben erhält man ein großes Silberkorn und die Kapelle wird schwärzlich grün. Chem. Zusamm. nach v. Kobell:

Silber ..	53,11
Kupfer ..	31,09
Schwefel	15,80
	<hr/> 100,00

Mit einer Spur von Eisen.

Findet sich mit Kupferkies, Bleiglanz, Kalkspath etc.; am Schlangenberge im Gouvernement Tomsk in Sibirien..

Wird auf Silber benützt.

320. Cufairit.

Syn. Cuivre sélénié argental. Seleniuret of Silver and Copper.

Derbe krystallinisch-körnige Massen.

Weich, nimmt Eindrücke vom Fingernagel an. Undurchsichtig. Metallglanz. Bleigrau. Strich: grau und glänzend.

B. d. L. schmilzt es leicht, unter Verbreitung von Selen-Geruch, zu einem grauen, weichen, aber nicht geschmeidigen Metallkorn. Mit Blei auf Knochenasche abgetrieben ein Silberkorn

gebend. In einer offenen Röhre setzt er einen rothen Beschlag ab. Mit flüßigen Reaction von Kupfer gebend. Auflöslich in Salpetersäure. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Silber ...	42,9
Kupfer ...	25,4
Selen	31,7
	<hr/> 100,0

Mit Kalkspath und Selen-Kupfer in einem kalkartigen Gestein in der Kupfergrube Strikerum im Kirchspiele Tryscerum in Emäländ.

321. Polybasit.

Kernform: regelmäßige sechsseitige Säule.

Krystalle, tafelförmig, mit horizontal gestreiften Seitenflächen, aufgewachsen; derb und eingesprenkt.

Bruch: uneben. Härte = 2,5. Milde. Sp. Gew. = 6,214. Undurchsichtig. Metallglanz. Eisenschwarz. Strich: schwarz.

Chem. Gehalt nach H. Rose:

Silber ..	64,29
Kupfer ..	9,93
Eisen ...	0,06
Antimon	5,09
Arsenik ..	3,74
Schwefel	17,04
	<hr/> 100,15

Auf Gängen mit Kupferkies und Kalkspath zu Guanaxato und Guarisamey in Mexiko. Nach Rose dürften auch die tafelförmigen sechsseitigen Krystalle von Schwarzgültigerz aus der Grube Morgenstern bei Freiberg hierher gehören.


322. Amalgam.

Syn. Dodekaedrischer Merkur. Mercure argentale. Native Amalgame.

Fig. 258.

Kernform: Rauten-Dodekaeder.

Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) entrhomboederscheitelt; 3) entoktaederscheitelt (z. Fig. 258 ohne s); 4) entkantet (s. Fig. 258 ohne z); 5) beßgl. und entoktaederscheitelt, Fig. 258.



Krystalle, glatt und glänzend, oft geflossen, durch einen Ueberzug von Gediegen-Quecksilber, daher Kanten und Ecken zugedrückt, einzeln auf- oder aneinandergewachsen; kleine kugelige Massen, in Platten, angefliegen, derb und eingesprengt.

Spuren von Spaltbarkeit nach den Kernflächen. Bruch: muschelig bis uneben. Härte = 3 — 3,5. Wenig spröde. Sp. Gew. = 13,7 — 14,1. Undurchsichtig. Metallglanz. Silberweiß. Strich: unverändert.

B. d. L. im Kolben kocht und spritzt es, gibt Quecksilber und hinterläßt eine etwas aufgeschwollene Silbermasse, welche auf Kohle zu einem Silberkorn schmilzt. Auf Kohle verdampft das Quecksilber und man erhält ein Silberkorn. In Salpetersäure leicht auflöslich. Chem. Zusamm. nach L. Gmelin:

Silber . . . 34,8

Quecksilber 65,2

100,0

Findet sich mit Gediegen-Quecksilber und Zinnober am Landsberg, Stahlberg und zu Mörsfeld im Zweibrückischen; Szlana in Ungarn; Almaden in Spanien; ehemals auch zu Sala in Schweden und Almont in Frankreich.

XXXVI. Gruppe. Gold.

Es findet sich gediegen — und zwar ziemlich häufig; seltener in Verbindung mit Silber, Tellur und wenigen anderen Metallen.

Die hierher gehörigen Mineralien übersteigen in ihrem spezifischen Gewichte nicht 19,4, und in ihrer Härte nicht die des Kalkepathes. Sie sind undurchsichtig, metallglänzend und gefärbt. Vor dem Löthrohre mehr oder minder leicht oder schwer schmelzbar. Auflöslich in Salpetersäure.

323. Gediegen-Gold.

Syn. Heraedrisches Gold. Or natif. Native Gold.

Kernform: Würfel. Vorkommende Gestalten: 1) Kernform; 2) enteckt; 3) beßgl. z. Verschw. der Kernflächen (Oftae

der); 4) dreifach enteckt; 5) beßgl. 3. Verschw. der Kernflächen (Trapezoeder); 6) entkantet; 7) beßgl. 3. Verschw. der Kernflächen (Rauten-Dodekaeder); 8) entkantet und enteckt; 9) Zwillinge.

Kryskalle, meist sehr klein, glatt, rauh, zuweilen auch gestreift, aufgewachsen und zu Drusen verbunden, so wie in den mannigfaltigsten Formen gruppiert, zahnig, draht-, haar-, moos-, baumförmig, ästig, gestriekt, in Blechen, Platten, Blättchen, angeflögen; derb und eingesprengt; auch in stumpfackigen oder abgerundeten Stücken oder Körnern, als Sand und Staub.

Bruch: hackig. Härte = 2,5. Vollkommen dehnbar und geschmeidig. Sp. Gew. = 14,0 — 19,4. Undurchsichtig. Metallglanz. Gold-, messing-, speisgelb. Strich: den Glanz erhöhend.

B. d. L. auf Kohle ziemlich streng flüßig; von Flußmitteln wird es nicht angegriffen. Nur in Salpetersalzsäure auflöslich; und zwar zu einer gelben Flüssigkeit, aus welcher Eisen-Vitriol einen braunen Niederschlag von metallischem Golde fällt. Besteht in reinstem Zustande nur aus Gold; stets aber ist es mit etwas Silber, häufig auch mit wenig Eisen verunreinigt.

Findet sich auf Gängen und eingesprengt in Diorit, Hornblende-Gestein, Syenit, Grauwacke, Thonschiefer, Trachyt, Porphyr zc., meist begleitet von Quarz, Eisenkies und Braun-Eisenstein, Kremniz, Magurka, Bödrspataf, Schemniz, Kapnik, Offenbanya u. a. D. in Ungarn; Schellgaden und Rathhausberg in Salzburg; Galanda in der Schweiz; Spanien; Veresofsk, Koljwan, Sirianowskische Grube u. a. D. in Sibirien; Japan; Guanaxuato, Sombroero, Guarisamey u. a. D. in Mexiko; Potosi in Peru; Minas Geraes in Brasilien; Inseln Aruba und Curacao; Nordkarolina u. s. w. — Ferner kommt es häufig als Waschgöld im Schuttlande und im Sande der Flüsse vor: Brasilien; Peru; Chili; Mexiko; Nordkarolina; Sibirien; Ohlapian in Siebenbürgen; auch mehrere Flüsse Deutschlands führen Gold, wie die Donau, der Rhein, die Isar u. s. w.

Das durch bergmännische Arbeit oder durch Waschen (Waschgöld) gewonnene Gold, wird vorzüglich zu Münzen benützt, hiezu aber, da es für sich zu weich ist, durch Versehung mit Kupfer oder Silber, oder mit beiden zugleich, tauglich gemacht. Diese Versehung wird rothe, weiße oder vermischte Karaturung genannt, je nachdem Kupfer oder Silber, jedes allein oder

B. d. L. auf Kohle schmilzt es leicht, raucht und beschlägt die Kohle gelb; welcher Beschlag durch die innere Flamme verschwindet; nach Harten Blasen erhält man ein geschmeidiges Goldkorn. Unlöslich in Salpetersäure mit Hinterlassung von Gold. Chem. Gehalt nach Klaproth:

Gold . . .	26,75
Silber . . .	8,50
Blei . . .	19,50
Tellur . . .	44,75
Schwefel . .	0,50
	<hr/>
	100,00

Findet sich mit anderen Tellurerzen, Gebiegen-Gold, Quarz zc. auf schmalen Gängen im Porphyr zu Nagay in Siebenbürgen; in Taifschiefer: Sawodinskische Grube am Altal im Gouvernement Tomsk.

XXXVII. Gruppe. Platin.

Kommt nur gebiegen, aber selten rein, gewöhnlich mit Palladium, Iridium, Rhodium, Eisen zc. gemengt vor.

326. Gebiegen-Platin.

Syn. Platine natif ferrifère. Native Platina.

Kernform: Würfel (nach Haüy).

Krystalle, höchst selten, stumpfeckige oder rundliche Stücke, eckige oder platte Körner, außen glatt, rau, scharfkantig, zackig mit Spigen besetzt, in Geschieben und als Sand.

Bruch: hackig. H. = 5 — 6. Geschmeidig und dehnbar. Ep. Gew. = 17 — 19. Undurchsichtig. Metallglanz. Stahlgrau, platingrau; zuweilen schwarz angelauten. Strich: den Glanz erhöhend. Zum Theil magnetisch.

B. d. L. unschmelzbar; auch von Flussmitteln wird es nicht angegriffen. Unlöslich in Salpetersäure, gewöhnlich mit Ausscheidung von Osmium-Iridium. Die blutroth oder bräunlichrothe Auflösung gibt mit Salmiak einen gelben Niederschlag, der gegläht einen Platinschwamm zurückläßt. Im reinsten Zustande

nur aus Platin bestehend; ist aber meist mit verschiedenen Metallen verunreinigt. Die Analysen zweier Varietäten, einer nicht magnetischen (a), und einer magnetischen (b), von Nischnei-Tagilsk, einer dritten von Goroblagodat (c) und einer vierten von Barbacoas (d) ergaben nach Berzelius:

	a	b	c	d	
Platin.....	78,94	73,58	86,50	84,30	
Eisen.....	11,04	12,98	8,32	5,31	
Iridium	4,97	2,35		1,46	
Rhodium	0,86	1,15	1,13	3,46	
Palladium.....	0,28	0,30	1,10	1,06	
Kupfer	0,70	5,20	0,45	0,74	
Osmium-Iridium	1,96	2,30	1,40	1,03	Osmium
Erdfige Theile				0,72	
	98,75	97,86	98,90	98,08	

Findet sich mit Gebiegen-Gold in Diort und in syenitischen Gesteinen zu Santa Rosa in Antioquia; häufiger in Diluvial- und Alluvial-Ablagerungen von Choco und Barbacoas mit Körnern von Gold, von Osmium-Iridium, Zirkon, Nigrin, Magnet Eisen zc.; auf dieselbe Weise und mit Diamanten in Brasilien auf den Hochebenen von Minas-Geraes; auf St. Domingo im Bette des Jaky; am Ural, zumal bei Nischnei-Tagilsk und Kuschna. Hier werden häufig Stücke von beträchtlicher Größe gefunden; das größte befindet sich zu Petersburg, ist aus den Demidoff'schen Werken und wiegt $10\frac{3}{4}$ russische Pfund. Nach v. Engelhard ist die Lagerstätte des Platins im Ural ein syenitischer Grünstein-Porphyr.

Das Platin wird durch Waschen gewonnen und auf die verschiedenste Weise verwendet. Seine Härte, seine Dehnbarkeit, vermöge welcher es zu den dünnsten Blechen geschlagen und zu den feinsten Drähten gezogen werden kann, und seine Unschmelzbarkeit machen es besonders zu chemischen Apparaten, zu Schmelztiegeln, Retorten, Löthrohrspitzen u. s. w. vorzüglich tauglich. In Rußland werden Münzen aus dem Metall geschlagen. Ferner verwendet man es zur Fertigung von Galanterie-Waaren, Uhrketten, Dosen zc. und besonders als schwammige Masse zu Feuerzeugen.

Ihr spezifisches Gewicht übersteigt nicht 2,2; sie entwickeln im Feuer einen brenzlichen Geruch, die meisten werden in höherer Temperatur verkohlt und fast alle verbrennen mit Flamme.

I. A b t h e i l u n g.

Organisch-saure Salze.

Mineralien, welche Verbindungen einer organischen Säure mit einer unorganischen Basis sind.

XL. Gruppe. Organisch-saure Salze.

Die Mineralien dieser Gruppe besitzen ein spezifisches Gewicht, von 1,5 — 2,2; ihre Härte übersteigt nicht die des Kalkspath's. Lösbar in Salpetersäure.

329. Humboldtite.

Syn. Oxalsaures Eisen. Eisen-Ressin. Oxalit. Fer oxalaté.

Kernform: wahrscheinlich gerade rhombische Säule.

Krystalle, haarförmig; krystallinische Massen von faseriger und sehr feinkörniger Zusammensetzung; traubige und plattenförmige Gestalten; dicht.

Spaltbarkeit, nicht beachtet. Bruch: uneben bis erdig. ρ . = 1,5. Sp. Gew. = 2,13. Undurchsichtig. Weiniggglänzend, schimmernd. Ocker-, strohgelb, lichte graulichgelb. Strich: hellgelb.

In der Lichtflamme färbt er sich schnell schwarz und wird magnetisch. B. d. F. verglüht er und hinterläßt eine dunkle lockere Masse. Lösbar in Salpetersäure. Chem. Zusams. nach Mariano de Rivero:

Oxalsäure.. 46,14

Eisenoxydul 53,86

100,00

Findet sich in der Braunkohle zu Groß-Almerode in Hessen und zu Koloserau bei Bilsin in Böhmen, hier begleitet von Gypspath und von faserigem Alaun.

Nach Rivero soll er durch Zersetzung saftiger Pflanzen entstanden seyn.

330. Honigstein.




Syn. Pyramidales Melichronharz. Mellite. Honeystone.

Kernform: quadratisches Octaeder. $P || P = 118^{\circ} 13' 50''$ über den Scheitellanten; $= 93^{\circ} 6'$ über den Randkanten (Kupfer). Vorkommende Gestalten: 1) Kernform, Fig. 259; 2) entscheidet (o), Fig. 260; 3) entect (g); 4) beßgl. und entscheidet, Fig. 261; 5) entscheidet, entect und entscheidetkantet.

Fig. 259.

Fig. 260.

Fig. 261.



Krystalle, meist glatt, seltener gestreift oder mit einer Rinde von bituminöser Holzerde überzogen, die o-Flächen gewöhnlich konver, zuweilen zerfressen, durchlöchert; einzeln auf- oder eingewachsen oder zu kleinen Gruppen verbunden.

Sehr unvollkommen spaltbar parallel den Kernflächen. $H. = 2 - 2,5$. Wenig milde. Sp. Gew. $= 1,58 - 1,66$. Durchsichtig bis durchscheinend. Strahlenbrechung doppelt. Fettglanz, zuweilen glasartig. Honiggelb bis wachsgelb und hyazinthroth; röthlichbraun. Strich: gelblichweiß.

B. d. L. im Kolben gibt er Wasser, wird weiß, undurchsichtig und verkohlt in der Glühhitze; auf Kohle schwärzt er sich, glüht und brennt sich dann bei gutem Feuer weiß, wobei er sehr einschrumpft. Der Rückstand verhält sich wie reine Thonerde. Unlöslich in Salpetersäure. Chem. Zusams. nach L. Gmelin:

Honigsteinsäure 41,08

Alaunerde 14,11

Wasser 44,81

100,00

Findet sich eingewachsen in Braunkohle zu Artern in Thüringen.

II. A b t h e i l u n g.

Organische Dryde.

Mineralien, zusammengesetzt aus zwei, drei oder mehr einfachen Stoffen zu organischen Verbindungen.

XLI. Gruppe. Bitume.

Die hierher gehörigen Mineralien besitzen ein spezifisches Gewicht zwischen 0,7 und 1,16 und sind theils fest, theils flüssig. Die festen werden in einer wenig erhöhten Temperatur flüssig, und verbreiten dann, wie die flüssigen, einen starken Geruch. Sie sind leicht entzündlich, brennen mit Flamme und Rauch und nur zum Theil in Alkohol auflöslich.

331. Bernstein.

Syn. Gelbes Erdharz. Succinit. Ambra. Succin. Amber.

Rundliche, stumpfartige Stücke und Körner mit rauher und unebener Oberfläche, zuweilen eingesprengt, seltener gestreift oder geflossen.

Bruch: vollkommen muschelig. ρ . = 2, — 2,5. Wenig spröde. Sp. Gew. = 1,08. Durchsichtig bis durchscheinend. Mehr oder wenig starker Fettglanz. Honig- bis wachsgelb, schwefel-, strohgelt, gelblichweiß; gelblichbraun; röthlichbraun. Strich: gelblichweiß. Wird durch Reiben stark negativ elektrisch.

B. d. L. verbrennt er mit gelber Flamme unter Entwicklung wohlriechender Dämpfe, und mit Hinterlassung eines geringen kohligen Rückstandes. In einer ziemlich hohen Temperatur mehr oder minder leicht schmelzend und dann wie Del fließend. In erwärmtem Alkohol schwierig auflöslich. Besteht nach Berzelius aus wenig wohlriechendem flüchtigem Del, leicht in Weingeist löslichem, minder leicht löslichem und unlöslichem Harz, (über 90 prot. betragend) und Bernsteinsäure. Drapiez's Analyse einer Varietät aus dem Hennegau ergab:

Sauerstoff ..	6,73
Wasserstoff ..	7,31
Kohlenstoff ..	80,59
Kalkerde	1,54
Thonerde ...	1,10
Kieselerde ...	0,63
	97,90

Er findet sich in Braunkohlen-Lagern, und dieß scheint die ursprüngliche Lagerstätte zu seyn. Lobsan im Elsaß, Auteuil unfern Paris und an einigen andern Orten in Frankreich; Sibirien; Sab-Sable in Maryland. Häufiger kommt er lose am Meeresufer, von den Wellen ausgeborsten, oder mehr oder weniger entfernt vom Strande im Sand und Lehm vor, auch im aufgeschwemmten Lande mancher Niederungen: Ostsee-Küste Preußens, besonders zwischen Palmiken und Dirschkeim; Pommern; Mecklenburg; Dänemark; Holstein; Niedersachsen; Lausitz; Kurland; Livland; Catania und Semito in Sicilien; Norfolk, Suffolk und Essex; Trahenières im Hennegau; Alicante in Spanien u. s. w. Außerdem hat man ihn, jedoch weit seltener, noch unter einigen andern Verhältnissen getroffen: in Kalk in Spanien; in Mergel zu Frau in der Schweiz; in Gyps am Segeberg in Holstein; in Sandstein in Gallizien; in Liasmergel an der Neue Welt unfern Basel.

Daß der Bernstein ein fossiles Baumharz sey, geht aus mehreren seiner Eigenschaften, so wie aus der Art und Weise wie man ihn manchmal findet, deutlich hervor. Er kommt zuweilen mitten in der Braunkohlen-Masse, auch in der Rinde von bituminösem Holze vor, woraus nach Schweigger zu schließen sey, daß er einem Harzbaum (Bernsteinbaum), wie gegenwärtig die verschiedenen Harze, entfloßen seyn müsse, was noch durch die verschiedenen Insekten, durch die Zweige, Blätter zc., welche nicht selten darin eingeschlossen gefunden werden, Bestätigung fände. Ferner sprechen für diese Ansicht Brewster's Beobachtungen, wornach sich der Bernstein hinsichtlich der Lichtpolarisation ebenso verhalte wie Gummi und Pflanzenharz.

Der Bernstein wurde von den alten Völkern sehr geschätzt; sie verwendeten ihn schon frühe zu verschiedenem Schmuck, trugen ihn als Amulet zc. Heutigen Tages verarbeitet man ihn zu

Hals- und Armschmuck, Ohrgehängen, Knöpfen, Rosenkränzen, Mundspitzen für Pfeifenrohre, Dosen, Schmuckkästchen u. s. w. Ferner dient er zur Gewinnung der Bernstein säure und des Bernsteinöls, zu Lackfirnissen und zu Räucherpulver. Durch Kunst sucht man den Bernstein nachzuahmen; hierher gehören die Bernstein-Waaren, welche gegossen sind.

332. Retinit.

Syn. Retinasphalt. Retinite.

In stumpfecigen oder rundlichen Stücken mit rauher und unebener Oberfläche, meist mit einer grauen Rinde bekleidet; als Ueberzug.

Bruch: muschelig ins Uebene. $H. = 2 - 2,5$. Spröde. Sp. Gew. = 1,07 — 1,2. An den Ranten durchscheinend. Fettglanz. Röthlich-, gelblichbraun; braunlich-, isabell-, wachs-, graulichgelb; grau; die Farben zuweilen in Streifen oder Flecken wechselnd; meist unrein. Strich: lichte gelblichweiß. Durch Reiben negativ elektrisch werdend.

B. d. L. verbrennt er, indem er zuerst einen eigenthümlichen aromatischen und dann einen bituminösen Geruch entwickelt und einen kohligen Rückstand hinterläßt. Bei geringer Hitze schmelzbar. Das Pulver zum Theil auflöslich in erwärmtem Alkohol unter Ausscheidung einer schwammartigen Masse. Chem. Zusamm. noch nicht genau gekannt; Gehalt einer Varietät von Bovey nach Hatchett (a) und einer andern von Cap-Sable nach Troost (b):

	a	b
Harz.....	55	42,5
Bitumen.....	42	55,5
Eisenoxyd und Thonerde		1,5
	97	99,5

Findet sich auf kleinen Nestern oder eingesprengt in Braunkohle und bituminösem Holze: Cap-Sable am Magothy-Flusse in Maryland (hier am ausgezeichnetsten); Wancy in Devonshire; Murtendorf in Thüringen; Laubach in Hessen; Gegend von Halle; Attingshof und Wolkow in Mähren; Casca im Bannat; Sibirien; Grönland.

An dem Ursprunge des Retinitis aus vegetabilischem Harze ist wohl nicht zu zweifeln.

233. Hatthettin.

Syn. Mineral adipocire.

Schuppige Theile, Flocken, zuweilen auch kleine körnige wachsähnliche Parthien oder tropfenähnliche Gestalten.

Weich, wie Talg. Leichter als Wasser. Durchsichtig bis undurchsichtig. Perlmutterglänzend, oft nur schimmernd oder matt. Gelblichweiß, wachs-, grünlichgelb. Geruchlos. In erwärmtem Wasser und zwar schon unter dessen Siedepunkt schmelzend. Leicht auflöslich in Aether. Gibt bei der Destillation, unter Entwicklung bituminösen Geruchs, Oel mit Hinterlassung eines kohligen Rückstandes.

Findet sich als Ausfüllung kleiner Adern mit Kaltspath und Bergkrysal in einem Eisenstein-Lager zu Merthyr Tydvil in Süd-Wales.

334. Scheererit.

Syn. Natürliche Naphthaline. Bergtalg.

Krystallsystem noch nicht gekannt.

Krystalle, klein, nadelförmig, eingewachsen zwischen den Fasern von bituminösem Holze, krystallinische Körner und Blättchen lose zusammengehäuft.

Bruch: muschelig. Zerreiblich. Sp. Gew. = 0,65 (ungefähr). Durchscheinend, oft nur an den Kanten. Schwacher Perlmutterglanz. Weiß, gelblich-, graulich-, grünlichweiß. Strich: weiß. Fühlt sich nicht fett an. Geruchlos. Hinterläßt auf Papier Fettflecken.

Schmilzt bei 45° zu einem farblosen Oele, das beim Erkalten zu strahligen nadelförmigen Krystallen gesteht. Bis zu ungefähr 90° erhitzt, destillirt er ohne Rückstand. An der Luft verbrennt er mit etwas rußender Flamme und schwachem, gewürzhaft brenzlichem Geruch. Im Wasser unlöslich. In Alkohol und Aether leicht auflöslich. Chem. Gehalt nach Macaire's Prinzip:

Kohlenstoff 73

Wasserstoff 24

97

Kugelige, traubige, nierenförmige, stalaktitische Gestalten; verb., eingesprengt, als Ueberzug.

Bruch: vollkommen muschelig. ρ . = 2. Milde. Sp. Gew. = 1,07 — 1,2. Undurchsichtig. Fettglanz. Pechschwarz, gelblich-, schwärzlichbraun. Strich: etwas lichter als die Farbe des Minerals. Durch Reiben negativ elektrisch werdend. Bituminöser Geruch.

Leicht verbrennbar mit starker, lebhafter Flamme, unter Entwicklung eines dicken Rauchs und bituminösem Geruch und mit Hinterlassung eines geringen Rückstandes. Schmilzt bei der Hitze des siedenden Wassers. In Del und Naphtha lösbar. Chem. Zusamm. noch nicht genau gekannt. Besteht aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff.

Findet sich auf Erzgängen, selten auf Magneteisen-Lagern, oder auf eigenthümlichen Lagern; zuweilen erscheinen jüngere Sandstein-artige Gesteine ganz von ihm durchdrungen. Mörsefeld in der Pfalz; Iberg am Harz; Rammsdorf in Thüringen; Häring in Tyrol; Travers, Ber und Domlesch in der Schweiz; Larnowitz in Schlesien; Truskawice in Gallizien; Castro im Kirchenstaate; Sicilien; Dalmatien; Insel Zante; Nylona in Albanien; Schweden; Derbyshire; Fifehire; Cornwall; Kaukasus; Ural; Ufer des todten Meeres; Insel Trinidad (der sogenannte Erdpechsee); Mexiko u.

Die Asphalterde (erdiges Erdpech) ist ein durch Eisen- und Erdtheile verunreinigter Asphalt. Iberg am Harz; Neuchâtel in der Schweiz; Cornwall; Trinidad; Persien u. s. w.

Der Asphalt wird vorzüglich zum Ueberziehen oder Anstreichen von Leder und Holz benutzt; zum Bethetern der Schiffe, zu schwarzem Firniß auf Eisenwaaren, zu schwarzem Siegelack, zur Wagenschmiere, mit Kalk zu einem wasserdichten Kitt u. s. w.

XLII. Gruppe. Kohlen.

Die Mineralien dieser Gattung besitzen ein spezifisches Gewicht zwischen 1,0 — 1,5; ihre Härte übersteigt nicht 2,5. Gelfärbt. Schwarze und braune Farben vorherrschend. Verbrennen mit Flamme unter Entwicklung eines bituminösen Geruchs und mit Hinterlassung eines größeren oder geringeren Rückstandes von Asche.

338. Schwarzkohle.

Syn. Steinkohle. Harzige Steinkohle z. Th. Houille. Black-Coal.

Derbe Massen, in mehr oder weniger mächtigen Lagern; eingesprengt; mit schieferiger, faseriger, dichter oder erdiger Textur. Bruch: muschelig bis eben. $\rho = 2 - 2,5$. Wenig milde bis spröde. Leicht zersprengbar. Sp. Gew. = $1,15 - 1,5$. Undurchsichtig. Fettglanz bis Glasglanz, zuweilen selbst etwas metallartig. Schimmernd. Schwärzlichbraun; pech-, sammet-, graulich-, eisen-schwarz. Strich: braunlich- oder graulich-schwarz. Durch Reiben negativ elektrisch werdend.

B. d. L. mit Flamme verbrennend unter Entwicklung eines bituminös riechenden Rauches und mit Hinterlassung eines größeren oder geringeren aschenartigen Rückstandes. Hinterläßt im Verschlössenen gegläht einen schwer einzusäuernden Rückstand (Coak). Das Pulver verhält sich im verschlossenen Raume gegläht verschieden: 1) es schmilzt und backt zu einer homogenen Masse, Backkohle; 2) es sintert, ohne zu schmelzen, zu einer festen Masse zusammen, Sinterkohle, und 3) es bleibt locker und ohne Zusammenhang, Sandkohle. — Im Kolben mit trockenem Schwefelpulver gegläht Hydrothionsäure gebend. In erhitzter Salpetersäure, Salpetergas, in konzentrierter Schwefelsäure, schwefelige Säure entwickelnd. Chem. Zusamm.: Kohlenstoff (hier vorherrschend), Sauerstoff und Wasserstoff, aber in so schwankenden Verhältnissen, daß eine bestimmte Formel nicht wohl aufzustellen ist. Karsten fand, in verschiedenen von ihm untersuchten, Kohlen den Gehalt derselben hinsichtlich dieser drei Bestandtheile sehr wechselnd und zwar:

Kohlenstoff 73—96,5 Pct.

Sauerstoff. 3—20

Wasserstoff 0,5—5,5

Die Verunreinigungen von Erden und Metallsoryden steigen bis zu 20 Pct. Die Analysen einer Backkohle aus dem Dürener Bergamts-Revier (a), einer dergleichen von Newcastle (b), einer Sinterkohle von Beuthen in Oberschlesien (c), einer dergleichen von der Zeche Nottelampsbank im Essen-Werdenschen (d), einer Sandkohle von Breeskowitz in Oberschlesien (e), einer dergleichen von der Zeche Hundsnaeken im Essen-Werdenschen (f),

sie zu Kusel in Rhein-Baiern; zu Waldenburg und Eidersdorf in Schlesien, zu Planitz und Voitschappel in Sachsen; zu New-Castle in England u. s. w. vor.

Eine Faserkohle findet sich mit Theilen von *Cupressus Ulmani Bronn*, und dieser Pflanzen-Art angehörig, zu Frankenberg in Hessen in der Kupferschiefer-Formation. Am Monte Civitina in der Provinz Vicenza, trifft man in einem Jurakalk ebenfalls häufig einzelne Bruchstücke von Faserkohle eingesprengt.

4. Rännelkohle.

Syn. Houille compacte. Cannel- or Candle-coal.

Derbe Massen. Dicht. Wenig milde, zähe und daher minder leicht zersprengbar. Bruch: groß- und flachmuschelig ins Ebene. Sehr schwacher Fettglanz. Graulich- bis sammet- und pechschwarz. Strich: glänzend.

Im älteren Kohlen-Gebirge ganze Lager ausmachend. Wigan in Lancashire, Whitehaven, Elee Hill in Schrepschire, Athertcliff u. v. a. D. in England; Edinburg, Muirkirk in Clydesdale in Schottland; angeblich auch sehr sparsam bei Altwasser und Hevesdorf unfern Waldenburg in Schlesien.

5. Gagat.

Syn. Pechkohle z. Th. Pechsteinkohle. Gayet. Pitch-Coal z. Th.

Derb. Dicht. Bruch: vollkommen muschelig. Etwas spröde, leicht zersprengbar. Starker Fettglanz. Pechschwarz. Strich: glänzend.

Kommt, in Schichten mit der Schieferkohle wechselnd, im älteren Steinkohlen-Gebirge vor, oder sitzt auf dieser auf. Planitz und Zwickau in Sachsen; Waldenburg, Hausdorf, Eidersdorf u. a. D. in Schlesien; England; Spanien; Frankreich u. s. w. Auch in der Lias-Formation finden sich dünne Schnüre von Gagat: zu Whitby in Yorkschire; Göppingen, Balingen u. a. D. in Württemberg; Ubstatt in Baden u. s. w.

6. Rußkohle.

Syn. Lösch. Houille fuligineuse. Soot-Coal.

Derbe Massen, aus staubartigen Theilen, von lockerer Zusammensetzung, bestehend. Bruch: uneben bis erdig. Zerreiblich. Matt bis schimmernd. Graulichschwarz bis dunkel eisen schwarz. Strich: glänzend. Stark abfärbend.

Findet sich mit Schieferkohle: zu Halle an der Saale; Jena in Thüringen; Altwasser in Schlessen; West-Lothian in Schottland u. s. w.

Diese Abänderungen kommen nicht immer in ganz reiner Absonderung, sondern häufig entweder in schichtenweiser Abwechselung, oder in regelloser Verwachsung, oder auch wohl in inniger Verschmelzung mit einander verbunden vor, so daß eine Menge von Zwischen-Gliedern dadurch entstehen.

Die Steinkohlen sind unbezweifelt Ueberreste einer früheren Pflanzenwelt, welche durch chemische Prozesse und Umwandlungen ihre jetzige Form erhalten haben.

Die Steinkohlen liefern ein vorzügliches Brennmaterial, und sind fast zu allen Feuerungen brauchbar, da sie nicht nur Flammen-, sondern auch Glühfeuer geben. Sie sind bei allen Schmiede- und Siede-Arbeiten, bei Defen aller Art, zum Betrieb der Dampfmaschinen in Fabriken, zum Schmelzen der Erze in Tiegelu und Reverberiröfen zc. vortrefflich anzuwenden. Nur zum Schmelzen und Reduciren der Erze in Schachtöfen und in einigen anderen Fällen lassen sich die Steinkohlen unmittelbar nicht wohl anwenden, sie werden daher in freien Meilern oder in Defen verkohlt, abgeschwefelt oder verkoakt (zu Roaks umgewandelt), um sie von ihren erdharzigen und schwefelichten Bestandstoffen zu reinigen. Bei dieser Verkohlung gewinnt man Steinkohlenöl, Steinkohlentheer und Ruß, saures Steinkohlenwasser und ein Gemenge von brennbaren Gasarten, als Nebenprodukte, von denen letztere, wegen der Gasbeleuchtung, von größter Wichtigkeit sind. Das Steinkohlenöl gebraucht man bei verschiedenen Farben, statt des Leinöls, und zum Pechsieden; den Steinkohlentheer verwendet man wie den Holztheer, besonders aber zum Anstreichen auf Holz. Das Steinkohlenwasser wurde zum Gerben des Leders vorgeschlagen. Ferner werden die Steinkohlen zur Bereitung von Ruß, zu Farbematerial, als Zusatz zum Mörtel, zur Glasur u. s. w. verwendet. Aus der Rännelkohle und dem Gagat lassen sich Vasen, Trinkgefäße, Tabatieren, Tintenfässer, Knöpfe zc. schleifen und drehen. Die Asche der Steinkohlen dient als Düngmittel; auch soll sie einen guten Zusatz zum Mörtel bei Wasserbauten abgeben.

539. Braunkohle.

Syn. Harzige Steinkohle z. Th. Houille brune. Lignite. Brown-Coal.

Derbe Massen mit mehr oder minder deutlicher holzartiger Textur, auch blätterig, dicht oder erdig.

Bruch: muschelig bis erdig. $H. = 1 - 2,5$; zuweilen zerreiblich. Milde bis spröde. Sp. Gew. $= 0,5 - 1,7$. Undurchsichtig. Mehr oder weniger starker Fettglanz, auch nur schimmernd oder matt. Pechschwarz; schwärzlich-, holz-, gelblich-braun. Strich: braun oder bräunlichschwarz glänzend.

B. d. L. mit ziemlich heller Flamme, unter Entwicklung eines widrig brenzlich riechenden Rauches, verbrennend; als Rückstand bleibt eine größere oder geringere Menge von Asche. Hinterläßt beim Glühen im verschlossenen Raume leicht einzusickernde Gase. Im Kolben mit trockenem Schwefelpulver gegläht, Hydrothionsäure gebend. In erhitzter Salpetersäure Salpetergas entwickelnd. Gibt durch Digeriren mit wässrigem Natrium eine braune Flüssigkeit, wobei sich die verschiedenen Varietäten von Braunkohle mehr oder minder, jedoch nie gänzlich, auflösen; Säuren fällen eine schwarze Substanz (Ulmin) aus der Flüssigkeit (Karsten). Chem. Zusamm.: Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff in schwankenden Verhältnissen, und stets mit erdigen Theilen verunreinigt. Die mehr oder weniger vorgeschrittene Umwandlung der Pflanzenfasern scheint jenes Schwanken der Elementar-Bestandtheile zu verursachen. Die Analysen einer gemeinen Braunkohle von Uttweiler (a) und des bituminösen Holzes von der Roddergrube im Kreise Köln (b) ergaben nach Karsten;

	a	b
Kohlenstoff.....	77,100	54,970
Sauerstoff.....	19,354	26,467
Wasserstoff.....	2,546	4,313
Erdige Bestandtheile	1,000	14,250
	100,000	100,000

Arten:

1. Bituminöses Holz.

Syn. Fossiles Holz. Holzartige Braunkohle. Faserige Holzkohle. Curturbrand. Bois bitumineux. Lignite fibreux. Bituminous Wood.

Derbe Massen mit deutlicher Holz-Gestalt, (zuweilen Stamm-, Ast- oder Wurzelstücke noch unterscheidbar) und Holz-Textur, mitunter selbst Jahrringe und Rinde wahrzunehmen. Querbruch: muschelrig. $H. = 1$. Milde. Sp. Gew. = 0,5 — 1,4. Matt oder schimmernd. Holz-, auch schwärzlichbraun; schwarz.

In den Braunkohlen-Niederlagen der Wetterau, besonders zu Salzhausen und Laubach, finden sich Stücke verschiedener Größe von verkohltem bituminösem Holze, mitten zwischen unversehrter Braunkohle oder bituminösem Holze, deren Aeußeres ganz dem Ansehen der künstlichen Kohle von leichten Holzarten entspricht. Sie zeigen mehr oder minder deutliche Holztextur, besonders lassen sich die Jahrringe häufig genau unterscheiden, zuweilen liegen auch faserige Stückchen verworren, wie bei der Faserkohle, durcheinander. Sie sind weich, leicht, schwarz, färben ab, brennen sehr leicht und glimmen fort wie Bunder, geben viel Flüssigkeit im Kolben. Sie scheinen der Zersetzung von Eisengiesen und der dadurch entwickelten Hitze ihr Entstehen zu verdanken. Auch zu Beitsberg in Steyermark findet sich solche Kohle in bituminösem Holze.

2. Gemeine Braunkohle.

Syn. Muschelrige Braunkohle. Houille brune. Brown-Coal.

Derbe Massen mit Spuren von Holz-Gestalt und Holztextur. Bruch: mehr oder weniger vollkommen flachmuschelig. $H. = 2$. Wenig spröde. Sp. Gew. = 1,28. Fettglänzend, schimmernd. Braun; schwärzlichbraun bis pechschwarz. Manche Varietäten zerspringen, der Luft ausgesetzt, nach vielen Richtungen.

Die gemeine Braunkohle und das bituminöse Holz, welche fast stets zusammen und am häufigsten von allen Arten der Braunkohle vorkommen, bilden theils in der über der Kreide liegenden Thon- und Sand-, theils in der Molasse- und jüngeren Grobkalk-Formation mächtige mehr oder weniger verbreitete Ablagerungen. Die ältern Braunkohlen-Lager finden sich vorzüglich am Meißner und Habichtswalde in Hessen; zu Salzhausen, Dorheim, Laubach u. a. O. in der Wetterau (ersterer Ort besonders durch die vielen Ueberreste von verschiedenen Samen, Früchten, Blättern, Stämmen u. s. w., welche daselbst gefunden werden, bekannt); Westerwald; im Rheinthale zwischen Bonn und Köln;

Kelbra, Eisleben, Kalten-Nordheim, Artern und Sangershausen in Thüringen; Borna und Colditz in Sachsen; Muskau und Bittau in der Lausitz; weit verbreitet in Böhmen zwischen dem Erz- und Mittelgebirge; Fremdsdorf und Löwenberg in Schlesien; Gallizien; Becken von Paris, Gegend von Aix in der Provence u. a. D. in Frankreich; Insel Wight, Bassin von London u. a. G. in England; Island (hier der sogenannte Surturbrand) u. s. w. Zu den jüngeren Braunkohlen-Ablagerungen, d. h. zu denen der Molasse werden gerechnet, die zu Käpfnach, Uznach, Lausanne, Vevey u. a. D. in der Schweiz; Lobjann im Elsaß; Fuß der Schramberger Alpen in Steyermark; Sabibona im Genuesischen.

Hierher gehören die Bast- und Nadelkohle. Bastkohle — bastartige Theile mit zartfaseriger Textur; elastisch-biegsam; fettglänzend bis matt; holz- bis schwärzlichbraun. Scheint umgewandelte Rinde von Kiefern und Erlen zu seyn. Findet sich zu Offenheim in der Wetterau.

Nadelkohle — Nadeln, oft von mehreren Zoll Länge, und häufig der Länge nach zu dicken Stücken mit einander verbunden; gestreift; elastisch-biegsam; Bruch: muschelig. Außen matt, Innen fettglänzend. Braunlichschwarz. Kommt zu Lobjanne im Elsaß vor.

3. Moorkohle.

Syn. Trapezoidale Braunkohle. Moor-Braunkohle. Houille limonneuse. Moor ou trapezoidal Coal.

Derbe Massen oder Platten, häufig geborsten oder trapezoidisch zerklüftet. Bruch: eben bis flachmuschelig. Wenig milde. Sp. Gew. = 1,2 — 1,3. Schwach fettglänzend bis matt. Schwärzlichbraun bis pechschwarz.

Findet sich in den Braunkohlen-Ablagerungen am Westerwald; Hirschberg in Hessen; in Sachsen; Ellnbogen, Karlsbad und Töplitz in Böhmen; Käpfnach bei Zürich; Neustadt in Oesterreich; Mähren; England; Grönland; Irkutsk in Sibirien u. s. w. Scheint vorzüglich aus Schilf- und Sumpfpflanzen hervorgegangen zu seyn.

4. Papierkohle.

Syn. Blattkohle.

Derbe Massen, zusammengesetzt aus papierdünnen Lagen. Läßt sich leicht in sehr dünne Blättchen spalten. Härte = 1. Milde. Schimmernd bis matt. Holz- bis schwärzlichbraun.

Bildet Lagen im Braunkohlen-Gebirge; Stopplau und Kolbitz in Sachsen; Geislinger Busch zwischen Dammbruch und Rott im Siebengebirge; und Pützberge bei Friesdorf unfern Bonn (hier enthält die Papierkohle häufig Blätter- und Fisch-Abdrücke); Vicentini in Sicilien; Val de la Mone in Auvergne; Linz in Oesterreich.

Hierher gehört wohl auch der bei Melilli in Sicilien vorkommende *Dysodil* (Stinkkohle. *Houille papyracée. Terre bitumineuse feuilletée*). Derbe Massen aus papierdünnen Scheiben oder Platten zusammengesetzt, welche lose mit einander verbunden sind und sich leicht ablösen. Bruch: erdig. Weich; elastisch-biegsam. Sp. Gew. = 1,1 — 1,2. Matt. Gelblichgrau bis leberbraun. Beim Verbrennen einen sehr unangenehmen Geruch entwickelnd. Scheint ein mit Bitumen gemengter Thon zu seyn.

5. Pechkohle.

Syn. Gagat ꝛ. Th. Jayet ꝛ. Th. Pitch-Coal ꝛ. Th.

Derbe Massen, dicht, häufig zerborsten und zerklüftet, selten noch Spuren von Holzgestalt und Holztextur wahrnehmbar. Bruch: vollkommen muschelig. H. = 2,5. Spröde. Sp. Gew. = 1,2 — 1,3. Mehr oder weniger starker Fettglanz. Pech- und sammet-schwarz. Bläht sich beim Glühen auf; das Pulver wird, im verschlossenen Raume gegläht, weich und backt zusammen.

Findet sich in den Braunkohlen-Niederlagen verschiedener Gegenden. Miesbach in Baiern; Häring in Tyrol; Sulzfeld in Franken; Utweiler am Siebengebirge; Meißner in Hessen; Käpf-nach bei Zürich; Farber; Grönland.

Manche Pechkohlen sind offenbar nur durch Einwirkung basaltischer Gebilde umgewandelte Braunkohlen; während andere ihr Entstehen dem Drucke der aufliegenden Massen und der dadurch entstandenen Wärme zu verdanken haben mögen. Basaltische Gesteine durchbrachen oder bedeckten Braunkohlen-Ablagerungen und übten auf dieselben auf größere oder geringere Weite einen mehr oder minder ändernden Einfluß aus; wie dieß namentlich am Meißner, Hirschberge und Habichtswald in Hessen

genau zu beobachten ist *). Aber die Pechkohle ist am Meißner nur das Produkt entfernterer Einwirkung, zwischen ihr und dem Basalt liegen noch die sogenannten Glanz- und Stangenkohlen, welche von einigen Mineralogen dem Anthrazit beigezählt werden; jedoch zeigen beide einen, wenn auch nicht bedeutenden Bitumengehalt; während dieser bei der Pechkohle am stärksten ist, läßt die Stangenkohle, welche der Einwirkung des Basalts am meisten ausgesetzt gewesen, oft nur geringe Spuren von Bitumen wahrnehmen.

Glanzkohle: derbe Massen, geradschalig abgesondert, selten unvollkommen stängelig. Die einzelnen Theile mehr oder minder fest zusammenhängend. Bruch: vollkommen groß- und flachmuschel. $\rho = 2,5$. Etwas spröde. Sp. Gew. = 1,35. Starker metallähnlicher Glanz. Pech-, sammet-, zuweilen auch eisen-schwarz; manchmal bunt angelaufen. — Hierher scheint auch die sogenannte Schuppenkohle von Häring in Tyrol zu gehören.

Stangenkohle: derbe Massen mit mehr oder minder vollkommen stängeliger Absonderung. Die einzelnen Säulchen, 1 Linie bis 1 Zoll stark und fast stets etwas gekrümmt und gewunden, sind theils fest mit einander verbunden, theils zeigen sie nur sehr geringen Zusammenhalt. Bruch: muschel. $\rho = 2,5$. Spröde. Sp. Gew. = 1,59. Fettglänzend bis matt. Graulich-, eisen- oder pechschwarz; auf den Kluftflächen häufig bunt angelaufen.

Alle drei Kohlenarten gehen ineinander über, Streifen von Glanzkohle durchziehen die Stangenkohle, und die Pechkohle wird zur Glanzkohle durch Annahme von schaliger Absonderung. Hier scheint doch die Entweichung des Bitumen-Gehalts auf diese Absonderungs-Verhältnisse mit eingewirkt zu haben.

6. Erdkohle

Syn. Erdige Braunkohle. Bituminöse Holzerde. Boix bitumineux terreux. Lignite terreux. Earth-Coal. Earthy Brown-Coal.

Derbe Massen, aus staubartigen, mehr oder weniger verbundenen Theilen bestehend. Bruch: erdig. Zerreiblich. Matt.

*) Siehe v. Leonhard, die Basalt-Gebilde in ihren Beziehungen zu normalen und abnormen Felsmassen. Stuttgart, 1852. 2te Abtheilung pag. 286 — 508.

Schwärzlich-, holz-, bis gelblichbraun und gelblichgrau. Färbt etwas ab und fäht sich mager an, brennt leicht und mit heller Flamme.

Kommt mit bituminösem Holze und mit Braunkohle an verschiedenen Orten vor, wie am Meißner in Hessen; zu Urtern, Helbra bei Eisleben und Kaltennordheim in Thüringen; in der Gegend von Leipzig, Merseburg und Halle; zu Fromsberg und Carolath in Schlesien; in der Gegend von Köln u. s. w.

Hierher gehört die sogenannte Köllnische Umbra oder Köllnische Erde, welche nur eine Modifikation der Erdkohle ist.

7. Alaunerde.

Syn. Erdige Aiterkohle. Terre alumineuse. Alum-Earth.

Derbe Massen, von mehr oder minder festem Zusammenhalt; im Großen meist schieferig. Bruch: erdig. Weich und milde. Sp. Gew. = 1,2 — 1,7. Matt. Schwärzlichbraun bis braunlichschwarz; auch graulichschwarz. Strich: Glänzend. B. d. L. schwefelige Säure entwickelnd ohne zu brennen, und sich braunroth färbend.

Findet sich theils im Braunkohlen-Gebirge, theils im Diluvium. Freienwalde in Brandenburg; Schwemmsal bei Leipzig; Muskau in der Lausitz; an mehreren Orten in Böhmen; Nühren; Friesdorf unfern Bonn; Ungarn; Vivarrais u. s. w.

Die Braunkohlen werden, gleich den Schwarzkohlen, vorzüglich als Brennmaterial benutzt, geben aber keine so intense Hitze als diese. Schwefelkiesreiche Braunkohlen werden mit Vortheil in Meilern entschwefelt oder verfoakt, und sind dann zu manchen Zwecken brauchbar; einige, namentlich erdige Braunkohlen-Arten, lassen sich nur dann zur Feuerung benutzen, wenn sie vorher eingesumpft in Formen, gleich den Ziegeln, gestrichen und getrocknet werden. — Die Pechkohle wird, wie der Gagat, zu verschiedenen Gegenständen des Schmucks, wie zu Halsschmuck, Kreuzen, Ohrgehängen, Dosen u. s. w. verarbeitet, und kommt zuweilen unter der Benennung: schwarzer Bernstein, im Handel vor. — Die Köllnische Umbra wird zur braunen Farbe verwendet. Die Alaunerde gebraucht man zur Ausbringung des Alauns und die Asche aller Braunkohlen-Arten gibt ein gutes Düngmittel ab.

zu besuchenden Gegend bekannt mache und sich genau merke, was an jedem einzelnen Orte vorkommt. Als Stellen, welche für das Sammeln günstig, sind vorzüglich Grubenbaue, alte Halben und Steinbrüche zu empfehlen. — Es ist jedoch häufig das Selbst-Sammeln mit eigenen Schwierigkeiten verknüpft; zuweilen findet man die in einer Gegend vorkommenden Mineralien gar nicht im Bruche, oder sie kommen überhaupt so vereinzelt vor, daß nur Anwohnende dieselben erhalten können. Dazu kommt, daß das Selbst-Sammeln häufig mit großem Kostenaufwande verbunden ist, der durch Boten- und Trägerlohn, durch Transportkosten u. s. w. noch vermehrt wird.

Besondere Sorgfalt hat der Sammler ferner auf das Verpacken der Mineralien zu verwenden, da Unerfahrenheit hierin eine Zerstörung der seltensten und schönsten Stücke, zumal zarter Krystalle zur Folge haben kann. In dieser Hinsicht ist besonders Folgendes zu beobachten:

a. Man trenne die großen, harten und schweren Exemplare von den zarten, leichten und zerbrechlichen, und umwicke jene doppelt mit Papier, wozu man am Besten Druckpapier nimmt.

b. Die zarten und leichten Stücke umwickelt man erst mit weichem Papier, sodann mit Berg und hierauf noch mit starkem Druckpapier. Weiche und zerbrechliche Mineralien verlangen eigene Vorsicht, und werden daher am sichersten, besonders an den Stellen, wo sie vorzüglich zu schonen sind, vorerst mit Baumwolle überlegt, und dann, wie oben angegeben, weiter verpackt. Sehr zerbrechliche Stücke kann man durch besonderes Einpacken in eine kleine Schachtel vor Schaden hüten. Krystalle aber, deren Zartheit gar kein Umwickeln gestatten, ohne daß eine Verletzung der Exemplare zu befürchten wäre, sucht man durch Aufleimen in eine Schachtel zu schützen, und wählt dazu den Theil des Stückes, der am wenigsten zu verletzen ist. Will man das Exemplar wieder abnehmen, so muß vorher der Leim durch Eintauchen in heißes Wasser aufgelöst werden.

c. Nachdem auf diese Weise Alles zur weiteren Verpackung in die Kiste vorbereitet ist, wird jene vorgenommen. Der Boden der Kiste wird zuerst mit einer Schichte Heu oder Moos belegt und dann die nach a verpackten Mineralien fest nebeneinander gereiht, so daß selbst bei starker Bewegung kein Verrücken, kein Reiben der Stücke möglich ist. Hat man auf diese Art

eine Lage von Mineralien eingepackt, so werden die in derselben etwa noch befindlichen Lücken entweder mit kleinen Exemplaren oder mit Papier ausgestopft und dann über diese wieder eine Schichte Moos oder Heu ausgebreitet, und darauf abermals eine Steinlage gesetzt u. s. w. Die leichten und zerbrechlichen Stücke werden oben hin gepackt. Ehe der Deckel auf die Kiste kommt, wird noch eine Lage Heu auf die letzte Schichte von Mineralien gethan, so daß kein Zwischenraum bleibt und das Ganze fest und unbeweglich eingeschlossen ist. Die Größe der Kiste richtet sich nach der Anzahl der zu verpackenden Stücke; ist dieselbe beträchtlich, so nehme man lieber zwei kleine Kisten, als eine zu große, weil die Verpackung in ersteren sorgfältiger geschehen kann.

2. Auch dem eifrigsten Sammler ist es in vielen Fällen nicht gestattet, sich alle Mineralien durch Selbst-Sammeln zu verschaffen, es bleibt dann öfters nur der Kauf oder Tausch übrig. Mineralien, welche in entfernten Gegenden, die weiter keine Ausbeute liefern, vorkommen, können oft nur von Mineralien-Handlungen angeschafft werden; schon der Kauf in größeren Quantitäten erleichtert diesen die Anschaffung. Was die Preise der Mineralien betrifft, so sind diese sehr relativ und hängen von verschiedenen Umständen ab. Seltenheit des Vorkommens, Ausgezeichnetes der Krystallisation, Schönheit und Reinheit der Farbe, gefälliges Format, haben besonders Einfluß auf die Bestimmung derselben. Die Kataloge der Mineralien-Handlungen geben daher die Preise auch nicht genau, sondern in der Regel im Mittel an. Der Kauf selbst geschieht entweder in einzelnen Stücken, oder in schon geordneten größeren oder kleineren Sammlungen. Beide Arten haben ihre Vorzüge; während die erste zum allmäligen Besitze der Mineralkörper führt, und man dadurch nach und nach dieselben kennen lernt, gewährt letztere sogleich einen systematischen Ueberblick über das Ganze, und ist in der Regel mit einem geringeren Kosten-Aufwande verbunden *).

*) Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir auf das Unternehmen, welches das Heidelberger Mineralien-Komptoir beabsichtigt, oryktognostische Sammlungen in Lieferungen herauszugeben, um die Anschaffung Jedem möglichst zu erleichtern, aufmerksam zu machen. Das Ganze wird nach dem Systeme geordnet und bestimmt seyn, welches ich befolgte, und die wichtigsten Mineralien enthalten. Ueber das Ausführlichere verweise ich, auf die, diesem Hefte beigefügte, Anzeige.

3. Tausch; bei diesem lassen sich keine bestimmten Normen festsetzen, da Alles auf Uebereinkunft beruht.

Bei Anlage und Aufstellung einer Sammlung hat man die Behandlung der Mineralien vor dem Einordnen und dann dieses selbst zu beachten. Ehe Letzteres geschieht, müssen die Stücke formatisirt, d. h. die größeren derselben in das festgesetzte Format gebracht werden. Zum Formatisiren gebraucht man vorzüglich Hämmern verschiedener Größe, einen Meißel, eine Zange und eine Platte von Eisen. Zum Zerschlagen der Stücke gehört eine eigene Fertigkeit, die man nur durch Uebung erlangen kann. In vielen Fällen, wo durch die Erschütterung des Schlagens zarte Krystalle oder, bei Zerbrechlichkeit des Stückes, andere charakteristische Theile abspringen könnten, gebraucht man lieber die Zange, oder bei harten Mineralien, die Säge zum Formatisiren. Letztere wird jedoch selten angewendet, da sie eine ziemlich kostbare Vorrichtung erfordert und das Geschäft auch sehr viel Zeit hinweg nimmt.

Eine andere Arbeit vor dem Einordnen ist das Reinigen der Mineralien, indem Alles nicht zur Wesentlichkeit des Minerals Gehöriges, aller Schmutz, der nur den Charakter desselben verbirgt, entfernt werden muß. Bei gewissen Stufen wird um dieses nur durch bloßes Abblasen oder Abbürsten geschehen können, wie z. B. bei den Salzen, bei den meisten aber läßt sich das Waschen anwenden, wodurch sie bei Weitem reiner und schöner werden. Dieß kann namentlich bei allen den Mineralien Statt finden, welche nicht durch Wasser aufgelöst werden und deren Charakter nicht dadurch verwischt wird, wie z. B. manche Ockerarten. Das Waschen selbst geschieht in reinem Wasser mit Bürsten oder Pinseln, je nach dem Sorten der Stücke. In manchen Fällen ist es sehr zweckmäßig, die Exemplare vor dem Waschen längere Zeit im Wasser liegen zu lassen, weil dadurch der fest anhängende Schmutz abweicht, auch kann man bei manchen Mineralien warmes Wasser zum Reinigen anwenden, und bei solchen, die durch Säuren nicht angegriffen werden, selbst das Wasser mit etwas Salz- oder Salpetersäure vermischen, wodurch die Reinigung ebenfalls schneller und vollständiger bewirkt wird. Nach dem Waschen werden die Stücke zum Trocknen auf Fließpapier gelegt.

Vor dem Einordnen ist ferner noch die Bezeichnung der ein-

zelnen Exemplare vorzunehmen, welches entweder durch Etiquetten oder durch Nummeriren und Aufnahme eines Katalogs geschieht. Unter Etiquette versteht man eine gedrängte Beschreibung eines Minerals auf einem Papierblättchen, das genau in das Pappkästchen paßt, in welches jenes gelegt wird. Sie enthält die Angabe des Fundorts, die systematische Benennung und wo möglich die wichtigsten Merkmale wie z. B. die Angabe der Krystallisations-Form u. s. w.; auch ist es zweckmäßig, die brechenden Mineralien anzugeben, das Gestein, in welchem das Mineral eingewachsen ist &c. Die Fertigung eines Katalogs ist mühsam und mit manchen Schwierigkeiten verbunden, und die Etiquetten diesem vorzuziehen; denn während man hier die Bezeichnung sogleich vor Augen hat, ist man dort genöthigt, nach der Nummer, welche das Stück trägt, den Katalog nachzuschlagen, und ist dieser systematisch geordnet, so muß ihm wieder ein Register über die Nummern beigegeben seyn, denn da kein Cabinet als ein geschlossenes Ganzes betrachtet werden kann, so müssen die Nummern fortlaufen und im Katalog, wie in der Sammlung, werden die Stücke nicht gerade hinter einander zu stehen kommen. Bei einer öffentlichen Sammlung werden beide Methoden der-
nung am Besten vereinigt vorgenommen.

Die Schränke, welche man zum Aufbewahren von Mineralien gebraucht, müssen gut gearbeitet, die Schubladen leicht auf- und zuzumachen und inwendig durch schmale Leisten in Gefache getrennt seyn. Die einzelnen Exemplare kommen in Pappkästchen zu liegen, welche genau zwischen die Leisten in den Schubladen passen, wodurch das Feststehen derselben bewirkt und das Reiben an einander verhütet wird. Die Schränke müssen ferner mit genau schließenden Thüren versehen seyn.

Ist durch Formatisiren, Reinigen und richtige Bestimmung das Einordnen vorbereitet, so wird mit diesem selbst begonnen, nachdem man vorher irgend ein System zur Grundlage seiner Ordnung angenommen hat. Man reiht die vorhandenen Stücke einer Species nach dem Ausgezeichneten ihrer Merkmale so aneinander, wie diese im System abgehandelt werden. Nach dem unserigen würden z. B. zuerst die Krystalle, dann die Aggregate kommen, und bei diesen die blättrigen, faserigen &c. und die Mittelglieder immer zwischen dieselben geordnet werden. Beim

Einräumen sehe man darauf, daß da, wo Gattungen oder Arten fehlen, Lücken gelassen werden, indem man sich durch diese Vorsicht beim Einschalten oft viele Mühe und Zeit erspart.

Was die Aufbewahrung der Sammlung betrifft, so suche man die Stücke vorzüglich vor Staub zu schützen; dieß ist jedoch bei aller Vorsicht nicht immer möglich, und es ist daher zweckmäßig, alle Exemplare, welche dadurch gelitten haben, von Zeit zu Zeit zu reinigen. Salze werden am besten in verschlossenen Gläsern gegen die Einwirkung der Luft geschützt, andere Mineralarten, wie z. B. Strahlkies, werden, um sie vor Zersetzung zu hüten, in eine Auflösung von Hausenblase in verdünntem Wein-geiste getaucht, und sodann langsam getrocknet. Lose Krystalle legt man entweder frei in das Pappkästchen, oder man befestigt sie auf kleinen Stativen von Holz oder Elfenbein u. s. w.

U e b e r s i c h t

der

Mineralien nach ihren Kernformen.

I. Tesseralsystem.

1. Würfel.

	Seite		Seite
Analzim	195	Nickel-Antimon-glanz	383
Bleiglanz	317	Nickelglanz	—
Chlor-silber	418	Selen-silber	420
Gediegen-Gold	428	Silberglanz	419
„ Kupfer	385	Speiskobalt	376
„ Silber	417	Steinsalz	88
„ Platin	432	Würfelerz	354
Leuzit	186	Zinnfies	404
Manganglanz	288		

2. Regelmäßiges Oktaeder.

Mann	143	Iserin	364
Arsenitblüthe	78	Kalk, flus-saurer	104
Bunt-Kupfererz	408	Kobaltkies	375
Chromeisen	367	Magneteisen	336
Diamant	81	Pyrochlor	271
Franklinit	374	Roth-Kupfererz	386
Gahnit	309	Salmiak	94
Gediegen-Eisen	334	Spinell	149
„ Wismuth	299	Titaneisen	363

3. Achten Dodekaeder.

Amalgam	427	Haupn	212
Blende	305	Lafurstein	213
Granat	220	Sodalit	194

4. Tetraeder.

	Seite		Seite
Borazit	131	Helvin	392
Fahlerz	411	Kiesel-Wismuth	302

5. Pentagon-Dodekaeder.

Eisenties	345	Glanzkobalt	379
-----------	-----	-------------	-----

II. Tetragonal-System.

6. Gerade quadratische Säule.

Apophyllit	169	Rutil	267
Blei-Hornerz	325	Tellurblei	333
Chlor-Quecksilber	413	Thomsonit	208
Idokras	223	Wernerit	215
Menakan (?)	364	Yttererde, phosphorsaure	325

7. Quadratisches Oktaeder.

Anatas	265	Honigstein	437
Bleioryd, molybdänsaures	329	Kupferkies	409
„ scheelsaures	328	Nigrin	371
Braunit	285	Scheelit	274
Fergusonit	273	Uranlimmer	280
Gediegen-Palladium	434	Zinnerz	313
Hausmannit	284	Zirkon	259

III. Rhombisches System.

8. Gerade rektanguläre Säule.

Bourmonit	407	Kryolith	141
Chrysoberyll	288	Menilit	255
Chrysolith	246	Pikrosmin	233
Gehlenit	223	Polymignit	271
Harmotom	210	Stilbit	208
Kalk, schwefelsaurer	107	Tantalit	371

9. Rhombisches Oktaeder.

Antimonglanz	296	Schwefel	74
Fluellit	141	Skorodit	352
Lazulith	148		

10. Rektangulär-Oktaeder.

Blei-Bitriol	319	Phosphorkupfer, rhombi- sches	393
--------------	-----	----------------------------------	-----

11. Rektangulär-Ditetaeder.

Antimonbläthe	394	Bleioryd, kohlen-saures	325
Arragon	125	Liebrit	359

12. Gerade rhombische Säule.

Ambligonit (?)	146	Anthrazit	84
Andalusit	171	Antimon-Silber	421

	Seite		Seite
Arsenit-Eisen	351	Eisenerz	385
Arsenitkies	355	Manganit	286
Arsenit-Nickel	381	Mascagnin	95
Antipigment	80	Nesotyp	207
Barst, kohlensaurer	99	Olibenit	397
„ schwefelsaurer	96	Prehnit	210
Bleierz von Mendip	316	Polyhallit	133
Bittersalz	128	Pyrolusit	282
Brochantit	390	Saundersit (?)	226
Chiasolith	171	Schifterz	430
Cordierit	248	Schwarzgültigerz	422
Diaspor (?)	140	Staurolith	219
Epistilbit	205	Strahlkies	347
Euchroit	396	Strontian, kohlensaurer	103
Fahlunit (?)	250	„ schwefelsaurer	100
Jamesonit	331	Talk	232
Kali-Salpeter	86	Thénardit	90
Kali, schwefelsaures	87	Topas	181
Kieselzink	310	Vanquelin	405
Kupfer, salzsaures	388	Wavellit	145
Kupferglanz	384	Weistellur	434
Kupferglanz, prismatoïdischer	409	Wismuthglanz	501
Kupferschaum	401	Zink-Bitriol	307

IV. Klinorhombisches System.

13. Schiefe rektanguläre Säule.

Brewsterit	210	Kalk, wasserhaltiger schwefel-	
Eisenblau	349	saurer	109
Heulandit	204	Kobaltblüthe	378

14. Schiefe rhombische Säule.

Achmit	234	Gaylussit	123
Aeschnit	270	Glimmer, zweiariger	187
Antimonblende	297	Glauberzsalz	91
Angit	235	Hornblende	240
Baryto-Calcit	124	Huralit	369
Bleioryd, chromsaures	330	Kalk, arseniksaures	115
„ kohlenschwefelsaures	327	Kupfer-Blei-Bitriol	320
Botryogen	358	Kupferlasur	599
Bronzianit	112	Laumontit	202
Chondroit	248	Lithion-Glimmer (?)	199
Datolith	168	Malachit	398
Eisen-Bitriol	348	Margurit	425
Enklas	258	Natron, boraksaures	93
Gadolinit	263	„ kohlensaures	92

	Seite		Seite
Phosphorkupfer, klinorhombi-		Trona	92
sches	393	Turnerit	147
Realgar	78	Wolfram	373
Sillimanit	174	Wollastonit	166
Talk, phosphorsaurer	129	Yttrotantalit	272
Titanit	268		

15. Gerade rhomboidische Säule.

Epidot	225
--------	-----

V. Klinorhomboidisches System.

16. Schiefe rhomboidische Säule.

Albit	295	Kupfer-Bitriol	391
Anorthit	228	Labrador	227
Arinit	215	Periklin	197
Disthen	172	Triphan	198
Feldspath	183		

VI. Hexagonal-System.

17. Rhomboeder.

Alaunstein	142	Kalk, kohlensaurer	117
Bleiorpb, schwefel-kohlensaures	326	Korund	137
Bitterkalk	133	Kupferglimmer	304
Chabasie	206	Magnetit	130
Erichtonit	366	Mangan, kohlensaures	289
Diopas	402	Natron-Salpeter	88
Eisenorpb	337	Quarz	154
Eisenorpbul, kohlensaures	356	Rothgültigerz	425
Gediegen-Antimon	293	Sideroschistolith	360
„ Arsenit	77	Tellur-Bismuth	303
„ Tellur	298	Turmalin	210
Glimmer, einaxiger	258	Zinkspath	308
Ilmenit	365	Zinnober	414

18. Regelmäßige sechsseitige Säule.

Chlorit	252	Osmium-Iridium	435
Crostedtit	370	Pinit	189
Fluocerium, neutrales	151	Polylbast	427
Graphit	83	Pyrodimalith	369
Kalk, phosphorsaurer	113	Smaragd	256
Magnetkies	344	Talk-Hydrat	128
Molybdänglanz	276	Zinkenit	332
Nephelin	193	Zinkorpb	304

19. Bipyramidal-Dodekaeder.

Bleiorpb, arseniksaures	323	Pyromorphit	321
Gmelinit	209		

I n h a l t.

Einleitung.

	Seite.
Allgemeine Bemerkungen über Geologie, Geognosie und Drytognosie, und deren Zusammenhang § 1 — 3	5
Organische und unorganische Körper. Naturgeschichte § 4	7
Mineralien § 5	8
Einfache und gemengte Mineralien § 6	—
Mineralogie zerfällt in Drytognosie und Geognosie § 7	—
Lithurgie, chemische und topographische Mineralogie, Versteinerungskunde § 8	9
Hülfskenntnisse und Hülfsmittel der Mineralogie § 9	—
Vorbereitungslehre und System § 10	10

Erster Theil. Vorbereitungslehre.

Kennzeichenlehre, Systematik und Nomenclatur, Geschichte und Literatur § 11	11
---	----

Erster Abschnitt. Kennzeichenlehre.

Stereometrische, physikalische und chemische Kennzeichen § 12	—
---	---

1. Kennzeichen der Gestalt.

Äußere Form § 13	12
KrySTALLISIRTE und nicht krySTALLISIRTE Mineralien § 14	—
KrySTALL, KrySTALLISATION, Individuum § 15	13
KrySTALLOGRAPHIE § 16	—
Theile der KrySTALLE, Flächen, Kanten, Ecken § 17	—
Axen, Hauptaxen, Queraxen § 18	14
Nähere Benennung der Flächen, Kanten und Ecken § 19	—
KrySTALLSYSTEME: TrIGONAL-, TetragonAL-, rhombisches, Klinorhombisches, Klinorhomboidisches und HexagonAL-SYSTEM § 20	15
Bestimmung der Hauptaxe § 21	16
Grundformen § 22	—

	Seite
Würfel, regelmäßiges Oktaeder, Kanten-Dodekaeder, Tetraeder, Pentagon-Dodekaeder § 23	17
Gerade quadratische Säule, quadratisches Oktaeder § 24	18
Gerade rektanguläre Säule, rhombisches Oktaeder, rektanguläres Oktaeder, rektanguläres Ditetraeder, gerade rhombische Säul § 25	19
Schiefe rektanguläre Säule, schiefe rhombische Säule, gerade rhomboidische Säule § 26	21
Schiefe rhomboidische Säule § 27	22
Rhomboeder, regelmäßige sechsseitige Säule, ebenrandiges Bipyramidal-Dodekaeder § 28	—
Abänderungen der Krystalle § 29	25
Veränderung der Grundform nach dem Ebenmaß- oder nach dem Polaritäts-Gesetz § 30	24
Benennung der Modifikationen der Grundformen § 31	25
Bestimmung der Kernform § 32	26
Hemitropieen, Zwilling-Krystalle § 33	27
Unvollkommenheit der Krystalle, Platten, Nadeln § 34	—
Ein- und aufgewachsene Krystalle; Krystall-Drusen und Gruppen § 35	28
Konstanz der Kantenwinkel. Messen derselben. Goniometer § 36	29
Nachahmende und zufällige Gestalten § 37	—
Textur. Körniges, Blätteriges, Schaliges, Stängeliges § 38	—
Zusammenreihung krystallinischer Gestalten § 39	30
Stalaktiten, Stalagmiten und andere zufällige Gestalten § 40	31
Pseudomorphosen § 41	32
Stücke, Geschiebe, Gerölle, Körner, Sand § 42	—
Oberfläche der Mineralien § 43	—
II. Physikalische Kennzeichen.	
Begriff § 44	33
1) Kohärenz-Verhältnisse der Mineralien.	
Kohärenz; feste und flüssige Mineralien § 45	—
Struktur oder Gefüge der Mineralien § 46	34
Spaltbarkeit § 47	—
Bruch § 48	35
Absonderung § 49	36
Härte § 50	—
Spröde, Geschmeidigkeit, Dehnbarkeit, Biegsamkeit, Zersprengbarkeit § 51	37
2) Schwere.	
Begriff und Bestimmung der Schwere § 52	38
3) Optische Eigenschaften der Mineralien.	
Begriff § 53	39
a) Durchsichtigkeit. Grade derselben § 54	—
b) Strahlenbrechung. Begriff § 55	40
Doppelte Strahlenbrechung. Polarisation § 56	41
c) Glanz. Begriff § 57	—

	Seite
Arten des Glanzes § 58	41
Stärke des Glanzes § 59	42
d) Farbe. Farblose und gefärbte Mineralien. Stammfarben § 60 —	
Art der Farbe. Farbentabelle § 61	43
Grad der Farbe § 62	45
Ein- und mehrfarbig § 63	46
Veränderung der Farbe § 64	—
Strich § 65	—
e) Verschiedene Farben- und Licht-Erscheinungen:	
Farbenwechsel § 66	47
Farbenspiel § 67	—
Farbenwandlung § 68	—
Trisiren § 69	48
Lichtschein § 70	—
4) Phosphoreszenz. Begriff und Hervorbringung derselben § 71	49
3) Electricität. Begriff und Erregung derselben § 72	—
Positive und negative Electricität § 73	50
Pyro- oder Thermolectricität § 74	51
Verschiedenheit bei den Mineralien hinsichtlich der Hervorbringung der Electricität und der Fähigkeit sie zu behalten § 75	—
6) Magnetismus § 76	—
7) Geruch, Geschmack etc.	
Geruch § 77	52
Geschmack § 78	—
Verhalten gegen Wasser § 79	—
Anfühlen, Klang § 80	53

III. Chemische Kennzeichen.

Begriff. Chemisch-einfache und chemisch-zusammengesetzte Mineralien § 81	—
Unzerlegbare Bestandtheile; Elemente § 82	—
Nähere und entferntere Bestandtheile der Mineralien § 83	54
Salzbasen, Säuren, Dryde, Hydrate § 94	55
Stöchiometrie § 85	—
Isomorphismus, Dimorphismus § 86	56
Analysen § 87	57
Chemische Prüfung der Mineralien § 88	—
Prüfung der Mineralien auf trockenem Wege § 89	58
Untersuchung der Mineralien mittelst des Löthrohrs für sich § 90	59
Mit Zusätzen § 91	—
Prüfung der Mineralien auf nassem Wege § 92	60
Umwandelung verschiedener Mineralien § 93	61
Entstehung mancher Mineralsubstanzen § 94	62

Zweiter Abschnitt. Systematik und Nomenclatur.

	Seite
Allgemeine Bemerkungen § 95	65
Mineral-Species § 96	—
System, Grundsätze bei Aufstellung desselben § 97	64
Einfache Stoffe und unorganische Verbindungen und fossile organische Verbindungen § 98	65
Klassifikations-Stufen § 99	66
Nomenclatur § 100	—
Dritter Abschnitt. Geschichte und Literatur.	
Ältere Zeit § 101	67
Mittlere Zeit § 102	—
Neuere Zeit § 103	68
Literatur § 104	69

Zweiter Theil.

System.

Erste Haupt-Abtheilung. Einfache Stoffe und unorganische Verbindungen.

I. Klasse. Nichtmetallische Mineralien	73
Sauerstoff. Wasserstoff. Stickstoff. Chlor. Brom. Jod	—
Fluor	74

I. Gruppe. Schwefel.

1) Schwefel	—
-----------------------	---

II. Gruppe. Selen.

2) Selen-Schwefel	76
Phosphor.	

III. Gruppe. Arsenik.

3) Gebiegen-Arsenik	77
4) Arsenikbläthe	78
5) Realgar	—
6) Auripigment	80

IV. Gruppe. Kohlenstoff.

7) Diamant	81
8) Graphit	83
9) Anthrazit	84

V. Gruppe. Boron.

10) Boraxsäure	85
--------------------------	----

II. Klasse. Metalle.

I. Abtheilung. Leichte Metalle.

I. Ordnung. Metalle der Alkalien.

	Seite
VI. Gruppe. Kalium.	
11) Kali-Salpeter	86
12) Schwefelsaures Kali	87
VII. Gruppe. Natrium.	
13) Natron-Salpeter	88
14) Steinsalz	—
15) Ithenardit	90
16) Glaubersalz	91
17) Trona	92
18) Kohlen-saures Natron	—
19) Borax-saures Natron	93
Lithium	
VIII. Gruppe. Ammoniak.	
20) Salmiak	94
21) Mascagnin	95
IX. Gruppe. Baryum.	
22) Schwefelsaurer Baryt	96
1) Barytspath	97
2) Strahliger Baryt	98
3) Faseriger Baryt	—
4) Körniger Baryt	99
5) Dichter Baryt	—
6) Erdiger Baryt	—
23) Kohlen-saurer Baryt	—
X. Gruppe. Strontian.	
24) Schwefelsaurer Strontian	100
1) Cölestinspath	101
2) Strahliger Cölestin	102
3) Faseriger Cölestin	—
4) Dichter Cölestin	—
25) Kohlen-saurer Strontian	103
XI. Gruppe. Calcium.	
26) Kalisalpeter	104
27) Fluß-saurer Kalk	—
1) Flußspath	105
2) Flußstein	106
3) Flußerde	—
28) Schwefelsaurer Kalk	107
1) Anhydritspath	108
2) Strahliger Anhydrit	—
3) Körniger Anhydrit	—
4) Dichter Anhydrit	—
29) Wasserhaltiger schwefelsaurer Kalk	109
1) Gypsspath	110

	Seite
2) Faseriger Gyps	111
3) Schaumgyps	—
4) Körniger Gyps	—
5) Dichter Gyps	—
6) Erdiger Gyps	112
50) Bronzuarthin	—
51) Phosphorsaurer Kalk	113
1) Apatitspath	114
2) Faseriger Apatit	115
3) Erdiger Apatit	—
52) Arseniksaurer Kalk	—
53) Kohlensaurer Kalk	117
1) Kalkspath	119
2) Faseriger Kalk	120
3) Körniger Kalk	—
4) Schieferspath	121
5) Kalkstein	—
a) Stinkstein	—
b) Anthraconit	122
c) Mergel	—
d) Rogenstein	—
e) Kalktuff	—
6) Kalkerde	—
a) Kreide	123
b) Bergmilch	—
34) Gaylussit	—
35) Baryto-Calcit	124
36) Arragon	125
1) Arragonit	126
2) Strahliger Arragon	—
3) Faseriger Arragon	127

II Ordnung. Metalle der Erden.

XII. Gruppe. Magnium.

37) Talkhydrat	128
38) Bittersalz	—
40) Phosphorsaurer Talk	129
41) Magnesit	130
1) Magnesitspath	—
2) Dichter Magnesit	131
42) Borazit	—
43) Polyhalit	133
44) Bitterkalk	—
1) Bitterspath	134
2) Dolomit	135

Anhang:	Seite
a) Gurbossan	135
b) Konit	156
Beryllium	

XIII. Gruppe. Yttrium.

45) Phosphorsaure Yttererde	—
---------------------------------------	---

XIV. Gruppe. Aluminium.

46) Korund	137
1) Saphir	138
2) Korund	—
3) Smirgel	—
47) Diaspor	140
48) Gibbsit	—
49) Fluellit	141
50) Kryptolith	—
51) Aluminat	142
52) Alaunstein	—
53) Alaun	143
54) Bawellit	144
Anhang:	
Kalait	145
55) Ambigonit	146
56) Phosphorsaurer Thon	147
57) Turnerit	—
58) Lazulith	148
59) Spinell	149
1) Rother Spinell	—
2) Blauer "	150
3) Pleonast	—
Zirkonium	151
Thorium	—

XV. Gruppe. Cerium.

60) Neutrales Fluorcerium	—
61) Basisches " "	152
62) Kohlensaures Cerorydul	—
63) Nitrocerit	153

XVI. Gruppe. Silicium.

64) Quarz	154
1) Bergkry stall	155
2) Amethyst	156
3) Gemeiner Quarz	—
a) Rosenquarz	157
b) Siderit	—
c) Stinkquarz	—
d) Katzenauge	—

	Seite
e) Prasem	157
f) Faserquarz	—
g) Avanturin	158
h) Eisenkiesel	—
i) Fulgurit	—
4) Chalzedon	—
a) Karniol	159
b) Heliotrop	—
c) Chrysopras	—
5) Feuerstein	160
6) Hornstein	—
7) Jaspis	161
a) Gemeiner Jaspis	—
b) Kugel-Jaspis	—
c) Band-Jaspis	—
8) Kieselstiefer	162
9) Achat	—
10) Kieselstuf	—
65) Opal	163
1) Edler Opal	—
2) Feuer-Opal	164
3) Gemeiner Opal	—
4) Halboval	—
5) Hyalith	165
6) Menilith	—
7) Racholong	—
8) Jaspopal	166
66) Wollastonit	—
67) Okenit	167
68) Datolith	—
1) Datolith	168
2) Botryolith	169
69) Apophyllit	—
70) Pektolith	170
71) Andalusit	—
72) Chiasolith	171
73) Disthen	172
74) Sillimanit	174
75) Wörthit	—
76) Tripel	175
77) Cimolit	—
78) Bol	176
79) Steinmark	177
80) Halloisit	—

	Seite
81) Bergseife	178
82) Pholerit	—
83) Kaolin	179
84) Allophan	180
85) Kollyrit	—
86) Topas	181
1) Topas	182
2) Pyrophyllith	183
3) Pyknit	—
87) Feldspath	—
1) Adular	185
2) Gemeiner Feldspath	—
3) Glasiger Feldspath	186
4) Feldstein	—
88) Lenzit	—
99) Zweiaxiger Glimmer	187
90) Pinit	189
91) Bildstein	—
92) Obsidian	190
93) Bimsstein	191
94) Perlstein	192
95) Pechstein	—
96) Nephelin	193
97) Sodalith	194
98) Analcim	195
99) Albit	—
100) Periklin	197
101) Petalit	198
102) Triphan	—
103) Lithionglimmer	199
104) Harmotom	200
105) Brewsterit	201
106) Raymondit	202
107) Stilbit	203
108) Heulandit	204
109) Epistilbit	205
110) Chabasie	206
111) Mesotyp	207
112) Thomsonit	208
113) Smelinit	209
114) Prehnit	210
115) Karpolit	211
116) Sanyn	212
117) Lasurstein	213
118) Wernerit	—
Stum, Dryftognoße.	

	Seite
119) Arint	215
120) Turmalin	216
1) Wasserheller Turmalin	218
2) Rother	—
3) Blauer	—
4) Grüner	—
5) Gelber	—
6) Brauner	—
7) Schwarzer	—
121) Staurolith	219
122) Granat	220
1) Rother Granat	221
2) Gelber	222
3) Grüner	—
4) Brauner	—
5) Schwarzer	—
123) Gehlenit	223
124) Idokras	—
125) Epidot	225
126) Saussurit	226
127) Labrador	227
128) Anorthit	228
129) Meerschaaum	229
130) Speckstein	230
131) Dphit	231
132) Talt	232
133) Pikrosmin	233
134) Achmit	234
135) Augit	235
1) Diopsid	237
2) Malakolith	—
3) Hedenbergit	—
4) Augit	238
5) Kukulith	—
6) Diallag	239
7) Bronzit	—
8) Hypersthen	—
136) Hornblende	240
1) Grammatit	242
2) Strahlstein	—
3) Hornblende	—
4) Anthophyllit	243
Anhang: Aebest	—
a) Amianth	244
b) Aebest	—

	Seite
c) Bergholz	—
d) Bergkork	245
137) Schillerspath	—
138) Chrysolith	246
139) Chondroit	248
140) Cordierit	—
141) Fahlunite	250
142) Sordawallith	—
143) Nephrit	251
144) Pyrophyllit	252
145) Chlorit	—
146) Einaxiger Glimmer	253
147) Melilit	255
148) Chrysoberyll	—
149) Smaragd	256
1) Smaragd	257
2) Beryll	—
150) Enklas	258
151) Birkon	259
152) Eudialit	260
153) Thorit	261
154) Cerit	262
155) Allanit	—
156) Gadolinit	263
157) Orthit	264
II. Abtheilung. Schwere Metalle	265
XVII. Gruppe. Titan.	
158) Anatas	—
159) Rutil	267
160) Titanit	268
161) Meschnit	270
162) Pyrochlor	271
163) Polymignit	272
XVIII. Gruppe. Tantal.	
164) Ottrotantalit	—
165) Fergusonit	273
XIX. Gruppe. Scheel.	
166) Scheelit	274
XX. Gruppe. Molybdän.	
167) Molybdänocker	276
168) Molybdänglanz	277
XXI. Gruppe. Chrom.	

169) Chromocer	278
----------------	-----

XXII. Gruppe. Uran.

170) Uran-Pecherz	—
171) Uranocer	279
172) Johannit	280
173) Uranglimmer	—

XXIII. Gruppe. Mangan.

174) Pyrolusit	282
175) Hausmannit	284
176) Braunit	285
177) Manganit	286
178) Wad	287
179) Manganglanz	288
180) Kohlenfaures Mangan	289
181) Psilomelan	290
182) Kiesel-Mangan	291
183) Helvin	292

XXIV. Gruppe. Antimon.

184) Gebiegen-Antimon	293
185) Antimonblüthe	294
186) Antimonocer	295
187) Antimonglanz	296
188) Antimonblende	297

XXV. Gruppe. Tellur.

189) Gebiegen-Tellur	298
----------------------	-----

XXVI. Gruppe. Wismuth.

190) Gebiegen-Wismuth	299
191) Wismuthocer	300
192) Wismuthglanz	301
193) Kiesel-Wismuth	302
194) Tellur-Wismuth	303

XXVII. Gruppe. Zink.

195) Zinkoxyd	304
196) Blende	305
1) Blätterige Blende	306
2) Strahlige Blende	307
3) Faserige Blende	—
197) Zink-Bitriol	—
198) Zinkspath	308
199) Gahnit	309
200) Kieselzink	310
Adm i u m	311

	Seite
XXVIII. Gruppe. Zinn.	
201) Zinnerz	312
1) Späthiges Zinnerz	313
2) Faseriges Zinnerz	—
XXIX. Gruppe. Blei.	
202) Gediegen-Blei	315
203) Mennig	—
204) Cotunnit	316
205) Bleierz von Mendip	—
206) Bleiglanz	317
207) Blei-Bitriol	319
Anhang:	
Kupfer-Blei-Bitriol	320
208) Selenblei	—
209) Pyromorphit	321
210) Arseniksaures Bleiorz	323
211) Kohlensaures Bleiorz	—
Anhang:	
Bleierde	325
212) Blei-Horners	—
213) Schwefel-kohlensaures Bleiorz	326
Anhang:	
Kohlen-schwefelsaures Bleiorz	327
214) Bleigummi	—
215) Scheelsaures Bleiorz	328
216) Molybdänsaures Bleiorz	329
217) Chromsaures Bleiorz	330
218) Jamesonit	331
219) Zinkenit	332
220) Tellurblei	333
XXX. Gruppe. Eisen.	
221) Gediegen-Eisen	334
Anhang:	
Meteorstein	335
222) Magneteseisen	336
223) Eisenoxyd	337
1) Eisenglanz	338
a) Späthiger Eisenglanz	—
b) Eisenglimmer	—
c) Strahliger Eisenglanz	339
2) Roth-Eisenstein	—
a) Faseriger Roth-Eisenstein	—
b) Dichter Roth-Eisenstein	—

	Seite
e) Roth-Eisenerz	539
d) Roth-Eisenerz	540
224) Eisenoryd-Hydrat	—
1) Braun-Eisenstein	541
a) Rubinglimmer	—
b) Lepidokrokit	—
c) Faseriger Braun-Eisenstein	—
d) Dichter Braun-Eisenstein	542
e) Braun-Eisenerz	—
2) Gelb-Eisenstein	543
Gelber Thon-Eisenstein	—
a) Schalliger gelber Thon-Eisenstein	—
b) Bohnerz	—
225) Magnetties	544
226) Eisenties	545
227) Strahltes	547
228) Eisen-Bitriol	548
229) Grün-Eisenstein	549
230) Eisenblau	—
1) Späthiges Eisenblau	550
2) Erdiges Eisenblau	551
231) Karpföfiderit	—
232) Arsenit-Eisen	—
233) Strodit	552
234) Eisensinter	553
235) Würfelers	554
236) Arsenitties	555
237) Kohlenfaures Eisenorydul	556
1) Eisenspath	—
2) Sphärosiderit	257
Anhang:	—
Thoniger Sphärosiderit	—
238) Botryogen	558
239) Hisingerit	—
240) Lievrit	559
241) Sideroschistolith	560
242) Grünerde	561
243) Krokpydolith	—
244) Gelberde	562
245) Kalkstein	—
246) Titaneisen	563
247) Iserin	564
248) Menakan	—
249) Ilmenit	565
250) Erichsonit	566
251) Chromeisen	567

	Seite
252) Triplit	—
253) Petepozit	368
254) Suraulit	369
255) Pyrodmalith	—
356) Cronstedtit	370
257) Nigrin	371
258) Tantalit	—
259) Wolfram	373
260) Franklinit	374

XXXI. Gruppe. Kobalt.

261) Kobaltkies	375
262) Kobalt-Bitriol	376
263) Speiskobalt	—
Anhang:	
Faseriger Speiskobalt	377
264) Kobaltblüthe	378
265) Glanzkobalt	379
266) Erdkobalt	380

XXXII. Gruppe. Nickel.

267) Schwefelnickel	381
268) Arsenitnickel	—
269) Nickelocker	382
270) Nickelglanz	383
271) Nickel-Antimonglanz	—

XXXIII. Gruppe. Kupfer.

272) Gebiegen-Kupfer	385
273) Roth-Kupfererz	386
Anhang:	
Ziegelerz	387
274) Kupferschwärze	—
275) Salzsaurer Kupfer	388
276) Kupferglanz	389
277) Kupferindig	390
278) Brochantit	—
279) Kupfer-Bitriol	381
280) Selenkupfer	392
281) Rhombisches Phosphorkupfer	—
282) Klinorhombisches Phosphorkupfer	393
283) Erinit	394
284) Kupferglimmer	—
285) Linsenerz	395
286) Euchroit	396
287) Olivenit	397

	Seite
288) Malachit	598
1) Blätteriger Malachit	—
2) Faseriger Malachit	—
3) Dichter Malachit	399
4) Erdiger Malachit	—
289) Kupferlasur	—
290) Kupferschaum	401
291) Dioptas	402
292) Kieseltupfer	—
293) Wismuth-Kupfererz	403
294) Zinnkies	404
295) Selen-Bleitupfer	—
Anhang:	
Selen-Kupferblei	405
296) Banquelinitt	—
297) Nadel erz	406
298) Bournonit	407
299) Prismatoidischer Kupferglanz	—
300) Bunt-Kupfererz	408
301) Kupferkies	409
302) Fahlerz	411
XXXIV. Gruppe. Quecksilber.	
303) Gediegen-Quecksilber	413
304) Chlor-Quecksilber	—
305) Zinnober	414
Anhang:	
Lebererz	415
306) Selen-Quecksilber	416
307) Selen-Quecksilberblei	—
XXXV. Gruppe. Silber.	
308) Gediegen-Silber	417
309) Chlorsilber	418
310) Jod-Silber	419
311) Silberglanz	—
312) Selen-Silber	420
313) Kohlen-saures Silberoxyd	—
314) Antimon-Silber	421
315) Schwarzgültigerz	422
316) Rothgültigerz	423
317) Miargyrit	425
318) Wismuth-Silbererz	—
319) Silber-Kupferglanz	426
320) Esfairit	—
321) Polybasit	427

322) Amalgam	Seite.
	427
XXXVI. Gruppe. Gold.	
323) Gebiegen-Gold	428
Anhang:	
Silbergold	430
324) Schrifsterz	—
325) Weistellur	431
XXXVII. Gruppe. Platin.	
326) Gebiegen-Platin	432
XXXVIII. Gruppe. Palladium.	
327) Gebiegen-Palladium	434
Rhodium	—
Iridium	—
XXXIX. Gruppe. Osmium.	
328) Osmium-Iridium	435
Zweite Haupt-Abtheilung.	
Fossile organische Verbindungen.	
I. Abtheilung. Organisch-saure Salze	436
XL. Gruppe. Organisch-saure Salze.	
329) Humboldtfit	—
330) Honigstein	437
II. Abtheilung. Organische Oxyde	438
XLI. Gruppe. Bitume.	
331) Bernstein	—
332) Retinit	440
333) Hatchettin	441
334) Scheererit	—
335) Erdöl	442
336) Elaterit	443
337) Asphalt	—
XLII. Gruppe. Kohlen.	
338) Schwarzkohle	445
1) Schieferkohle	446
2) Grobkohle	447
3) Faserkohle	—
4) Rännelkohl	448
5) Gagat	—
6) Rußkohle	—
339) Braunkohle	450
1) Bituminöses Holz	—

	Seite
2) Gemeine Braunkohle	451
3) Moorkohle	452
4) Papierkohle	—
5) Pechkohle	453
6) Erdkohle	454
7) Maunerde	455
<hr/>	
Ueber das Sammeln von Mineralien	457
Uebersicht der Mineralien nach ihren Kernformen	475

V e r b e s s e r u n g e n .

Seite	Zeile	
5	9	von D. lies hatte statt hat.
16	1	U. nach kann sehe man noch die Worte: mit Ausnahme der Erscheinungen, welche der Dimorphismus bietet.
18	11	D. lies vier und zwanzig statt zwölf.
25	11	„ „ umgeänderten statt ungeänderten.
31	17	„ „ anderen statt andere.
33	42 und 1	von U. lies Kohärenz statt Koherenz.
37	12	von U. lies Abspringen statt Anspringen.
40	7	„ „ Gegenstandes statt Genstandes.
48	9	„ D. „ zersezt statt zerfezt.
—	12	„ U. „ Adular- statt Adutar-.
49	1, 2, 16, 21	von D. lies Phosphoreszenz statt Phosphoreszens.
52	4	von D. lies Klang statt Glanz.
55	2	„ „ „ ternäre statt tereäre.
—	11	„ U. „ Sauerstoff statt Säurestoff.
56	15	„ „ „ Elementar statt Elemententar.
58	2	„ „ „ die zweite statt der zweiten.
59	17	„ D. „ gasförmigen statt glasförmigen.
76	1	„ „ „ thermogène statt thormogène.
86	2	„ „ „ Regulus statt Regolus.
—	14	„ „ „ Potasse statt Potasche.
132		sind die unter No. 71 und 72 stehenden Figuren zu wechseln.
158	5	„ „ „ Colliers statt Celliers.
—	23	„ „ „ di statt die.
215		sind die unter No. 121 und 122 stehenden Figuren zu wechseln.
441	5	„ U. „ Gruppe statt Gattung.

Alphabetisches Register.

A.

	Seite.		Seite.
Abrazit	200	Alum-Earth	455
Absonderung	36	Alumine fluatée alkaline	141
Adyat	162	Alumine fluatée siliceuse	181
Achmit	234	Alumine hydratée 140,	142
Achmite	234	Alumine hydratée silicifère	180
Acid, native boracic	85	Alumine hydro-phosphate	145
Acide boracique	85	Alumine magnésinée	149
Acmite	234	Alumine sous-sulfatée alkaline	142
Actinote	242	Alumine, subphosphate of	145
Actynolite	242	Alumine sulfatée alcaline	143
Adlerstein	343	Alumine, sulphate of	143
Adulaire	185	Aluminit	142
Adular	185	Aluminium	137
Aerolith	335	Alumstone, rhomboidal	142
Aeschenit	270	Alun	143
Asterkoble, erdige	455	Alunit	142
Asterkrystalle	52	Amalgam	427
Algalmatholit	189	Amalgame, native	427
Agathe	162	Amazonenstein	185
Almit	234	Amber	438
Alabaster	111	Ambligonit	146
Alaun	143	Ambr	438
Alaunerde	455	Amethyst	156
Alaunhaloid, rhomboedrisches	142	Amethyst, orientalischer	138
Alaunspath	142	Amianth	244
Alaunsalz, octaedrisches	143	Amianthus	244
Alaunstein	142	Ammonia, muriate of	94
Albin	169	Ammonia, sulphate of	95
Albit	195	Ammoniat	94
Alagat	292	Ammoniat-Alaun	144
Alait	237	Ammoniatfals, octaedrisches	94
Alanit	262	Ammoniaque muriatée	94
Allochroit	222	Ammoniaque sulfatée	95
Allophan	180	Amphibole	240
Allophane	180	Amphibole actinote	242
Almandin	150, 221	Amphibole fibreuse	242
Alum	143	Amphygène	186

	Seite.		Seite.
Analcime	195	Aquamarin	257
Analzim	195	Architekturmarmor	120
Anatas	265	Atendalit	225
Andalusit	171	Argent antimoinié sulfuré noir	422
Andalusit, prismatischer	171	Argent antimoinié sulfuré rouge	423
Anhydrit	107	Argent antimonial	421
Anhydrit, dichter	108	Argent carbonaté	420
Anhydrit, körniger	108	Argent et Cuivre sulfuré	426
Anhydrit, strahliger	108	Argent molybdique	303
Anhydritspath	108	Argent muriaté	418
Ankerit	134	Argent natif	417
Anorthit	228	Argent natif aurifère	430
Anthophyllit	440, 243	Argent sulfuré	419
Anthophyllit, blätteriger	239	Argentine	121
Anthracite	84	Argile cimolite	175
Anthrako-Magnesitspath	131	Argile kaolin	179
Anthrakonith	122	Argile lithomarge	177
Anthrazit	84	Argile ocreuse jaune graphique	362
Anthrazit, fasriger	447	Argile tripoléenne	175
Antimoine natif	293	Arragon	125
Antimoine oxydé	294	Arragon, fasriger	127
Antimoine oxydé sulfuré	297	Arragon, stängelicher	126
Antimoine oxydé terreux	295	Arragon, strahliger	126
Antimoine sulfuré	296	Arragonit	126
Antimon	293	Arragonite	125
Antimon, rhomboedrisches	293	Arragonite coralloide	127
Antimon, prismatisches	421	Arragonite fibreux conjointe	127
Antimon-Baryt, prismatischer	294	Arragonite fibreux radié	126
Antimonblende	297	Arragonspath	126
Antimonblende, strahlige	298	Arsenic natif	77
Antimonblüthe	294	Arsenic oxidé	78
Antimonglanz	296	Arsenic, oxyde of	78
Antimonglanz, axotomer	351	Arsenic sulfuré jaune	80
Antimonglanz, blätteriger	296	Arsenic sulfuré rouge	78
Antimonglanz, dichter	296	Arsenical-Iron	355
Antimonglanz, prismatischer	430	Arsenik	77
Antimonglanz, prismatoidischer	296	Arsenik, weißer	77
Antimonglanz, strahliger	296	Arsenik-Blei	323
Antimonocker	295	Arsenik-Eisen	351
Antimonoryb	294	Arsenik-Kobalt	376
Antimon Silber	421	Arsenik native	77
Antimon Silberblende	424	Arsenik-Schwefelnickel	383
Antimony, native	293	Arsenik-Silber	422
Antimony-Ochre	295	Arsenikblüthe	78
Antimony, oxyde of	294	Arsenikglanz	77
Antimony, red	297	Arsenikkies	355
Antimony, sulphuret of	296	Arsenikkies, axotomer	351
Apatit	113	Arsenikkies, prismatischer	355
Apatit, erdiger	115	Arseniknickel	381
Apatit, fasriger	115	Arseniksäure, oktaedrische	78
Apatite	114	Arsenik Silberblende	424
Apatitspath	114	Asbest	213, 244
Apлом	222	Asbest, biegsamer	244
Apophyllit	169	Asbest, gemeiner	244
Apophyllite	169	Asbeste, dur	244
Apypit	218	Asbeste, flexible	244

	Seite.		Seite.
Asbeste ligniforme	244	Augitspath, hemiprismatischer	240
Asbeste, tressé	245	Augitspath, paratomer	235
Asbestus, common	244	Augitspath, prismatischer	166
Asbestus, lignous	244	Augitspath, prismatoidischer	225
Asphalt	443	Auripigment	180
Asphalterde	444	Automolith	309
Asphaltum	443	Avanturin	158
Astérie	138	Axen der Krystalle	14
Atakamit	388	Axestone	251
Augit	235, 238	Axinit	215
Augit, gemeiner	238	Axinit, prismatischer	215
Augit, körniger	238	Axinite	215
Augitfels	238	Azure-Spar	148

B.

Backkohle	445	Bernstein, schwarzer	455
Baikalit	237	Beryl	257
Band-Jaspis	161	Beryll	257
Barocalcit	124	Beryll, edler	258
Baryt, dichter	99	Beryll, gemeiner	258
Baryt, erdiger	99	Beryllium	136
Baryt, faseriger	98	Biegsamkeit	58
Baryt, körniger	99	Bildstein	189
Baryt, kohlensaurer	99	Bimstein	191
Baryt, schwefelsaurer	96	Bipyramidal-Dodekaeder, eben-	
Baryt, strahliger	98	randiges	23
Baryte carbonatée	99	Bismuth, cupriferos sulphuret	
Baryte sulfatée	96	of	403
Baryte sulfatée concrétionnée		Bismuth natif	299
fibreuse	98	Bismuth, native	299
Baryte sulfatée compactée	99	Bismuth oxyde	300
Baryte sulfatée cristallise	97	Bismuth, oxyde of	300
Baryte sulfatée granulaire	99	Bismuth sulfuré	301
Baryte sulfatée laminaire	97	Bismuth sulfuré cuprifère	403
Baryte sulfatée radiée	98	Bismuth sulfuré plumbo-cupri-	
Baryte sulfatée terreuse	99	fère	406
Baryterde	99	Bismuth, sulphuret of	501
Barytspath	97	Bittererde-Hydrat	128
Barytstein	99	Bitterkalk	133
Barytes, carbonate of	99	Bittersalz	128
Barytes, sulphate of	96	Bittersalz, prismatisches	128
Baryto-Calcit	124	Bitterspar	134
Barium	96	Bitterspath	134
Basiskohle	452	Bitterspath, stänglicher	134
Beilstein	231, 251	Bitterwasser	129
Bergbutter	144	Bitume	438
Bergholz	244	Bitumen, compact	443
Bergkork	245	Bitume elastique	443
Bergkrystall	155	Bitume liquide	442
Bergleder	245	Bitume solide	443
Bergmilch	123	Black-Coal	445
Bergöl	442	Black-Iron-Ore	290
Bergtalg	441	Black-Manganese-Ore	284
Bergtheer	442	Black-Wad	287
Bergseife	178	Blätterdurchgang	35
Bernstein	438	Blättererz	353

	Seite.		Seite.
Blätterkoble	446	Blishinter	158
Blätter-Zellur	555	Blutstein	359
Blätter-Zeolith	204	Bockseife	178
Blattkoble	452	Bohnerz	345
Blau-Bleierz	522	Bois bitumineux	450
Blau-Eisenerde	551	Bois bitumineux terreux	45A
Blau-Eisenstein	361	Bol	176
Blaupath	148	Bole	176
Blei	314	Bologneserspath	98
Blei, arseniksaures	323	Borazit	131
Blei, chromsaures	330	Borax	95
Blei, kohlenisaures	323	Borarsäure	85
Blei, phosphorsaures	521	Borarsäure, prismatische	85
Blei, prismatisches schwefel-		Borazit, oktaedrischer	131
kohlenisaures	527	Borarsalz, prismatisches	93
Blei, rhomboedrisches schwefel-		Boron	85
kohlenisaures	326	Botryogen	358
Blei, salzsaures	325	Botryolith	169
Blei, scheelsaures	328	Bournonit	407
Blei-Baryt, axotomer	326	Bouteillenstein	190
Blei-Baryt, diplogener	320	Braun-Bleierz	321
Blei-Baryt, diprismatischer	325	Braun-Eisenerz	340
Blei-Baryt, hemiprismatischer	330	Braun-Eisenerz	342
Blei-Baryt, peritomer	316	Braun-Eisenrahm	287
Blei-Baryt, prismatischer	319, 327	Braun-Eisenstein	341
Blei-Baryt, pyramidal	529	Braun-Eisenstein, dichter	342
Blei-Baryt, rhomboedrischer	321	Braun-Eisenstein, faseriger	341
Bleichromat	330	Braun-Eisenstein, haarförmiger	342
Bleierde	325	Braun-Eisenstein, ockeriger	342
Bleierz von Mendip	316	Braun-Eisenstein, schuppig-fa-	
Bleiglätte, natürliche	316	seriger	341
Bleiglanz	317	Braunit	285
Bleiglanz, hexaedrischer	317	Braunkalk	154
Bleigummi	327	Braunkoble	450
Blei-Hörnerz	325	Braunkoble, erdige	454
Bleimolybdat	329	Braunkoble, gemeine	451
Bleiorpd	329	Braunkoble, holzartige	450
Bleiorpd, arseniksaures	323	Braunkoble, muschelige	451
Bleiorpd, chromsaures	330	Braunkoble, trapezoidale	452
Bleiorpd, gelbes	316	Braun-Menakerz	268
Bleiorpd, kohlenisaures	323	Braunspath	134
Bleiorpd, kohlen-schwefelsaures	327	Braunspath, faseriger	134
Bleiorpd, scheelsaures	328	Braunstein, grauer	286
Bleiorpd, schwefel-kohlenisaures	326	Braunstein, Piemontesischer	225
Bleiorpd, schwefelsaures	319	Braunstein, rother	289
Bleischmelat	328	Braunstein, schwarzer	284
Bleischweif	318	Breunerit	130
Bleispith	323	Brewsterit	201
Bleisulphat	319	Brithynsalz, prismatisches	113
Blei-Superorpd	315	Brochantit	590
Blei-Witriol	319	Broddbo-Tantalit	372
Blende	305	Brom	73
Blende, blätterige	306	Bronzianartin	112
Blende, faserige	307	Brongit	239
Blind-Coal	84	Brown-Coal	450, 451
Bligrobre	158	Brown-Coal, earthy	451

Brown-Spar	Seite. 134	Buchholzit	Seite. 173
Bruch der Mineralien	55	Bunt-Kupfererz	408
Brucite	248	Byssolith	242
Brugit	128		

C.

Calaite	145	Chaux carb. ferro-magnésifère	134
Calamine	368	Chaux carb. fibreuse	120
Calcédoine	158	Chaux carb. incrustante	122
Calcedony	158	Chaux carb. lamellaire	120
Calcium	103	Chaux carb. magnésifère	135
Candit	150	Chaux carb. magnésifère gra-	
Candle-coal	448	nulaire	135
Cannel-coal	448	Chaux carb. nacrée	121
Carnelian	159	Chaux carb. pulvérulent	123
Carpholite	211	Chaux carb. quarzifère	119
Cat's-eye	157	Chaux carb. saccharoide	120
Caoutchouc, mineral	443	Chaux fluatée	104
Celestine, fibrous	102	Chaux fluatée compacte	106
Celestine, foliated	101	Chaux fluatée cristallisée	105
Celestine, compact	102	Chaux fluatée laminaire	105
Celestine, radiated	102	Chaux fluatée terreuse	106
Cerer, basisch-flusssäures	152	Chaux nitratée	104
Cerer, neutrales-flusssäures	151	Chaux phosphatée	113
Cerererz, untheilbares	262	Chaux phos. pulvérulente	115
Cererit	262	Chaux sulfatée	109
Cerin	262	Chaux sulf. compacte	111
Cerinstein	262	Chaux sulf. cristallisée	110
Cerit	262	Chaux sulf. fibreuse	111
Cerite	262	Chaux sulf. laminaire	110
Cerium	151	Chaux sulf. niviforme	111
Cerium oxyde siliceux noir	262	Chaux sulf. terreuse	112
Cerium oxyde siliceux rouge	262	Chialolith	171
Cerium oxyde yttrifère	153	Chilbrenit	148
Cerolith	230	Chlor	73
Cerorubul, kohlen-säures	152	Chlorblei	316
Chabasie	206	Chlorblei, basisches	316
Chabasit	206	Chlorit	252
Chalk	123	Chloritschiefer	253
Chalkolith	280, 281	Chlor-Quecksilber	413
Chalzedon	158	Chlor-silber	418
Charcoal, mineral	447	Chondroit	248
Chaux anhydro-sulfatée	107	Chondrodite	248
Chaux anhydro-sulfatée quar-		Chrom	277
zifère	108	Chrom, oxyde of	278
Chaux anhydro-sulfatée subla-		Chrome oxyde	278
mellaire	108	Chrom-eisen	367
Chaux arseniatée	115	Chrom-eisenerz	367
Chaux boratée siliceuse	167	Chromerz, octaëdrisches	367
Chaux bo. si. concretionnée		Chromoder	278
mamelonnée	169	Chrysoberyll	255
Chaux carbonatée	117	Chrysolith	246
Chaux carb. compacte	121	Chrysolith, prismatischer	246
Chaux carb. concrétionnée	122	Chrysopras	159
Chaux carb. crayeuse	123	Chrysoprase	159
Chaux carb. cristallisée	119	Cimolite	175
Chaux carb. fétide	121	Cinnabar	414

	Seite.		Seite.
Eisen-sulfur	401	Euchroit	396
Euchlor-Glimmer, prismati-		Eucrase	258
sch	401	Eudialyt	260
Euchlor-Glimmer, pyramidal	280	Eufairit	426
Euchlor-Glimmer, rhomboedri-		Eufas	258
sch	394		

F.

Fahlerz	411	Fer arseniaté	354
Fahlerz, dunkles	411	Fer arsenical	355
Fahlerz, lichter	411	Fer carburé	83
Fahlunit	250	Fer chromaté	367
Farbe	42	Fer muriaté	369
Farbe, Veränderung der	46	Fer natif météorique	334
Farbenspiel	47	Fer oligiste	337
Farbenwandlung	48	Fer oligiste metalloide	338
Farbenwechsel	47	Fer oligiste micasé	338
Faser-Arragon	127	Fer oli. rouge compact	339
Faser-Baryt	98	Fer oli. rouge fibreux	339
Faser-Blende	307	Fer oli. rouge terreux	340
Faser-Datolith	169	Fer oxalaté	436
Faser-gyps	111	Fer oxydé carbonaté	356
Faserkalk	120	Fer ox. carb. concrétionné ma-	
Fasertiesel	173	meloné	357
Fasertohle	447	Fer oxydé géodique	343
Faser-Malachit	398	Fer oxydé globuliforme	343
Faser-Olivinit	397	Fer oxydé hématite brun fibreux	341
Faserquarz	157	Fer oxydé hydraté	340
Faser-Schwefel	75	Fer oxydé noir vitreux	343
Faser-Scolith	207	Fer oxydé résinite	353
Faser-Sinnober	415	Fer oxydé rouge luisant	339
Fassait	337	Fer oxydé terreux	343
Federerz	332	Fer oxydé titanifère	363
Federharz, elastisches	443	Fer oxydulé	356
Feder Salz	144	Fer oxydulé titané	366
Federweiß	111	Fer phosphaté	349
Feldspath	183	Fer phosphaté terretux	351
Feldspath apyre	171	Fer pourpuré	341
Feldspath compact	186	Fer sulfaté	348
Feldspath decomposé	179	Fer sulfuré	345
Feldspath, dichter	186	Fer sulfuré blanc	347
Feldspath, gemeiner	185	Fer sulfuré magnetique	344
Feldspath, gläser	186	Fergusonit	275
Feldspath nacré	185	Gettstein	193
Feldspath opalin	227	Feuer-Opal	164
Feldspath, opalifrenber	185	Feuerstein	160
Feldspath, prismatischer	183	Fibrolit	175
Feldspath, pyramidal	213	Figure-stone	189
Feldspath, rhomboedrischer	193	Finbo-Tantalit	372
Feldspath vitreux	186	Fiorit	162
Feldstein	186	Fire-Opal	164
Felsit	186	Flächen der Krystalle	13
Felspar, compact	186	Fliegenstein	77
Felspar, glassy	186	Flint	160
Felspar, siliceous	195	Flinte-Slate	162
Fer calcaréo-siliceux	359	Florentiner-Marmor	121

	Seite.		Seite.
Fluëlit	141	Fluß, hepatischer	107
Fluor	74	Flußerde	106
Fluorcerium, basisches	152	Flußhaloid, oktaedrisches	104
Fluorcerium, neutrales	151	Flußhaloid, rhomboedrisches	113
Fluor, compact	106	Flußspath	105
Fluor, earthy	106	Flußstein	106
Fluor-Spar	105	Franklinit	574
Fluß	104	Franeneis	110
Fluß, dichter	106	Fraunglas	110
Fluß, erdiger	106	Fulgurit	158

G.

Gadolinit	263	Gestalten, dreiaxige	15
Gadolinit, prismatischer	263	Gestalten, krystallinische	29
Gadolinite	263	Gestalten, vieraxige	16
Gahnit	309	Gestalten, zufällige	31
Gagat	448	Gibbst	140
Galena	317	Gioberitic	131
Galena, cobaltic	320	Gisetit	189
Galmei	308, 310	Gismondin	200
Garnet	220	Glanz	41
Garnet, oriental	221	Glanz-Arsenitkies	351
Garnet, "precious"	221	Glanzblende, hexaedrische	288
Gay-Lussacite	123	Glanzeisenerz	338
Gaylüssit	123	Glanzeisenstein	339
Gebiegen-Antimon	293	Glanzerz	419
Gebiegen-Antimon, arsenkalki-		Glanzkobalt	379
sches	294	Glanzkoble	454
Gebiegen-Arsenit	77	Glasertz	419
Gebiegen-Blei	315	Glasstopf, brauner	341
Gebiegen-Eisen	334	Glasstopf, rother	339
Gebiegen-Gold	428	Glauberit	112
Gebiegen-Kupfer	385	Glauberite	112
Gebiegen-Nickel	381	Glaubersalz	91
Gebiegen-Palladium	434	Glaubersalz, prismatisches	91
Gebiegen-Platin	432	Glimmer	187, 199
Gebiegen-Quecksilber	413	Glimmer, einaxiger	253
Gebiegen-Silber	417	Glimmer, rhomboedrischer	253
Gebiegen-Silber, gelbliches	430	Glimmer, zweiaxiger	187
Gebiegen-Spiesglas	293	Gmelinit	209
Gebiegen-Sylvan	298	Göthit	341
Gebiegen-Tellur	298	Gold	428
Gebiegen-Wismuth	299	Gold, argentiferous	430
Gehlenit	223	Gold, hexaedrisches	428
Gefäßstein	108	Gold, native	428
Gelb-Bleierz	329	Grammatit	242
Gelb-Eisenstein	343	Granat	220
Gelb-Eisenstein, dichter	343	Granat, brauner	222
Gelb-Eisenstein, faseriger	343	Granat, dodekaedrischer	220
Gelberde	362	Granat, edler	221
Gelberz	431	Granat, gelber	222
Gelb-Menakerz	268	Granat, gemeiner	222
Geognosie, Begriff	8	Granat, grüner	222
Geologie, Begriff	9	Granat, orientalischer	221
Geschmeidigkeit	37	Granat, prismatoedrischer	219
Gestalt, äußere	12	Granat, pyramidaler	225

	Seite.		Seite.
Granat, rother	221	Gyps, faseriger	111
Granat, schwarzer	222	Gyps, körniger	111
Granat, tetraedrischer	292	Gypse saccharoide	111
Granatblende, dodekaedrische	305	Gypserde	112
Graphie-Tellurium	430	Gypshaloid, diatomes	116
Graphit	83	Gypshaloid, hemiprismatisches	115
Graphitglimmer, rhomboedrischer	83	Gypshaloid, prismatisches	107
Grau-Braunstein	282	Gypshaloid, prismatoidisches	109
Grau-Manganerz	286	Gyps-Leberstein	112
Grau-Spiesglanzerz	296	Gypsmarmor	112
Grenat	220	Gypsmörtel	112
Grenat noble	221	Gypstosen	110
Grobkoble	447	GypsSPATH	110
Grossular	222	Gypsstein	111
Grün-Bleierz	321	Gypsum	109
Grün-Eisenstein	349	Gypsum, anhydrous	107
Grün-Eisenstein, faseriges	349	Gypsum, compact	111
Grünerde	361	Gypsum, compact anhydrous	108
Grundformen, Begriff	16	Gypsum, farinaceous	112
Gurhofian	135	Gypsum, fibrous	111
Gyps	109	Gypsum, granular	111
Gyps, blättriger	110	Gypsum, granular anhydrous	108
Gyps, erdiger	112	Gypsum, radiated anhydrous	108
Gyps, dichter	111	Gypsum, sparry	110

H.

Haarkies	381	Hepatis	98
Haarstein	155	Hetepozit	368
Haaronem-Malachit, hemipris-		Hessonit	222
matischer	398	Heulandit	204
Haaronem-Malachit, prismati-		Heulandite	204
scher	393	Hisingerit	358
Härte	36	HoblsPATH	171
Hätorit	159	Holz, bituminöses	450
Hal-Baryt, diprismatischer	99	Holz, fossiles	450
Hal-Baryt, peritomer	103	Holz, verkohltes bituminöses	451
Hal-Baryt, prismatischer	98	Holzasbest	244
Hal-Baryt, prismatoidischer	100	Holzerde, bituminöse	454
Halbopal	164	HolzKoble, faserige	450
Halloisit	177	HolzKoble, mineralische	447
Harmotom	200	Holzopal	165
Hatchettin	441	Holzstein	161
Hauptaxen der Krystalle	14	HolzZinn	313
Hausmannit	284	Honeystone	437
Haupn	212	Honigstein	437
Heavy-Spar, compact	99	Hornblei	325
Heavy-Spar, fibrous	98	Hornblende	240, 242
Heavy-Spar, granular	99	Hornblende, basaltische	242
Heavy-Spar, lamellar	97	Hornblende, gemeine	242
Heavy-Spar, radiated	98	Hornblende, labradorische	239
Heavy-Spar-Earth	99	Hornblende-Geitein	243
Hedenbergit	237	Hornblende-Schiefer	243
Heliotrop	159	Hornmangan	292
Heliotrope	159	Hornsilber	418
Helvin	292	Hornstein	160
Hemitropieen	27	Hornstone	160

	Seite.		Seite.
Houille	445	Humboldtfit	168
Houille brune	450, 451	Hyacinte	259
Houille compacte	448	Hyalith	165
Houille feuilletée	446	Hyalosiderit	247
Houille fuligineuse	448	Hyazinth	259
Houille grossière	447	Hyazinth von Compositella	158
Houille limoneuse	452	Hydrargilit, dichter.	145
Houille papyracée	453	Hydrophan	164
Houille schisteuse	446	Hypersthen	239
Huralit	369, 436	Hypersthène	239

J.

Jade	226	Iron, arseniate of	354
Jade, nephritique	251	Iron, carbonate of	356
Jamesonit	331	Iron, chromate of	367
Jaspe Egyptien	161	Iron, earthy phosphate of	351
Jaspe-opale	166	Iron, native	334
Jaspe rubanné	161	Iron, native muriate of	369
Jasper	161	Iron, oxydulated	336
Jasper-opal	166	Iron, phosphate of	349
Jasper, striped	161	Iron, spathose	356
Jaspis	161	Iron, sulphate of	348
Jaspis, Aegyptischer	161	Iron, titaniferous oxydulated	365
Jaspis, gemeiner	161	Iron, tungstate of	373
Jaspopal	166	Iron-ore, brown	340
Jayet	448, 453	Iron-ore, compact brown	342
Jochthrophthalm	169	Iron-ore, compact red	339
Jodtras	223	Iron-ore, crystallized	341
Idocrase	223	Iron-ore, fibrous brown	341
Ilmenit	365	Iron-ore, fibrous red	339
Ilvait	359	Iron-ore, magnetic	336
Indifolith	218	Iron-ore, ochry brown	342
Jod	73	Iron-ore, scaly red	339
Jod-Silber	419	Iron-ore, white	347
Johannit	280	Iron-Pyrites	345
Jolith	248	Iron-Pyrites, magnetic	344
Jridium	434, 435	Iserin	364
Iridium and Osmium, alloy of	435	Ittnerit	212
Iridium osmie	435	Judenpech	443
Irifiren	48		

K.

Kacholong	165	Kalk, körniger	120
Kadmium	311	Kalk, Kohlensäurer	117
Kannelkohle	448	Kalk, phosphorsaurer	113
Katzen	362	Kalk, salpetersaurer	104
Kalait	145	Kalk, schwefelsaurer	107
Kalamit	242	Kalk, wasserhaltiger schwefel-	
Kali, einfach-salpetersaures	86	saurer	109
Kali, schwefelsaures	87	Kalkhaloid, makrotypos	133, 134
Kali-Alaun	144	Kalkhaloid, prachtypos	130
Kali-Salpeter	86	Kalkhaloid, rhomboedrisches	117
Kalium	86	Kalkerde	123
Kalk, arsenitsaurer	115	Kalksalpeter	104
Kalk, faseriger	120	Kalkschiefer	121
Kalk; flusssäurer	104	Kalksinter, faseriger	120, 127

	Seite.		Seite.
Kalkspath	119	Kohlen	444
Kalkspath, quarziger	119	Kohlenblende	84
Kalkspath, stängelicher	119	Kohlenstoff	81
Kalkspath, stinkender	119	Kokkolith	238
Kalkstein	121	Kollprit	180
Kalkstein, dichter	121	Kolophonit	222
Kalktuff	122	Kolumbit	371
Kammkies	347	Konit	136
Kanelsstein	222	Korallenerz	415
Kanten der Krystalle	14	Korund	137, 139
Kaolin	179	Korund, dodekaedrischer	149
Karmin	242	Korund, oktaedrischer	309
Karniol	159	Korund, prismatischer	255
Karpholith	211	Korund, rhomboedrischer	137
Karphosiderit	351	Kreide	123
Kasenge	157	Kreuzstein	200
Kennzeichen, Begriff	11	Krokydolith	361
Kennzeichen, chemische	12, 53	Kryolith	141
Kennzeichen, physikalische	12, 33	Kryonhaloid, prismatisches	125, 141
Kennzeichen, stereometrische	12	Krystall, Begriff	13
Kiesel-Eisenstein, rother	340	Krystall-Drusen	28
Kieselpuffer	402	Krystall-Gruppen	28
Kiesel-Malachit	402	Krystallisation	13
Kiesel-Mangan	291	Krystallographie	13
Kieselschiefer	162	Krystallsysteme	15
Kieselstein	162	Kugel-Jaspis	161
Kieselspath	195	Kupfer	384
Kieseltuff	162	Kupfer, blätteriges phosphor-	
Kiesel-Wismuth	302	saures	393
Kieselzint	310	Kupfer, erdiges phosphorsaures	393
Killinit	199	Kupfer, saferiges phosphorsaures	393
Kimito-Tantalit	372	Kupfer, klinorhombisches	393
Klapperstein	343	Kupfer, oktaedrisches	385
Klaprothit	148	Kupfer, oktaedrisches phosphor-	
Knisterfalz	89	saures	392
Kobalt	375	Kupfer, prismatisches phosphor-	
Kobalt, arseniksaures	378	saures	393
Kobaltbeschlag	378	Kupfer, salzsaures	388
Kobalt-Bleierz	320	Kupfer-Blei-Bitriol	320
Kobaltblüthe	378	Kupferblüthe	386
Kobaltglanz	379	Kupfererz, oktaedrisches	386
Kobalt-Glimmer, prismatischer	378	Kupferfablerz	411
Kobaltkies	375	Kupferglanz	389
Kobaltkies, dodekaedrischer	379	Kupferglanz, diprismatischer	407
Kobaltkies, hexaedrischer	379	Kupferglanz, prismatischer	389
Kobaltmulm	380	Kupferglanz, prismatoidischer	407
Kobaltoryd, arseniksaures	378	Kupferglanz, rhombischer	389
Kobalt-Bitriol	376	Kupferglanz, tetraedrischer	411
Kochsalz, natürliches	88	Kupferglas	389
Körper, isomorphe	56	Kupferglimmer	394
Körper, lebende	7	Kupfergrün	399
Körper, leblose	7	Kupfergrün, eisenhaltiges	399
Körper, organische	7	Kupferindig	390
Körper, unorganische	7	Kupferties	409
Kohärenz-Verhältnisse der Mi-		Kupferties, oktaedrischer	408
neralien	53	Kupferties, pyramidal	469

	Seite.		Seite.
Kupferkies, tetragonaler	409	Kuphonspath, diatomer	202
Kupferlasur, blätterige	400	Kuphonspath, diprismatischer	205
Kupferlasur, strahlige	400	Kuphonspath, dodekaedrischer	194
Kupfernickel	381	Kuphonspath, brewsterischer	201
Kupferoxyd, schwefelsaures	391	Kuphonspath, hemiprismatischer	204
Kupferoxydul	386	Kuphonspath, hexaedrischer	195
Kupfer-Decherz	387	Kuphonspath, paratomer	200
Kupferschiefer	122	Kuphonspath, prismatischer	207
Kupfersammeterz	400	Kuphonspath, prismatoidischer	203
Kupferschaum	401	Kuphonspath, pyramidaler	169
Kupferschwarze	387	Kuphonspath, rhomboedrischer	206
Kupfer-Silberglanz	426	Kuphonspath, trapezoidaler	186
Kupfer-smaragd	402	Kyanit	172
Kupfer-Bismutberg	403	Kyanit, eisenschüssiger	140
Kupfer-Bitriol	391		

L.

Labrador	227	Lebererz	415
Labrador-Felspar	227	Leberkies	344
Labrador-Feldspath	227	Lepidokrokit	341
Labrador-Schiller-Spar	239	Lepidolith	199
Lassonit	145	Lettenfohle	447
Lasulite	148	Leucit	186
Lasur-Malachit, prismatischer	399	Leucite	186
Lasurspath, dodekaedrischer	213	Lherzolith	238
Lasurspath, prismatischer	148	Lichtschein	48
Lasurspath, prismatoidischer	148	Liebrit	359
Lasurstein	213	Lignite	450
Laumontit	202	Lignite fibreux	450
Laumonite	202	Lignite terreux	454
Lazulith	148	Lime, borate of	167
Lead and copper, chromate	405	Lime, carbonate of	117
Lead, arseniate of	323	Lime, fluat of	104
Lead, carbonate of	323	Lime, phosphate of	113
Lead, chromate of	330	Lime, tungstate of	274
Lead, cuprous sulphate of	320	Limestone common	121
Lead, hyarous aluminate of	327	Limestone, granular	120
Lead, molybdate of	329	Limestone tufaceous	122
Lead, murio-carbonate of	325	Linsenerz	395
Lead, native	315	Lirokon-Malachit, hexaedrischer	354
Lead, phosphate of	321	Lirokon-Malachit, prismatischer	395
Lead, sulphate of	319	Lithion-Glimmer	199
Lead, sulphato-carbonate of	327	Lithium	94
Lead, sulphato-tri-carbonate of	326	Lösch	448
Lead, sulphuret of	317	Luchs-Saphir	249
Lead, tungstate of	328	Lufkulan, stängelicher	119
Lead-spar from Mendip	316		

M.

Macle	171	Magnesia-Hydrat	128
Madreporit	122	Magnésie boratée	131
Magnesia, borate of	131	Magnésie carbonatée	130
Magnesia, carbonate of	130	Magnésie carbonatée silicifère-spongieuse	229
Magnesia, hydrate of	128	Magnésie hydratée	128
Magnesia, sulphate of	128		

	Seite.		Seite.
Magnésie sulfatée	128	Markasit	345
Magnesit	130	Marl	122
Magnesit, dichter	131	Marl-Slate, bituminous	122
Magnesit, quarziger	131	Marmor	120
Magnesitspath	130	Marne	122
Magneteisen	336	Mascagnin	95
Magneteisen, dichtes	336	Mauersalpeter	104
Magneteisen, erdiges	336	Meerschäum	229
Magneteisen, körniges	336	Mehlappß	112
Magneteisen, späthiges	336	Mejonit	213
Magnet-Eisenstein	336	Melanglanz, prismatischer	422
Magnetkies	344	Melanit	222
Magnetismus	51	Melichronharz, pyramidales	437
Magnium	127	Mellite	437
Malachit	398	Melilith	255
Malachit, blätteriger	398	Menakan	364
Malachit, dichter	399	Menakeisenstein	364
Malachit, erdiger	399	Menilith	165
Malachit, faseriger	398	Mennig	315
Malachite, fibrous	398	Mercur argental	427
Malachite, massive	399	Mercur muriaté	413
Malachitspath	398	Mercur natif	413
Malakolith	2, 337	Mercur sulfuré	414
Malthe	442	Mercur sulfuré compact	415
Mangan	282	Mergel	122
Mangan, dichtes kohlen-saures	289	Mergel, verhärteter	122
Mangan, kohlen-saures	289	Mergelerde	122
Mangan, phosphor-saures	367	Mergelschiefer	122
Mangan, späthiges kohlen-saures	289	Mergelschiefer, bituminöser	122
Manganblende	288	Mertur, bodet-aedrischer	427
Mangan-Epidot	225	Merkurbhende	414
Manganerz, brachytipes	285	Mercury, muriate of	413
Manganerz, prismatisches	282, 286	Mesote	208
Manganerz, pyramidales	284	Mesoline	208
Manganerz, untheilbares	290	Mesolith	208
Manganese, carbonate of	289	Mesotyp	207
Manganese, grey oxyde of	282, 286	Mesotype	207
Manganese, phosphate of	367	Metalle	85
Manganese, siliciferous oxyde of	291	Metalle der Alkalien	86
Manganese, sulphuret of	288	Metalle der Erden	127
Manganese oxyde	286	Metalle, leichte	85
Manganese oxyde carbonaté	289	Metalle, schwere	265
Manganese oxyde hydraté con- crétionné	290	Meteoreisen	534, 335
Manganese oxyde silicifère	291	Meteoric-stones	335
Manganese phosphaté ferrière	367	Meteorstein	335
Manganese sulfuré	288	Miagrit	425
Manganlanz	288	Mica	187, 253
Manganit	286	Mica violet	199
Mangan-Hyperoxyd	282	Micaphyllit	171
Mangan-Hyperoxydul, gewäf- sertes	286	Milchquarz	157
Mangan-kiesel	291	Miemit	134
Mangan-späth	289	Mineral adipocire	441
Marekanit	190	Mineralien, Begriff	8
Marienglas	110	Mineralien, chemisch einfache	53
		Mineralien, chemisch zusam- mengesetzte	53

	Seite.		Seite.
Mineralien, einfache	8	Molybdänocker	276
Mineralien, feste	34	Molybdena, sulphuret of	276
Mineralien, flüssige	34	Molybdena-Ochre	276
Mineralien, gemengte	8	Molybdene oxyd	276
Mineralien, krystallisirte	12	Molybdene sulfuré	276
Mineralien, nicht krystallisirte	12	Montstein	185
Mineralien, nicht metallische	73	Montmilch	123
Mineralien-Sammlungen	9	Moor-Braunkohle	452
Mineralogie, Begriff	8	Moor-Coal	452
Mineral-Species	63	Moorkohle	452
Mineral-Tar	442	Morasterz	343
Mineral-Türkis	145	Morion	155
Mispickel	355	Moroxit	114
Minium, native	315	Mountain-Cork	245
Mokkastein	159	Mountain-Soap	178
Molybdän	275	Mauriajit	107
Molybdänglanz	276	Muschel-Marmor, opalisirender	121
Molybdänglanz, rhomboedrischer	276	Mussit	237

N.

Nadelarz	406	Nephrit, magerer	226
Nadelkohle	452	Nephrite, common	251
Nadelstein	155, 207	Nickel	580
Nagelkalk	121	Nickel, arseniksaures	382
Nagiagererz	333	Nickel arseniate	382
Nafrit	232	Nickel, arseniate of	382
Naphta	442	Nickel, arsenical	381
Naphtaline, natürliche	441	Nickel arsenical	381
Natrium	87	Nickel arsenical antimonifere	383
Natro-Caloit	123	Nickel natif	381
Natrolith	208	Nickel, native	381
Natron, boraksaures	93	Nickel-Antimonglanz	383
Natronsalz, hemiprismatisches	92	Nickel-Antimonial-ore	383
Natron, kohlsaures	92	Nickelblüthe	382
Natron, salzsaures	88	Nickelglanz	383
Natron, schwefelsaures	91	Nickelerz, weißes	383
Natron-Feldspath	195	Nickelties	381
Natron-Salpeter	88	Nickelties, prismatischer	381
Natrumsalz, prismatisches	86	Nickelocker	382
Nemalit	128	Nickel-Spiesglanz	383
Nephelin	193	Nigrin	371
Népheline	193	Roseau	212
Nephrit	251	Rosin	212

O.

Oberfläche der Mineralien	33	Oktäeder, rhombisches	19
Obsidian	190	Oktäeder, rektanguläres	20
Obsidian, krystallisirter	247	Olivenit	397
Obsidienne	190	Olivenit-Erde	397
Oktäedit	265	Olivenitspath	397
Octahedrite	265	Oliven-Malachit, biprismatischer	392
Oil, mineral	442	Oliven-Malachit, prismatischer	397
Oisanite	265	Olivin	246
Okenit	167	Omphazit	239
Oktäeder, quadratisches	18	Onyr	159
Oktäeder, regelmässiges	17	Opal	163

	Seite.		Seite.
Opal, common	164	Orthit	264
Opal, edler	163	Orthoklas	183
Opal, gemeiner	164	Orthose	183
Opal, noble	163	Dryftognofte, Begriff	8
Opal, precious	163	Ösmium	435
Opaljaspis	166	Ösmium-Iridium	435
Ophit	231	Oralit	436
Or. natif	428	Oxide, organifche	438
Orpiment	80		

P.

Pagobit	189	Pikrolith	231
Palladium	434	Pikropharmakolith	116
Palladium, native	434	Pikrosmin	233
Papierkohle	452	Pimelit	230
Parachrosbaryt, makrotyper	289	Pinguit	176
Parachrosbaryt, prachtyper	356	Pinit	189
Pargafit	242	Pisolith	122
Paranthine	213	Pistazit	225
Paulit	239	Pitch-Blende	278
Pearlstone	192	Pitch-Coal	448, 453
Pea-stone	122	Pitchstone	192
Pebble, Aegyptian	161	Platin	432
Pechblende	278	Platina, native	432
Pechfeisenerz	342	Platine natif ferrofere	432
Pechkohle	448, 453	Plasma	159
Pechopal	164	Pleonast	150
Pechstein	192	Plomb antimonié sulfuré	407
Pechsteinkohle	448	Plomb arsenié	323
Pektolith	170	Plomb carbonaté	323
Peliom	248	Plomb carbonaté rhomboidal	326
Pentagon-Dodekaeder	18	Plomb chromaté	330
Periflin	197	Plomb chromé	405
Perikrat, hexaedrifches	418	Plomb gommé	327
Perikrat, pyramidales	413	Plomb molybdaté	329
Perlstein	192	Plomb murio-carbonaté	325
Péridot	246	Plomb natif	315
Petalinopath, prismatifcher	198	Plomb oxydé rouge	315
Petalit	198	Plomb phosphaté	321
Pétalite	198	Plomb sulfaté	319
Petroleum	442	Plomb sulfuré	317
Petrosilex résinite	192	Plumbago	83
Pharmacolite	115	Plumbo-Calcit	119
Pharmakolith	115	Polariftrung	41
Pharmakofiderit	354	Polaritäts-Gefetz	24
Phillipfit	201	Polybafit	427
Pholerit	178	Polyhalit	133
Phosphor	76	Polyhalite	133
Phosphoreszenz	49	Polyminit	271
Phosphorit	115	Ponce	191
Phosphorit, erdiger	115	Porzelain-Earth	179
PhosphorKupfer, rhombifches	392	Porzellanerde	179
Photizit	292	Potash, nitrate of	86
Phyalith	183	Potash, sulphate of	87
Pierre à fusil	160	Potasse nitraté	86
Pierre perlée	192	Potasse sulfatée	87

	Seite.		Seite.
Prase	157	Pyknit	185
Prasem	157	Pyrapallit	189
Prehnit	210	Pyrenit	222
Prehnit, blättriger	210	Pyrgom	237
Prehnit, faseriger	210	Pyrochlor	271
Prehnite	210	Pyrochmalit	369
Prehnitspath	210	Pyrolusit	282
Pseudo-Nephelin	193	Pyromorphit	321
Pseudomorphosen	32	Pyrop	221
Pseudomorphosen, Ausfüllungs-	32	Pyrophanit	252
— — — Umbildungs-	—	Pyrophosphalit	183
— — — Umbüllungs-	—	Pyrosidorit	341
Psilomelan	290	Pyrosomalit	369
Pumice	191	Pyroxène	235
Purpurblende, prismatische	297	Pyroxène résinite	238

Q.

Quarz	154	Quarz hyalin opaque	156
Quarz-agathe	162	Quarz hyalin rose	157
Quarz agathe cacholong	165	Quarz hyalin vert-obscur	157
Quarz agathe calcédoine	158	Quarz hyalin violet	156
Quarz agathe concrétionne thermogène	162	Quarz-Jaspe	161
Quarz agathe cornaline	159	Quarz, prismatischer	248
Quarz agathe grossier	160	Quarz résinite	163
Quarz agathe ponctué	159	Quarz résinite commun	164
Quarz agathe Prase	159	Quarz résinite hydrophane	164
Quarz agathe pyromaque	160	Quarz résinite miellé	164
Quarz agathe schistoide	162	Quarz résinite opalin	163
Quarz, common	156	Quarz, rhomboedrischer	154
Quarz, empirodor	190, 191, 192	Quarz résinite subluisant	165
Quarz, ferugineus	158	Quarz, untheilbarer	163
Quarz, gemeiner	156	Quarz violet	156
Quarz hyalin amorphe	156	Quarzfels	156
Quarz hyalin chatoyant	157	Qued Silber	412
Quarz hyalin concrétionné	165	Qued Silber-Hornerz	413
Quarz hyalin fétide	157	Qued Silber-Lebererz	415
Quarz hyalin hématoides	158	Querzen der Krystalle	14
Quarz hyalin limpide	155	Quickriver, muriate of	413
		Quickriver native	413

R.

Rasen-Eisenstein	343	Rhodium	434
Ratöfkit	106	Rhodochofist	289
Rauchtopas	155	Rhodonit	292
Rauschgelb, gelbes	80	Rhomboceder	22
Rauschgelb, rothes	78	Riakit	186
Rauten-Dodekaeder	17	Rock-Krystall	155
Rautenspath	134	Rock-Milk	123
Red-Ochre	340	Roselit	116
Reißblei	83	Rosenquarz	157
Retinasphal	440	Rose-Quarz	157
Retinit	440	Röthel	340
Rétinite	192, 440	Roth-Bleierz	330
Realgar	78	Roth-Eisenerz	337
Rhätizit	172	Roth-Eisenerz	340
Rhénikiesel	155	Roth-Eisenrahm	339

Blum, Dryptognozie.

	Seite.		Seite.
Roth-Eisenstein	339	Rothstein	294
Roth-Eisenstein, dichter	339	Rubicell	150
Roth-Eisenstein, faseriger	339	Rubin	138, 149
Roth-Eisenstein, oderiger	340	Rubin-Balais	150
Roth-Eisenstein, schuppiger	339	Rubinblende, hemiprismatische	425
Rothgültigerz	423	Rubinblende, peritome	414
Rothgültigerz, dunkles	424	Rubinblende, rhomboedrische	423
Rothgültigerz, liches	424	Rubinglimmer	341
Roth-Kupfererz	386	Rubin-Spinell	150
Roth-Kupfererz, dichtes	386	Rubis-spinelle	149
Roth-Kupfererz, haarförmiges	386	Ruinen-Marmor	121
Rothosfit	222	Rußkohle	448
Roth-Spiesglanzerz	297	Rutil	267

S.

Sable ferrugineux volcanique	363	Schieferspath	121
Säule, gerade rektanguläre	19	Schiefer-Spar	121
Säule, gerade quadratische	18	Schillerquarz	157
Säule, gerade rhombische	20	Schiller-Spar	245
Säule, gerade rhomboidische	22	Schillerspath	245
Säule, regelmäßige sechsseitige	23	Schillerspath, diatomer	245
Säule, schiefe rektanguläre	21	Schillerspath, hemiprismatischer	239
Säule, schiefe rhombische	21	Schillerspath, prismatischer	243
Säule, schiefe rhomboidische	22	Schillerspath, prismatoidischer	239
Säure, arsenigte	78	Schillerstein	245
Säure, antimonichte	295	Schiste cuivreux	122
Salamstein	138	Schiste marno-bitumineux	122
Salit	237	Schmelzstein	213
Salmiak	94	Schörl	216
Salze, organisch-saure	436	Schörl, gemeiner	218
Salzkupfererz	388	Schörl, elektrischer	218
Sandkohle	445	Schrifterz	430
Sandstein von Fontainebleau,		Schrift-Zellur	430
krystallisirter	410	Schwarz-Bleierz	325
Savbir	138	Schwarz-Braunstein; blättriger	284
Sapphire	138	Schwarzerz	411
Saphirquarz	157	Schwarz-Eisenstein	290
Saplin	85	Schwarzgültigerz	422
Satin-Spar	120	Schwarzkohle	445
Sauerstoff	73	Schwarz-Manganerz	284
Saussurit	226	Schwarz-Manganerz, dichtes	290
Savon de montagne	178	Schwarz-Spiesglanzerz	407
Schalenblende	307	Schwarz-Titanerz	364
Schalstein	166	Schwefel	74
Schaumgyps	111	Schwefel, hemiprismatischer	78
Scheel	274	Schwefel, natürlicher	74
Scheelbaryt, prismatischer	274	Schwefel, prismatischer	74
Scheelerz, prismatisches	373	Schwefel, prismatoidischer	80
Schéelin calcaire	274	Schwefel, vulkanischer	75
Schéelin ferrugineux	373	Schwefel-Antimon	296
Scheelit	274	Schwefel-Arsenik, gelbes	80
Scheelkalk	274	Schwefel-Arsenik, rothes	78
Scheelspath	274	Schwefel-Blei	317
Scheererit	441	Schwefelerde	75
Schieferspath	446	Schwefelties	345

	Seite.		Seite.
Schwefel-Kobalt	375	Silver, native	417
Schwefel-Kupferzinn	404	Silver, red	423
Schwefel-Mangan	288	Silver, sulphuret of	419
Schwefel-Molybdän	276	Sinter, siliceous	162
Schwefel-Nickel	381	Sinterkohle	445
Schwefel-Quecksilber	414	Stapolith	213
Schwefelsinter	75	Stolexit	208
Schwefelspath	74	Storodit	352
Schwefel-Wismuth	301	Storja	226
Schwefel-Zink	305	Slate-Coal	446
Schwere	58	Smaragd	256, 257
Schwerspath	96	Smaragd, gestreifter	257
Schwerstein	274	Smaragd, glatter	257
Schwimmstein	160	Smaragd, prismatischer	258
Sea-foam	229	Smaragd, rhomboedrischer	256
Seifenstein	230	Smaragdit	239
Selen	76	Smaragd-Malachit, rhomboe-	
Selenite	110	drischer	402
Selenblei	320	Smirgel	139
Selen-Bleikupfer	404	Soapstone	230
Selen-Kobaltblei	321	Soda	92
Selenkupfer	392	Soda, borate of	93
Selen-Kupferblei	405	Soda, carbonate of	92
Selen-Palladium	434	Soda, muriate of	88
Selen-Quecksilber	416	Soda, nitrate of	88
Selen-Quecksilberblei	416	Soda, sulphate of	91
Selensilber	420	Sodalith	194
Selen-Schwefel	76	Sodalite	194
Semi-Opal	164	Sommit	193
Serpentin, edler	231	Soot-Coal	448
Serpentine, precious	231	Sordawallit	250
Serpentinfels	231	Soude boratée	93
Siberit	218	Soude carbonatée	92
Siderit	157	Soude muriatée	88
Sideroschistolith	360	Soude nitratée	88
Silber	416	Soude sulfatée	91
Silber, hexaedrisches	417	Soufre	74
Silberglanz	419	Soufre thermogène	76
Silberglanz, hexaedrischer	419	Spaltbarkeit	34
Silberglanz, rhombischer	422	Spar, calcareous	119
Silbergold	430	Sparquellstein	114
Silber-Hornetz	418	Spatheisenstein	356
Silber-Kupferglanz	426	Spatheisenstein, strahliger	357
Silberorob, kohlen-saures	420	Speckstein	230
Silberschwärze	419	Specular-Iron	358
Silber-Wismuthetz	425	Specular-Iron, micaceous	338
Silicium	153	Speerfies	347
Sillimanit	174	Speistkobalt	376
Silver and Copper, seleniuret of	426	Speistkobalt, faseriger	377
Silver, antimonial	421	Speistkobalt, hexaedrischer	376
Silver, auriferous native	430	Speistkobalt, oktaedrischer	376
Silver, brittle sulphuret of	422	Sphärosiderit	357
Silver, carbonate of	420	Sphärosiderit, dichter	357
Silver, molybdic	305	Sphärosiderit, thoniger	357
Silver, muriate of	418	Sphärolith	192

	Seite.		Seite.
Spheu	268	Stinkstein, späthiger	119
Sphene	268	Stinkstone	121
Spiesglanz-Bleierz	407	Stöchiometrie	56
Spiesglanz-Eiser	295	Strahl-Anhydrit	108
Spiesglanz-Silber	421	Strahlbarst	98
Spinell	149	Strahlgyps	110
Spinell, blauer	150	Strahlkies	347
Spinell, rother	149	Strahl-Mesotyp	207
Spinell, schwarzer	150	Strahl-Nehrit	210
Spinellan	212	Strahlstein	242
Spinelle	149	Strahl-Zeolith	205
Spinelle noir	150	Strahlenbrechung	40
Spinelle zincifere	309	Strigisan	145
Spinelle, zinciferous	309	Strohstein	211
Spinel-Ruby	149	Strontian, carbonate of	103
Spodumen	198	Strontian, faseriger schwefel-	
Sprenstein	213	saurer	102
Sprödgglazerz	422	Strontian, kalkhaltiger schwe-	
Sprudelstein	122	felsaurer	102
Stangenkohle	454	Strontian, kohlen-saurer	103
Staphylin-Malachit, untheil-		Strontian, schwefel-saurer	110
barer	402	Strontian, späthiger schwefel-	
Statuen-Marmor	120	saurer	101
Staurolith	219	Strontian, strahliger schwefel-	
Staurotide	219	saurer	102
Stéatite	230	Strontian, sulphate of	100
Stéatite-Pagodite	189	Strontiane carbonatée	103
Stein, Lydischer	162	Strontiane sulfatée	100
Steinhailit	248	Strontiane sulfatée calcarifere	102
Steinkohle	445	Strontiane sulfatée cristallisée	101
Steinkohle, harzige	445	Strontiane sulfatée fibreuse-	
Steinkohle, harzige	450	conjointe	102
Steinkohle, harzlose	84	Strontiane sulfatée fibro-lami-	
Steinmart	177	naire	102
Steinöl	442	Strontiane sulfatée laminaire	101
Steinsalz	88	Strontianit	103
— —, blätteriges	—	Strontium	100
— —, hexaedrisches	—	Stylobat	223
— —, faseriges	89	Succin	458
— —, körniges	89	Succinit	222, 438
Sternsaphir	138	Sulphur	74
Stickstoff	73	Sulphuret, triple	407
Stilbit	205, 204	Sumpferz	343
Stilpnosiderit	342	Surturbrand	450, 452
Stinkgyps	112	System, Hexagonal-	16
Stinkkalk	121	System, Klinorhombisches	15
Stinkkohle	453	System, Klinorhomboidisches	15
Stintquarz	157	System, rhombisches	15
Stinkstein	121	System, Tesserale-	15
Stinkstein, blätteriger	119	System, Tetragonal-	15
Z.			
Tabular-spar	166	Talc chlorite	252
Tafelsparth	166	Talc chlorite zographique	361
Talc	232	Talc glaphique	189

	Seite.		Seite.
Talc stéatite	230	Tin, fibrous oxyde of	313
Talk	232	Tin, oxyde of	312
Talk, phosphorsaurer	129	Tin, sulphuret of	404
Talk, strahliger	252	Tinkal	93
Talkerde, kohlen-saure	130	Titan	265
Talkglimmer, prismatischer	232, 252	Titane anatase	265
Talkglimmer, rhomboedrischer	187	Titane ferrugineux	371
Talk-Hydrat	128	Titane oxydé	267
Talkschiefer	233	Titane oxydé ferrique granuli-	
Tantal	272	forme	364
Tantale oxydé	371	Titane siliceo-calcaire	268
Tantale oxydé yttrifère	272	Titaneisen	363
Tantalerg, prismatisches	371	Titaneisen aus Gastein	365
Tantalit	371	Titanerg, oktaedrisches	271
Telesie	138	Titanerg, peritomes	267
Tellur	298	Titanerg, prismatisches	268
Tellure natif auro-argentifère	430	Titanerg, pyramidales	265
Tellure natif auro-ferrique	298	Titanit	268
Tellure natif auro-plombifère	333	Titanschohl	267
Tellurblei	333	Titanfand	364
Tellurglanz, prismatischer	333	Titanfand, magnetischer	363
Tellurgold	430	Topas	181, 182
Tellurium, black	333	Topas, orientalischer	138
Tellurium, native	298	Topase	181
Tellurium, yellow	431	Topase cylindroide	183
Tellur-Silber	431	Topase prismatoide	183
Tellur-Silbergold	430	Topaz	181
Tellur-Bismuth	303	Topazolith	222
Terra mirabilis Saxoniae	177	Topstein	233
Terre alumineuse	455	Torf	456
Terre bitumineuse feuilletée	453	Tourbe	456
Tetartin	195	Tourmaline	216
Tetradimit	303	Travertin	259
Tetraeder	17	Travertino	122
Tettenmergel	121	Travertin	242
Thalit	225	Triflastit	250
Thénardit	90	Tripel	175
Thomsonit	208	Trippe	198
Thon, phosphorsaurer	147	Trippe, xrotomer	210
Thon-Eisenstein, brauner	342	Trippe, prismatischer	198
Thon-Eisenstein, gelber	343	Triplett	367
Thon-Eisenstein, jaspirtiger	340	Trona	92
Thon-Eisenstein, körniger gelber	343	Tube fulminaire	158
Thon-Eisenstein, rother	340	Tubes, vitreous	158
Thon-Eisenstein, schaliger gelber	343	Türkis	145
Thon-Eisenstein, stänglicher	340	Tuffstein	122
Thonerde, phosphorsaurer	147	Tungstate de plomb	528
Thonerde, reine	142	Tungstein	274
Thonerde-Hydrat	140	Turf	456
Thorit	261	Turmalin	216
Thorium	151	Turmalin, blauer	218
Thunerstone	215	Turmalin, brauner	218
Thunerstein	215	Turmalin, grüner	218
Tile-ore	387	Turmalin, rhomboedrischer	216

	Seite.		Seite.
Turmalin, rother	218	Turnerit	147
Turmalin, schwarzer	218	Turquoise	145
Turmalin, wasserheller	218		

U.

Umbra	343	Uranit	280, 281
Umbra, Kölnische	455	Uranium, phosphate of	280
Uran	278	Uran-Ochre	279
Urane oxydè	280	Uranocker	279
Urane oxydè terreux	279	Uran-Pecherz	278
Urane oxydulè	278	Uran-Bitriol	280
Uranerz, untheilbares	278	Urao	92
Uran-Glimmer	280		

V.

Vanadium	277	Bitriol-Bleierz	319
Vanquelin	405	Bitriolsalz, hemiprismatisches	348
Vesuvian	223	Bitriolsalz, prismatisches	307
Bitriol, blauer	391	Bitriolsalz, tetartoprismatisches	391
Bitriol, grüner	348	Vivianit	350
Bitriol, rother	358	Vulpinit	108

W.

Wachopal	164	Wismuth-Bleierz	425
Wad	287	Wismuthblende	302
Wagnerit	129	Wismuthblüthe	300
Waschgold	429	Wismuthglanz	301
Wasserblei	276	Wismuthglanz, prismatischer	301
Wasserbleiocker	276	Wismuthglanz, rhomboedrischer	303
Wasserkies	347	Wismuth-Kupfererz	403
Wasserstoff	73	Wismuthocker	300
Wavellit	145	Wismuthoryb	300
Websterit	142	Wismuth-Silbererz	425
Weiß-Bleierz	323	Wicherit	99
Weißerz	355	Wörthit	174
Weiß-Spiesglanzerz	394	Wolfram	373
Weißtellur	431	Wollastonit	166
Weltange	164	Wollastonite	166
Wernerit	213	Wood, bituminous	450
Wiesenerz	343	Woodstone	161
Wilmnit	322, 223	Würfel	17
Wismuth	299	Würfelers	354
Wismuth, octaedrisches	299		


Y.

Ytterbit	263	Yttrium	136
Yttererde, phosphorsaure	136	Yttrocerit	453
Yttrantal	272	Yttrio-Columbite	272
Yttria, phosphate of	136	Yttrantalit	273

Z.

Zeagonit	200	Zinc carbonaté	308
Zersprengbarkeit	38	Zinc, carbonate of	308
Zeylanit	150	Zinc oxydè ferrifère brun-	
Ziegelerz	387	rougâtre	304

	Seite.		Seite.
Zinc oxyde silicifère	310	Zink-Bitriol	307
Zinc, red oxyde of	304	Zinn	312
Zinc, siliceous oxyde of	310	Zinnerz	312
Zinc sulfaté	307	Zinnerz, faferiges	313
Zinc sulfuré	305	Zinnerz, tornisches	313
Zinc, sulphate of	307	Zinnerz, pyramidales	312
Zinc, sulphuret of	305	Zinnerz, späthiges	313
Zink	304	Zinnfies	404
Zinkbarzt, prismatischer	310	Zinnober	414
Zinkbarzt, rhomboedrischer	308	Zinnobererde	415
Zinkblende	305	Zinnoberspath	415
Zinkblütze	309	Zinnstein	312
Zinkenit	332	Zirkon	259
Zinkerz, prismatisches	304	Zirkon, pyramidaler	259
Zinkglas	310	Zirkonit	259
Zinkoryd	304	Zirkonium	151
Zinkoryd, kohlensaures	308	Zoist	225
Zinkoryd, rothes	304	Zundererz	298
Zinkoryd, schwefelsaures	307	Zurlith	166
Zinksilikat	310	Zwillings-Krystalle	27
Zinkspath	308		



Fred. 1854 3^d (part 7th of the) Sr.

Pub 2.00

A329210

→ bnd 4-100

Men's list

70000

3 2044 102 954 872